




3 2044 106 344 567





Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin N°. XII.

PLANTKUNDIG WOORDENBOEK

VOOR DE

BOOMEN VAN JAVA

MET KORTE AANTEKENINGEN OVER DE BRUIKBAARHEID VAN HET HOUT

DOOR

S. H. KOORDERS,

*Houtvester belast met het onderzoek van de boschboomflora van Java,
chef van de 7e afd. van 's Lands Plantentuin.*

BATAVIA — 'S GRAVENHAGE

G. KOLFF & Co.

1894

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

<https://archive.org/details/plantkundigwoord12koor>

INLEIDING.

In de onderstaande opgave zijn door mij *alleen die namen vermeld, welke door mij in loco genoteerd zijn en waarvan de bijbehoorende latijnsche geslachtsnaam door mij zelf na voorloopige determinatie, hetzij in loco naar levend materiaal, hetzij te Buitenzorg naar mijn herbarium bepaald is.*

Het hier gepubliceerde is dus niet de vrucht van compilatie, maar uitsluitend van eigen onderzoek.

De hier gegeven inlandsch-latijnsche namen zijn door mij extraheerd uit de aantekeningen, welke zich in mijn te Buitenzorg bewaard herbarium bevinden. Dat herbarium, voorloopig bijna uitsluitend de woudboomen van Java betreffende, bestaat uit bijna 16000 specimina, waarvan elk met een aantekening betreffende inlandschen naam en groeiplaats, zoomede veelal van andere gegevens als gebruik enz. voorzien is.

Bovendien zijn hier bij nog talrijke losse reis-aantekeningen, gebruikt, die door mij in loco gemaakt over inlandsch-latijnsche namen zijn gebruikt.

Ik hoop dus er in geslaagd te zijn om de meest belangrijke inlandsche boom-namen van Java hier in botanisch-systematische volgorde te hebben bijeengebracht.

Om de bestaande, algemeen erkende verwarring in de literatuur der inlandsch-latijnsche namen niet nog grooter te maken dan die thans reeds is, heb ik *geen inlandsche namen uit MIQUEL, FILET VAN EEDEN, enz. overgenomen.*

Daardoor zullen naar ik mij vlei wel is waar nog vele aanvullingen, maar betrekkelijk weinig verbeteringen noodzakelijk zijn.

Want het zwaartepunt is hier gelegd op de juiste determinatie van het *geslacht*, zoomede op de kennis van de botanische waarde (op den systematischen omvang) van elken vermelden inlandschen naam.

In de hierachter afgedrukte „Nota over de waarde van inlandsche

namen van javaansche boomen" is dit standpunt betreffende de waarde van inlandsche boomnamen nader omschreven.

Niet alleen de op Java wildgroeïende, maar ook de meer algemeen op Java gecultiveerde boomsoorten zijn hier vermeld. Kruiden, lianen en heesters zijn echter niet door mij behandeld.

Aangezien bij al de vermelde namen herbarium is verzameld geworden, kunnen eventueel noodige verbeteringen gemakkelijk later aangebracht worden.

De *soortnamen* zijn hier met opzet *niet* vermeld, 1^e omdat daarin in vele gevallen bij nauwgezet onderzoek vele veranderingen zouden moeten komen en 2^e omdat ik niet wilde vooruitloopen op de hieronder geciteerde publicatie van mij met Dr. TH. VALETON. Bij de genus- en familie-namen is verandering zelden noodig

De *soortnamen* kunnen ten gevolge van de veelal onvolledige beschrijvingen in MIQUEL, HOOKER, enz. alleen nauwkeurig bepaald worden waar men, zooals te Buitenzorg, een uitgebreide bibliotheek en een groot herbarium met vergelijkingsmateriaal te zijner beschikking heeft.

De namen der geslachten en familiën kan men echter bijna altijd met voldoende zekerheid bepalen zonder van andere hulpmiddelen gebruik te maken dan van BENTHAM et HOOKER *Genera plantarum* of een dergelijk boek.

De geslachts- en familie-namen der boomsoorten konden daarom meestal in loco, op reis door mij bepaald worden en de juiste soortnamen alleen bij uitzondering.

Waar eenige soorten van eenzelfde geslacht min of meer constant aan verschillende inlandsche namen beantwoorden, zijn in dit werk de verschillende soorten door de letters A, B, C, enz. aangeduid; bijv. *Albizzia spec. A*; *Albizzia spec. B*; *Albizzia spec. C*, enz.

Waar verschillende soorten van een geslacht door de inlanders meestal met elkander verward worden, vindt men achter den genusnaam: *spec. div.* (*species diversae* = verschillende soorten); bijv. „*Ficus spec. div.*” Hier wil dit „*spec. div.*” dan niet zeggen *alle*, maar „*een zeker aantal*” soorten. Zie verder onder *Ficus*.

In de „Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van Java” door mij met Dr. TH. VALETON en andere botanici successievelijk uit te geven, waarvan het eerste deel, een tiental families omvattende in dit

jaar verschijnt, en waarvan het tweede deel in manuscript thans bijna gereed is, zijn de op een nauwgezet onderzoek berustende species-namen vermeld. Aangezien echter die species-bepaling veel tijd vordert en aangezien er diensgevolge nog een paar jaren zullen moeten verlopen voordat alle \pm 75 families, waartoe de woudboomen van Java behooren, in de „Bijdragen” *soort voor soort* behandeld zijn, heb ik het dienstig geoordeeld reeds thans tot de publicatie van deze inlandsch-latijnsche-geslachts-namen te besluiten. En zulks, omdat ik van oordeel ben — en ieder zal dit wel met mij eens zijn — dat men in de meeste gevallen reeds voldoende dienst van een inlandschen boomnaam gehad heeft, wanneer men met behulp daarvan uit den chaos van javaansche woudboomen niet een groote mate van waarschijnlijkheid den naam heeft leeren kennen, van de *familie* of het *geslacht*, waartoe de boom in kwestie behoort.

In de voornoemde, „Bijdragen” worden de inlandsche namen, die hier slechts provisorisch behandeld worden, aan een meer gedetailleerde beschouwing onderworpen.

Zoowel voor details betreffende gebrnik van hout, schors, enz. als voor de species-namen wordt de lezer dus naar deze „*Bijdragen*” verwezen. Slechts uiterst beknopt is hier de brnikbaarheid van het hout door mij besproken.

De volgorde, waarin de verschillende woudboomgeslachten hier behandeld worden is dezelfde als op blz. 51—100 in mijn „Sleutel tot de familiën en geslachten der woudboomen van Java” (Separaat afdruk uit dl. 52 van het Natuurk. Tijdschrift van Nederlandsch Indië 1893).

Door onderzoek in loco, vooral in streken, welke door mij nog slechts zeer vluchtig onderzocht zijn, kan men door gebruikmaking van dezen Determinatie-sleutel” de hier gegeven inlandsche namen zonder veel moeite aanvullen en verbeteren.

De *s* achter den inlandschen naam beteekent soendaneesch; de *j.* javaansch; *md.* madoereesch; *ml.* maleisch en *bg.* boegineesch.

Wanneer achter een inlandschen naam geen opgave staat van de residentie of streek, waar die naam in gebruik is, dan mag aangenomen worden, dat die naam niet lokaal is, maar voor meer dan eene residentie geldt.

Bij namen, waarachter een *s* staat, beteekent het dan, dat in geheel of in een groot deel van West-Java die namen in gebruik zijn. Bij namen, waarachter *md.* staat, duidt dit aan, dat in het vooral door madoerezen bewoonde deel van Běsoeki (Oost-Java) die namen geldig zijn, zonder dat daarin opgesloten ligt, dat zij niet ook in enkele andere streken van Oost-Java waarde zouden hebben. Indien evenwel een *j.* achter een inl. naam staat, zonder verdere vermelding van residentie of afdeeling, dan mag zulks als een bewijs beschouwd worden, dat die naam in het grootste deel van Midden-als van Oost-Java in gebruik is voor één en dezelfde boomspecies.

De bekende indische taalkundige Dr. J. BRANDES te Batavia heeft de door mij hooggewaardeerde welwillendheid gehad, *de schrijfwijze van al de hiervermelde inlandsche namen na te zien en waar dit noodig was te verbeteren.*

In zijn schrijven d^e. 22 Maart 1894 deelt mij Dr. J. L. A. BRANDES o. m. het volgende mede betreffende de door hem hier gevolgde spelling en uitspraak der inlandsche namen.

„Met het oog op de uitspraak dient er op te worden gelet, dat ik in mijne transcriptie hier:

de *e* als in „de” weergaf met *ě*;

de *e* als in „wel” met *è*; en

de *e* als in de eerste lettergreep van „deze” met *e* (zonder accent); zoo

de *o* als in „pot” met *ò* en

de *o* als in „poten” met *o* (zonder accent).

Tusschen *i* en *ì* en *oe* en *oè* maakte ik geen onderscheid, evenmin tusschen *a* en *à*. Ik achtte dit minder noodzakelijk; trouwens het verschil tusschen *oe* en *oè* kunnen de meeste Hollanders zeker niet hooren.

De *eu*-klank van het madoereesch, die iets anders is en ook anders klinkt dan de soendaneesche *eu*-klank, gaf ik opzettelijk hier niet weer, omdat hij zoo het beste in onze spelling wordt uitgedrukt.

De beide *t* 's en *d* 's van het javaansch en het madoereesch onderscheidde ik door onder de lingualen, die men maakt door de tong tegen het verhemelte te brengen, een punt (1) te plaatsen.”

(1) In de »errata-lijst” en in latere »aanvullingen” zal met dit fijne onderscheid geen rekening meer gehouden worden.

De *h* achter *k*, *tj*, *t*, *t* en *p* in madoereesche woorden moet men laten hooren.

kh, *tjh*, *th*, *th* en *ph* zijn andere klanken dan *k*, *tj*, *t*, *t* en *p*; zij beantwoorden aan *g*, *dj*, *d*, *d* en *b* in andere talen; bijv.: *Theumphoeh*, *md.* in het javaansch *Djamboe*. Slechts ten opzichte van de uitspraak van een oorspronkelijke *a* achter een *b* en een *dj* (een oorspronkelijk *w* en een *j*.) ben ik onzeker. Ik weet niet of zij dáár klinkt als javaansche *â*-klank, dan wel als *eu*. Ik schreef constant *eu*.

De *h* in het soendaasch moet duidelijk worden uitgesproken. Trouwens ik liet haar slechts dáár staan (dit geldt ook de andere talen) waar men haar hoort.

Uit de door u uit het Banjoewangische dialect opgegeven woorden meen ik te moeten opmaken, dat men haar ook dáár aan het begin van een woord uitspreekt; dat zou ouderwetsch zijn, want in het oud-javaansch vindt men haar ook in vele gevallen, daar waar zij etymologisch behoort en klinken moet; nooit of zoo goed als nooit fungeert zij er als stomme *h*."

Aldus Dr. BRANDES.

Mijne boven geciteerde nota over de waarde van inlandsche namen van javaansche woudboomen luidt aldus:

OVER DE WAARDE VAN INLANDSCHE NAMEN VAN
JAVAANSCH WOUDBOOMEN. (1)

Ieder, die zich de moeite getroost eenige der door FILET, VAN EEDEN, BISCHOP-GREVELINK, e. a. vermelde inlandsche plantennamen in loco aan een onderzoek te onderwerpen, wordt al spoedig getroffen door het groot aantal fouten. Nu eens is de schrijfwijze geheel verkeerd, dan weer wordt bijv. de naam als javaansch vermeld, terwijl die blijkbaar soendaneesch is en daardoor bij navraag in door Javanen bewoonde streken aan geen enkel inlander bekend is. Dan weer zoekt men den inlandschen naam van eene plantensoort geheel te vergeefs,

(1) Teijsmannia dl. 4; 1894 blz. 52—64; korte berichten uit 's Lands Plantentuin, uitgaande van den Directeur der inrichting.

terwijl die soort toch op de plaats van onderzoek aan bijna ieder inlander goed bij name bekend is. Dit geldt vooral javaansche namen. Dan eens weer vindt men den inl. naam van de plantensoort, die men zoekt, in de literatuur vermeld en correct geschreven, doch komt door eenig onderzoek al spoedig tot de conclusie, dat de eigenschappen achter den naam vermeld onmogelijk betrekking kunnen hebben op de plant in kwestie. En al is men dan ook veelal niet in staat te vinden, hoe de latijnsche naam wèl moet zijn, zoo slaagt men er dan meestal reeds na een eenvoudig botanisch onderzoek in, met zekerheid uittemaken, dat de vermelde latijnsche naam onjuist is.

Dit geval komt bij een veelvuldig critisch gebruik van FILET en andere boeken herhaaldelijk voor.

De vraag is nu, hoe het komt, dat het aantal fouten en leemten in die standaardwerken voor inlandsche plantennamen van Ned.-Oost-Indië zoo buitengewoon groot is, waarop bij het aanvullen en verbeteren dier leemten en fouten vooral gelet moet worden, en voorts welke waarde dus in verschillende gevallen aan inlandsche plantennamen van Ned.-Indië toegekend mag worden.

De beantwoording dier vraag is het doel van deze nota.

Wanneer iemand aan een inlander den naam van eene plant vraagt en daarna door determinatie met de Flora van MIQUEL of een ander botanisch werk den latijnschen naam bepaalt, dan kunnen zich daarbij o. m. de volgende gevallen voordoen, waardoor fouten ontstaan:

1^e De inlander, die den naam opgeeft, geeft uit gebrek aan plantenkennis of uit onoplettendheid of uit boos opzet een onjuisten naam op;

2^e De inlander geeft den juisten naam op, maar deze wordt door gebrek aan taalkennis door den europeeschen vrager geheel verkeerd verstaan of deze wordt goed genoteerd, maar bij de determinatie wordt eene fout gemaakt;

3^e De inlander vermeldt een onjuisten naam, deze wordt door gebrek aan taalkennis geheel foutief genoteerd, terwijl tot overmaat van verwarring ook bij de determinatie van den latijnschen naam nog eene fout gemaakt wordt.

Het valt niet moeilijk om in FILET e. a. een groot aantal voorbeelden van deze soort van fouten te vinden.

Uit het bovenstaande blijkt voldoende, hoe *gemakkelijk het dikwijls is om de fouten in de inlandsch-latijnsche namen te vinden, doch hoe uiterst moeilijk het soms is om die fouten te verbeteren.*

Immers hij, die hierin *direct* verbetering wil aanbrengen, moet 1° de inlandsche taal vrij goed verstaan; 2° moet goed kunnen determineeren en 3° moet tevens geassisteerd worden door kundige inlanders. Op de laatste voorwaarde wordt hier nog speciaal de aandacht gevestigd, omdat niet zelden ten onrechte gemeend wordt, dat elk inlander tevens een goed plantenkenner is. Van de onjuistheid dezer bij velen gangbare meening heb ik mij herhaaldelijk kunnen overtuigen, zoowel op Java als op Sumatra.

Voor hem, die ook *indirect* wil bijdragen om de kennis der inlandsche plantennamen te vermeerderen, zijn de moeilijkheden echter niet zoo groot.

Daartoe is het slechts noodig, dat hij geassisteerd wordt door een paar kundige inlandsche plantenkenners, de inlandsche taal vrij goed machtig is en herbarium kan aanleggen. Wanneer dat herbarium voorzien van duidelijke etiketten, waarop de inlandsche naam (en zoo mogelijk ook eene beknopte aantekening omtrent het gebruik) vermeld staat, opgezonden wordt aan een botanicus of aan eene botanische instelling (b. v. aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg), dan zal door dat herbarium de latijnsche naam met juistheid bepaald kunnen worden en dus de mogelijkheid geboren zijn om bestaande fouten in de literatuur te verbeteren.

Niet sterk genoeg kan deze methode aanbevolen worden, vooral aan hen, die zooals beheerders van cultuurondernemingen, ambtenaren bij het Boschwezen en het Binnenlandsch Bestuur en anderen, die door hun werkkring in de binnenlanden bijzonder goed in de gelegenheid zijn om zulk herbarium te verzamelen.

De moeite en kosten zijn zeer gering en de resultaten in verhouding voor wetenschap en praktijk zeer belangrijk.

Het eenvoudig noteeren van inlandsche namen zonder bewaren van herbarium heeft slechts weinig waarde, wanneer het niet geschiedt door iemand, die goed op de hoogte is van determineeren, en die daarbij eene vrij groote bibliotheek te zijner beschikking heeft.

Lange lijsten van inlandsche plantennamen zonder door *nieuwe*

determinatie gevonden of gecontroleerde latijnsche namen, hebben dan ook meestal zeer weinig waarde.

Twee of drie gedroogde takken, elk met nauwkeurigen inlandschen naam voorzien en opgezonden aan eene botanische instelling, hebben oneindig meer waarde dan lange lijsten van honderden inlandsche namen, waarbij òf de latijnsche namen geheel ontbreken òf waar die namen zonder critiek uit FILET e. a. overgenomen zijn.

Hierop kan niet sterk genoeg de aandacht gevestigd worden.

Over de waarde van inlandsche plantennamen, over de punten, waarop men bij noteeren er van moet letten, zoomede over de schrijfwijze is in de literatuur nogal een en ander te vinden. Men zie bijv. vooral VETH (P. J.) in „Sumatra-expeditie van 1877” en in zijn „Java”; SCHEFFER (Dr.) in *Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indië*; BERKHOUT (A. H.) in *Tijdschr. v. Nijv. en Landb. van N. I.*; GRESHOFF (Dr. M.), DE WOLFF VAN WESTERRODE, DE CLERQ, e. a. in *Teysmannia*; KURZ (S.) in *Preliminary Report of the Forest Flora of British Burma*; BRANDIS (Dr. D.) in *Forest Flora of Br. India*; GAMBLE (I. S.) in *Manual of Indian timbers*; FILET (G. I.) in de inleiding van zijn *Plantkundig woordenboek van N. I.* en in het *Natuurk. Tijdschr. van Ned.-Indië*; JUNGHUHN in zijn „Java”.

In geen dezer verhandelingen is echter dit onderwerp met die mate van uitvoerigheid behandeld, welke het alleszins verdient. Trouwens alleen in de geciteerde stukken van VETH en SCHEFFER is het onderwerp gedetailleerd, in bijna al de andere publicaties werd de *waarde* der inlandsche namen meer terloops behandeld.

Daarom kan eene meer volledige bespreking der factoren, die de waarde van inlandsche plantennamen bepalen, eenig nut hebben; vooral voor hen, die in de gelegenheid zijn om de kennis er van door locale onderzoekingen te vermeerderen; zoomede voor hen, die door de praktijk gedwongen zijn, zich bij de aanduiding van planten alleen van de inlandsche namen te bedienen.

De inlandsche namen op Java zijn bijna uitsluitend òf *soendaneesch* (s.) òf *jawaansch* (j.) òf *madoereesch* (md). De eerste in West-Java, de beide laatste in Midden- en Oost-Java. In zeer enkele streken, bijna alleen aan strandplaatsen, hebben sommige plaatsen ook nog

een *maleischen* (*ml*) of *boegineeschen* (1) (*bg.*) naam, die verschil-
lend is van den *jav.*, *soend.* of *mad.* naam. Aangezien deze namen
echter afkomstig zijn van eene bevolking, die door haar werkkring
meer in visschen dan in boomen belangstelt, hebben deze maleische
en boegineesche namen op *Java* — niet buiten Java — meestal slechts
weinig waarde.

De madoereesche namen zijn veelal ook slechts van geringe waar-
de, doordat de meeste Madoerezen op Java immigranten zijn, die
van boomsoorten zeer slecht op de hoogte zijn. Dit gemis aan ken-
nis komt vooral sterk uit in de bergbosschen van Běsoeki, aangezien
de flora dáár voor een groot deel uit plantensoorten bestaat, die op
Madoera ontbreken, en die dus uit den aard der zaak aan den Madoerees
onbekend zijn.

De javaansche namen, inzonderheid die van weinig bewoonde stre-
ken van Midden-Java, zijn daarentegen niet zelden van zeer veel
waarde, al doet ook volgens mijne ervaring de Javaan ten opzichte
van den Soendanees in het algemeen onder in de kennis van
plantennamen.

De Soendanees geeft niet zelden de bewijzen, dat hij uitstekend
weet te classificeeren.

In het algemeen kan dus de volgende schaal voor de waarde der
inlandsche plantennamen op Java aangenomen worden: allereerst de
soendaneesche, dan de javaansche, dan de madoereesche en eindelijk
de maleische en boegineesche namen.

Bij het noteeren der inlandsche namen moet men zeer scherp
toeluisteren; anders zijn fouten onvermijdelijk. Dit moge uit de
volgende voorbeelden blijken: *Sogâ*, *j.* beantwoordt in de res. Sa-
marang aan *Peltophorum ferrugineum* BTH., terwijl in diezelfde resi-
dentie met den naam *Sâkâ*, *j.* steeds *Saraca indica* L. aangeduid
wordt en terwijl *Saga*, *j.* in Pěkalongan de naam is voor *Ade-
nanthera microsperma* T. et B.

Waroe, *j. s. ml.* is de vaste inlandsche naam voor eenige *Hibiscus*-
soorten, (familie der *Malvaceae*.) terwijl de naam *Wěroe*, *j.* steeds aan
Albizia procera BENTH. (familie *Leguminosae*) beantwoordt.

(1) In enkele stranddorpen van Běsoeki bijv. Tratas en Poegěr, waar
boegineesche nederzettingen zijn.

Tjěmpāgā, j. heet in Banjoewangi eene dáár veelvuldig voor bruggebouw gebezigde houtsoort, welke van een *Meliaceae* afkomstig is (n.l. van een *Dysoxylum* soort); daarentegen dragen verschillende *Magnoliaceae* van de geslachten *Michelia* en *Talauma* aldaar den naam *Tjěmpākā, j.*; met of zonder achtervoegsels; bijv. *Tjěmpākā-djaj, j.*, *Tjěmpākā-kěmbang, j.*, *Tjěmpākā-gāndā, j.* of ook *Tjěmpākā, j.* alleen.

Alvorens men den naam noteert is het voorzichtig zich dezen eenige malen duidelijk te doen zeggen en na het opschrijven is het aan te bevelen om, indien daartoe gelegenheid bestaat, den geschreven naam aan een „geletterden” inlander ter verbetering te geven.

Voorts moet men er op acht geven of het woord *Kajoe, j.* of *Kadjěng, j.*; *Kadjoe, md.* of *Ki, s.*; dat door de inlanders niet zelden vóór een boomnaam genoemd wordt, er steeds bij genoemd of soms weggelaten wordt. Hierbij is nog met het volgende rekening te houden.

Het woord *Ki* dat men vóór sommige soendaneesche boomnamen zal vinden, beteekent soms „Boom” of „Hout” en beantwoordt dan aan het javaansche woord *Kajoe* of *Kadjěng* aan het madoereesche *Kadjoe* soendaneesche *Kaj*. Soms heeft het echter de beteekenis van „gelijkende op”. Als voorbeeld voor de laatste beteekenis diene *Ki-tjěmara, s.*; dat wil zeggen gelijkende op den *Tjěmara, s.* Met eerstgenoemden naam wordt in sommige streken van de Preanger de veel op *Tjěmara, s.* (*Casuarina*) gelijkende *Podocarpus cupressina* LINN. aangeduid. In samenstellingen als *Ki-ōraj, s.* (slangen-boom); *Ki-měrak, s.*; *Ki-těmbaga, s.* (koper-boom); *Ki-ěndog, s.* (eier-boom), *Ki-poèk, s.* (duistere boom) *Ki-bima, s.* enz. heeft echter *Ki* min of meer de beteekenis „boom.”

Bij het al of niet vermelden van de woorden „Ki”, „Kadjoe”, „Kaj” „Kajoe” en „Kadjěng” (hoog-javaansch van *Kajoe*) hebben wij ons zonder uitzondering eenvoudigheidshalve aan de spreekwijze van den inlander gehouden.

Het woord *Pohon*, dat men in FILET en andere boeken soms vóór z. g. javaansche namen vindt, is, zooals bekend is, het maleische woord voor boom, en kan nooit in echt javaansche, soendaneesche of madoereesche namen voorkomen. Namen in de literatuur, waarin het

woord *Pohon* als voorvoegsel van eelt-javaansehe plantennamen voorkomt, mogen daarom als minder juist gewantrouwd worden. Zulke foutieve namen vindt men o. a. in FILET onder no. 7015, 7017 en 7023.

Bij het vragen der inlandsehe namen kan het gebeuren, dat enkele der inlandsehe gidsen het niet met elkander eens zijn over den naam. In dat geval doet men wèl òf door de vershillende opgegeven namen te noteeren en daarbij een vraagteeken te plaatsen òf alleen één der inlandsehe namen, die den vrager het meest juist voorkomt. In het laatste geval plaatst men er echter ook een vraagteeken voor.

Blijkt het den vrager, dat dezelfde plantensoort door dezelfde inlanders nu eens met dezen dan weder met genen naam wordt aangeduid, dan is het raadzaam om die namen niet te noteeren, maar op de etikette slechts te sehrijven: „zonder vasten inlandschen naam”, „inlandsche naam onzeker”, of iets dergelijks.

Waar men door herhaald vragen zekerheid gekregen heeft, dat dezelfde plantenspecies door bijna alle inlanders der onderzochte streek eonstant met dezelfde namen aangeduid wordt, verdient het aanbeveling daarvan op de etikette speeiaal melding te maken; bijv. „*inl. naam zeer constant*”.

Het is vooral deze eategorie van inlandsehe namen, die voor praktijk en wetenschap veel waarde heeft.

Sommige boomen zijn aan de inlanders van geheel Java, behoudens kleine dialeet-vershillen, onder een en denzelfden naam bekend; bijv. *Djati*, s. j. en *Djatè. md.* (*Tectona grandis* LINN. F.), *Pilang*, s. j. en *Pèlang, md.* (*Acacia leucophioea* WILLD); *Plasa*, s. md. en *Plàsà j.* (*Butea frondosa* RXB.); *Waroe, ml. s. j.* en *Baroe, md.* (*Hibiscus spec*); *Sěmpoe, j.*, *Sěmpoer, s.* en *Sěmpòr, md.* (*Dillenia pentagyna* RXB). Bij eultuurboomen komt deze gelijkheid in naam veelvuldiger voor dan bij woudboomen. Voor deze laatste is het bijna regel, dat de naam in vershillende streken van Java vershillend is. Een paar voorbeelden mogen hier nog een plaats vinden. *Bischofia javanica* BL. heet in West-Java *Gadòk*, s. en in Midden- en Oost-Java *Gěntoengan*, j. of *Gintoengan*, j.

Artocarpus Blumei TRÉC. heet in West-Java *Teureup*, s. in Midden-Java *Běnda j.* of *Běnda, j.* en in Oost-Java *Kokap*, md.

Kleinhovia hospita KORTH. heet in West-Java *Tangkòlò*, s., in Midden-Java *Kětĩmāngā*, j. of *Kětĩmaha*, j. of *Timāhā* j. of *Kětĩmāhā*, j. in Oost-Java *Mangar*, md., terwijl het gevlekte hout van dezen boom, omdat het gevlekt is, over geheel Java evenals dat van andere soorten onder den naam *Pèlèt*, j. s. md. bekend is.

Er zijn echter ook gevallen, waarin twee tot geheel verschillende familiën behorende boomsoorten aan de inlanders van verschillende streken onder denzelfden naam bekend zijn. Dit blijkt o.a. uit de twee volgende voorbeelden:

1° *Commersonia echinata* FORST. is een kleine boom met zoo eigenaardig slangvormig gekromde takken, dat de inlanders van sommige streken, o.a. bij Palaboehan in de Zuid-Preanger, dezen daarom den naam *Ki-òraj*, s. (= slangen-boom) geven. Die naam beantwoordt in de Zuid-Preanger voor zoover ons bekend is aan geen enkele andere boomsoort. Nu is in Z. W. Bantén de naam *Ki-òraj*, s. wèl aan de inlanders bekend, maar geldt dáár voor eene geheel andere boomsoort n.l. voor *Hibiscus grewiaefolius* HASSK., terwijl *Commersonia* aldaar onder een anderen naam bekend is.

2° *Myrica javanica* BL is een boom, welke in sommige streken (o.a. op het Idjèn-plateau in Banjoewangi) aan de inlanders geheel bij name onbekend is, niettegenstaande die soort daar op de hooge bergtoppen voorkomt. In enkele streken werden mij echter namen opgegeven; b.v. op den G. Praoe-Dièng *Woeroe-kètèk*, j.; op den G. Mèrbaboe *Mangkòhan*, j. en op den G. Sèndārā *Pitjisan*, j. Onder den laatsten naam is de boom o.a. aan bijna elk inlander der bergdorpen van den Sèndārā goed bekend. Op het Midangan-gebergte bij Pringāmbā in de afd. Bandjarnègara der res. Banjoemas groeit evenwel eene boomsoort, n.l. *Nauclea lanceolata* BLUME, welke aldaar aan de inlanders algemeen bekend is onder denzelfden naam *Pitjisan*, j. terwijl diezelfde *Nauclea*-soort in diezelfde afdeeling op den G. Kapal, zoomede bij Soerdjā op den G. Praoe constant *Pitjis*, j. geheeten wordt. Deze *Nauclea* draagt in bijna geheel West-Java den vasten naam *Angrit*, s., terwijl in eenige streken van Midden-Java door ons o.a. nog de volgende namen genoteerd werden: *Poen-doengan* j., ?*Bandèngan*, j. en *Klèpoe-pasir*, j.

De naam *Pitjisan, j.* beantwoordt dus in Banjoemas en Bagèlèn-Kèdòe aan twee geheel verschillende boomsoorten, waarvan de eene tot de familie der *Myricaceae*, de andere tot die der *Rubiaceae* behoort.

Er is nog eene categorie van inlandsche namen, waarbij een groot aantal verschillende boomsoorten, van zeer verschillende familiën en geslachten een en denzelfden inlandschen naam dragen, hetzij in verschillende, hetzij in dezelfde streken. Zulke namen hebben natuurlijk in de praktijk veelal slechts weinig waarde, omdat men meestal niet weten kan aan welken wetenschappelijken naam zulk een inl. naam beantwoordt. Tot dergelijke onzekere inl. namen behooren o. a. *Brasan, j.*, *Ki-mèong, s.*, *Kidang, j.*, *Sapi, j.*; enz.

Namen als deze kunnen echter lokaal voor het opsporen van eene plantensoort soms toch nog eenig nut hebben. Het is dan echter vóór alles noodzakelijk, dat men nauwkeurig weet, dat de bewuste naam indertijd in *dezelfde streek*, waar men zelf onderzoekt, door een goed onderzoeker genoteerd is geworden.

Gevallen, waarin geen enkele, zelfs geen der „botanisch” meest ontwikkelde inlanders der onderzochte streek een naam voor eene inheemsche plantensoort weet, zijn niet zoo zeldzaam als veelal gemeend wordt. Zelfs met enkele hooge woudboomen is dit op Java het geval. Hiervan heb ik mij op mijne verschillende reizen door dit eiland herhaaldelijk kunnen overtuigen. Als voorbeelden hiervan kunnen o. m. verschillende soorten van *Symplocos*, *Agapetes* (*Vaccinium*), *Eurya*, *Pittosporum*, *Diospyros* en van andere woudboomen-geslachten genoemd worden.

Tot deze rubriek behooren vooral vele boomsoorten der hoog gelegen bosschen en der bergtopwouden, zoomede eenige meer zeldzame boomsoorten der lagere streken.

Hierbij moet echter vermeld worden, dat niet zelden dezelfde boomspecies, die in de eene streek van Java aan alle inlanders geheel bij name onbekend is, in eene andere streek onder een meer of minder vasten naam aan de meeste inlanders bekend is. Talrijke voorbeelden zou ik hiervoor kunnen aanvoeren. Slechts een paar mogen hier genoemd worden.

Gordonia excelsa BL. is een fraaie, hooge boom, die aan de inlan-

ders van de Preanger bij name vrij algemeen bekend is onder den naam *Ki-mandjël*, s. Diezelfde boomsoort nu is door mij onlangs op het Raoeng-Idjèn-gebergte in Běsoeki in de wouden aangetroffen, terwijl dáár geen enkel der door mij ondervraagde inlanders („boomkundige” Madoereezen) een naam voor die boomsoort wist.

Pisonia excelsa BL., de z. g. „vogelvangende boom”, welke in vele streken van Java voorkomt, is op de meeste plaatsen aan de inlanders goed bij name bekend en draagt dan o. m. de volgende, wel verschillend klinkende, doch in beteekenis gelijkkluidende namen: *Kajoe-gědang*, j.; *Kădjeng-pisang*, j.; *Ki-tjaoe*, s.; *Kădjoe-kědeung*, md.; *Arès*, j. — En toch vond ik die boomsoort ook op plaatsen, waar zelfs geen enkele inlandsche plantenkenner mij daarvoor een naam kon opgeven. Dit was bijv. het geval bij Pantjoer in de bergbosschen van Běsoeki en bij Karangasěm in de djatibosschen van Grobogan (Samarang).

Horsfieldia aculeata MIQ. is een zeer gemakkelijk herkenbare boom, die door mij zoowel in West- als Oost-Java aangetroffen is. In West-Java is die boom aan bijna elk goed bij name bekend, terwijl geen der mij op het Idjèn-plateau in Běsoeki vergezellende inlanders den naam er voor kon opgeven; en dit niettegenstaande deze boomsoort aldaar zeer algemeen voorkomt.

Reevesia Wallichii R. BR. is eene door mij in de Preanger gevonden, zeer zeldzame boomsoort, die aldaar aan geen enkel inlander bij name bekend is.

In sommige gevallen beantwoordt een inlandsche naam op Java uitsluitend aan één enkele boomspecies bijv. *Ki-hiang*, s.; of *Wěroe*, j. (*Albizia procera* BTH.) *Rasamala*, s., of *Mala*, s. (*Altingia excelsa* NORONHA); *Djati*, j. s. (*Tectona grandis* L. F.) In sommige gevallen geldt echter één enkele inlandsche naam voor 2 of meer soorten van een geslacht; ja er zijn gevallen, waarin zelfs één inlandsche naam aan een groot aantal (maar zelden aan alle) soorten van eene familie beantwoordt. Met andere woorden, soms zijn het species-, soms geslacht- en soms min of meer familie-namen.

Zoo worden vele, maar niet alle, soorten van het geslacht *Quercus* door de inlanders aangeduid met den naam *Pasang*, s. j. of *Kasang*,

ml., waarbij dan nog voor enkele bijzonder kenmerkende soorten soms nog een tweede naam, een soort-naam, geplaatst wordt, bijv. *Pasang-kajang*, *s.*, *Pasang-bòdas*, *s.*, *Pasang-beureum*, *s.*, enz. Daarbij zijn dan echter de bijgevoegde „soort-namen” meestal zeer onzeker en slechts van locale waarde.

Waar de inlandsche namen aan een nog omvangrijker, een nog abstracter begrip dan een geslacht (*genus*), namelijk min of meer aan eene familie (*ordo*) beantwoordt, daar hebben in de meeste gevallen de bijgevoegde inlandsche „soortnamen” nog minder waarde voor de praktijk, terwijl er dan veelal ook een groot aantal boomsoorten van andere familiën door de inlanders nog onder denzelfden inlandschen „familie” naam worden samengevat. Het laatste is niet te verwonderen, wanneer men er slechts op let, dat de botanici voor de classificatie der planten bijna uitsluitend op den bouw van bloem, vrucht en zaad letten, terwijl de inlander in vele gevallen vooral ook op eigenschappen let, welke voor de wetenschappelijke classificatie van geen belang zijn: o. a. al of niet voorkomen van luchtwortels, een blauwgrijnsachtig waas op de onderzijde der bladeren, enz.

Tot toelichting nog de volgende voorbeelden.

1° In de Preanger beantwoordt de naam *Kiara*, *s.*, aan een groot aantal soorten van het geslacht *Ficus* en wel aan de meeste soorten van het ondergeslacht *Urostigma*; bijna alle reusachtige boomen met luchtwortels en vijgvruchten. De verschillende soorten worden door de inlanders aangeduid door achtervoegsels als *Kiara-gěde*, *s.*, *Kiara-djingkang*, *s.*, enz. Nu heet echter de *Ficus* (*Urostigma*) *elastica* L., niet zooals men zou mogen verwachten *Kiara-karèt*, *s.*, maar eenvoudig *Karèt*, *s.*, terwijl bovendien een zeer groot aantal *Ficus*-soorten (o. a. alle zonder luchtwortels) niet door *Kiara*, *s.*, maar door geheel andere namen, bijv. *Kòndang*, *s.*, *Bisòrò*, *s.*, *Hamèrang*, *s.*, worden aangeduid.

2° Een veelvuldig op Java gekweekte boomvormige *Anonacaea* (*Anona squamosa* L.) wordt door de inlanders van sommige streken als een *Nangka*, *s. ml.* of *Nāngkâ*, *j.*, beschouwd en *Nangka-blanda*, *s.*, *Nāngkâ-lāndâ*, *j.*, genoemd, terwijl eenige soorten van het tot de familie der *Urticaceae* (onderfamilie *Artocarpeae*) behoorende geslacht *Artocarpus* eveneens met den inlandschen „geslachtsnaam” *Nāngkâ*, *j. s.* of *Nangka*, *s.*, *ml.* aangeduid worden.

3^e Terwijl een groot aantal *Eugenia*-soorten (vooral van de sectie *Jambosa*) door den inlander met den „geslachtsnaam” *Djamboe*, s. j. aangeduid worden, rekenen zij ook een tot een geheel andere plantenfamilie behorende boomsoort n. l. niet een *Myrtaceae* maar een *Anacardiaceae*: *Anacardium occidentale* L. eveneens tot het „geslacht” *Djamboe*, j. s. en noemen die boomsoort *Djamboe-monjèt*, s, of *Djamboe-mete*, j.

4^e In de Preanger groeien een zeer groot aantal boomsoorten, welke de inlanders met den gemeenschappelijken „familie”-naam *Hoeroe*, s., aanduiden; b. v. *Hoeroe-pajông*, s., *Hoeroe-tèdja*, s., *Hoeroe-mèntèk*, s., *Hoeroe-kònèng*, s., *Hoeroe-hiris*, s., *Hoeroe-djanitri*, s., *Hoeroe*, s., alleen, enz. Nu behooren wel de meeste *Hoeroe*, s., genoemde boomen tot eenzelfde familie, n. l. tot de *Lauraceae*, maar enkele behooren tot geheel andere familiën. Zoo worden o. a. de volgende tot andere familiën behooren boomen door inlanders veelal onder den familie-naam „*Hoeroe*” samengevat: *Elaeocarpus obtusus* BL., *Elaeocarpus dentatus* REINW., *Acer laurinum* HASSK. enkele *Myristica*-soorten, enz. En zulks vooral om de blauwgrijsachtige kleur der bladonderzijde en eenige verdere overeenkomst in habitus met sommige „echte” *Hoeroe*-soorten. Omgekeerd zijn er „echte” *Hoeroe*-soorten, *Lauraceae*, welke door de inlanders door namen worden aangeduid, waarin men het woord „*Hoeroe*” te vergeefs zoekt; zoo o. a. de volgende *Lauraceae*: *Ki-lèmok* s., *Ki-pèdès*, s., *Ki-sèrèh*, s., *Ki-amis*, s., alle soorten der familie *Lauraceae*.

Hier zij nog aangestipt, dat het Midden- en Oost-Java gebruikelijke woord *Woeroe*, j., eene nog ruimer beteekenis heeft dan *Hoeroe*, s., en wel in dien zin, dat door de Javanen een nog grooter aantal niet tot de *Lauraceae* behorende boomsoorten daartoe gerekend worden; o. a. enkele *Sapindaceae* *Myristicaceae*, *Pittosporaceae*, *Elaeocarpaceae*, enz.

Alhoewel in den regel voor de praktijk en voor den handel in het bijzonder de kennis der inlandsche namen boven die der latijnsche namen sneller en beter tot het doel voert dan gene.

Het volgende voorbeeld moge dit ophelderen.

Lagerstroemia speciosa PERS. (*L. Flos-Reginae* ROXB.) is een naam, die aan alle technische boschambtenaren zoowel in Britsch-Indië als op Java, bekend is. Met behulp van dien naam zal het mogelijk zijn

zich bij die ambtenaren inlichtingen omtrent houtprijzen, groeiplaats, enz. dier boomsoort te verschaffen, terwijl zulks bij gebruik der inlandsche namen alleen, groote bezwaren zou opleveren; want de inlandsche namen dezer soort verschillen niet alleen in Britsch-Indië en Java, maar ook zoodanig voor West- en Oost-Java, dat het allicht mogelijk zou zijn, dat ten onrechte op het ontbreken der gevraagde boomsoort zou geconcludeerd worden. Immers de inlandsche namen voor deze soort zijn n.l. in West-Java *Boengoer*, s.; in Midden- en een deel van Oost-Java *Woengoe*, j. en in Bésœki in Oost-Java: *Kêtangi*, md.; terwijl die van Britsch-Indië (volgens GAMBLE) zijn: *Jarul*, *Ajhar*, *Bolashari*, *Challa*, *Adamboe*, *Taman*, *Mota-bondara*, *Kamaung*, *Pymma*, *Murute*, enz. — alle inlandsche namen voor een en dezelfde boomsoort.

In het algemeen heeft echter eene nauwkeurige kennis der inlandsche plantennamen niet alleen voor de praktijk, maar ook voor de wetenschap zeer hooge waarde. Want door de kennis daarvan is men in staat gesteld om zich eene bepaalde plantensoort in korten tijd door de tusschenkomst van inlanders te verschaffen; terwijl het opsporen dierzelfde soort in tropische bosschen, die niet zelden uit 300—400 boomsoorten bestaan, zonder de kennis van den inlandschen naam in vele gevallen uiterst kostbaar en tijdroovend zou zijn; ja soms zelfs praktisch onuitvoerbaar zou blijken.

Uit ervaring kan ik hiervoor het volgende voorbeeld aanvoeren. Langen tijd had ik te vergeefs gezocht naar eene zeldzame boomsoort, welke door BLUME in West-Java gevonden was en dáár volgens hem *Hiroeng*, s. zou heeten. Door nu in verschillende streken van de Preanger aan de inlanders te vragen of er dáár ook een boom *Hiroeng*, s. genaamd, aan hen bekend was, slaagde ik er eindelijk in door de voorlichting van de inlanders om van diezelfde boomsoort *Nyssa sessiliflora* HOOK. f. eenige volwassen exemplaren te vinden. Zonder dien inlandschen naam was mij hoogstwaarschijnlijk die boom nog onbekend gebleven, aangezien hij in blad, stam, kroon, schors en takken opvallend op talrijke andere javaansche boomen gelijk en daarbij betrekkelijk zeldzaam is.

Een groot voordeel van de meeste inlandsche namen boven de

latijnsche ligt daarin, dat zij niet veranderen, terwijl dit tengevolge van den voortgang der studie van de rangschikking der planten voor de wetenschappelijke namen dikwijls wel het geval is. Welke houtsoort men bijv. bedoelt met *Rasamala*, s. kan in West-Java niet twijfelachtig zijn, aangezien dáár (1) slechts ééne enkele boomsoort is, die aan de inlanders steeds onder dien naam bekend is geweest en wel onder dienzelfden naam bekend zal blijven, terwijl in den loop der tijden de latijnsche naam veranderd is. Vroeger bijv. in de Flora van MIQUEL heette de boom *Liquidambar Altingiana* BLUME, terwijl thans, o.a. in HOOKER Flora of British India die soort *Altingia excelsa* NORONHA heet.

De boomsoort, die aan bijna elk inlander in Midden-Java onder den onveranderlijken naam *Pilang*, j. bekend is, is door de botanici in den loop der tijden onder een groot aantal namen beschreven bijv. als *Mimosa alba* ROTTL.; *Mimosa leucophloea* ROXB.; *Acacia arcuata* DÉCAISNE; *Acacia alba* WILLD. En thans heet die boom bijv. in HOOKER Fl. Br. Ind.: *Acacia leucophloea* WILLD.

Resumeerende blijkt dus:

1^e de inlandsche plantennamen op Java hebben in vele gevallen zeer groote waarde; evenwel moet men om teleurstellingen en vergissingen in het gebruik te vermijden, daarbij de grootste voorzichtigheid (zie boven onder *Pitjisan*, j.) in acht nemen en er daarbij in de allereerste plaats op letten, voor welke streek van Java, zoomede door wien de naam geldig verklaard is.

2^e de niet-botanicus kan zeer veel bijdragen om orde te scheppen in de bestaande verwarring der inlandsche namen in Indië en wel door aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg of 's Rijks Herbarium te Leiden herbarium (vooral bloem- en vruchtdragende takken) op te zenden, waarbij zich eene etikette bevindt met den nauwkeurig (zoo mogelijk met javaansche letters) geschreven inlandschen naam.

(1) Door A. G. VORDERMAN werd onlangs aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg van Madoera herbarium van een plant toegezonden, die aldaar *Rasamala*, md. zou heeten en die mij bleek een *Ficus* soort te zijn.

AANVULLING EN VERBETERING VAN HET HIER GEPUBLICEERDE OVER
INLANDSCHE NAMEN EN OVER HET GEBRUIK VAN HET HOUT.

Ten dienste van de beheerders van landbouwondernemingen en van ambtenaren, die dikwijls in de gelegenheid zijn om door gebruik van lokaal voorkomende houtsoorten vele uitgaven te besparen zijn hier gegevens vermeld betreffende de geschiktheid van het *hout* voor huisbouw, meubels, enz.

Ook deze gegevens zijn niet vermengd met de daarover in andere werken gepubliceerde gegevens, zelfs niet met die van het in vele opzichten uitnemende werk over de „Houtsoorten van Nederlandsch Oost-Indië” van den Directeur van het Koloniaal Museum te Haarlem, den Heer F. W. VAN EEDEN.

Dit is door mij gedaan, niet uit geringschatting van de waarde der daarin bevatte mededeelingen, maar uitsluitend om ook in dit opzicht mij in deze publicatie *uitsluitend te houden aan datgene, wat mij persoonlijk in loco door kundige inlanders en ervaren europeanen is medegedeeld geworden of wat mij door eigen ervaring juist is gebleken* betreffend de groote duurzaamheid van deze of de geringe duurzaamheid van gene soort.

Dit gedeelte van het werk vereischt de meeste verbeteringen en aanvullingen.

Toch heb ik gemeend de gegevens betreffende het *gebruik van het hout*, hoe beknopt ook, niet te mogen weglaten.

Uitvoeriger en naar ik hoop beter gegevens zal de lezer later vinden in de bovengeciteerde „Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van Java.”

Het hier gepubliceerde draagt slechts een voorloopig karakter en moet als een handleiding beschouwd worden om te komen tot de kennis der inlandsche namen en het gebruik van de javaansche boomen; zoomede als een gids om zich met of zonder de hulp van mijn „sleutel tot de familiën en geslachten der woudboomen van Java” terecht te kunnen vinden in de *Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van Java* van K. en V.; bij welk boek door het gemis van determinatie-sleutels het opzoeken van een boomsoort niet zelden moeilijkheden kan opleveren.

De door voortgezet onderzoek en door kritiek noodig gebleken aanvullingen en verbeteringen zullen zoodanig gedrukt worden, dat men die „aanvullingen” telkens op de wit gelaten ruimte onder elk nummer of onder elke familie kan opplakken.

Het papier dier „aanvullingen” zal daarom slechts aan ééne zijde en met zeer kleine letters gedrukt worden. Hierdoor wordt naar ik meen de bruikbaarheid van het boek verhoogd. Zulks temeer, aangezien de uitgevers, de Heeren KOLFF & Co., deze „aanvullingen” tegen zeer lagen prijs beschikbaar zullen stellen.

Nog zij het mij vergund hier een woord van hartelijken dank uittespreken aan allen, die mij bij mijn onderzoek hulp verleend hebben; inzonderheid aan velen mijner collega's, aan vele ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en aan talrijke beheerders van particuliere landbouwondernemingen in Java's binnenlanden.

En ten slotte zij hier de wensch geuit, dat de gebruiker van dit „Plantkundig woordenboek” evenveel nut moge hebben als ik er moeite en tijd aan besteed heb.

Buitenzorg, 20 April 1894.

S. H. KOORDERS.

INHOUD.

BLADZ.

DE BOOMEN VAN JAVA GERANGSCHIKT VOLGENS DE NATUUR-

LIJKE FAMILIËN	1
INDEX DER FAMILIËN	139
INDEX DER LATIJSCHEN NAMEN	141
INDEX DER INLANDSCHE EN HOLLANDSCHE NAMEN	151
ERRATA	—
ADDENDA	—

DE BOOMEN VAN JAVA GERANGSCHIKT VOLGENS DE
NATUURLIJKE FAMILIËN.

1* DILLENIACEAE. (1)

1. WORMIA ROXB.

Wormia spec. — *Ki-sègèl*, s. in geheel West-Java. — *Drègèl*, s. bij Tjilatjap in Banjoemas. — Beide vaste namen. Alleen in Midden- en West-Java.

Hout bruikbaar voor huisbouw.

2. DILLENIA LINN.

Dillenia spec. A. — *Sěmpoe*, j.; *Sòm-pòr*, md.; *Sěmpoe*, s.

Dillenia spec. B. — *Sěmpoe-batoe*, s.; *Sěmpoe-tjai*, s. — In Pékalongan soms *Sěmpoe*, j.; bij Tjandiroeboeh in Samarang *Simpòl*, j. — De madoereesche naam *Sěmpòl*, md. wordt aan een andere boomsoort gegeven.

Dillenia spec. C. — *Djoenti*, j. s. bij Tòmò in Soemědang (Preanger) en bij Margasari in Tégál.

Hout van deze 3 soorten zeer hard; hoogst zelden voor huisbouw gebezigd. Wellicht bruikbaar voor pakkisten.

3* MAGNOLIACEAE.

3. TALAUMA JUSS.

Talauma spec. div. — *Tjěmpākā-gāndā*, j. in Midden-Java. — *Tjěmpākā-kěmbang*, j. in Banjoewangi. — *Nōna-leuweung*,

(1) De vet gedrukte nummers vóór de namen der geslachten en familien zijn gewone volgnummers.

s. in Zuid-Djampang (Preanger). — In sommige streken van Java de inl. naam onbekend.

Hout onbruikbaar.

4. MICHELIA LINN.

Michelia spec. div. — *Manglit*, s.; *Tjěmpaka*, s.; *Tjěmpakaleuweung*, s.; *Mangli*, j.; *Tjěmpakâ-djai*, j.; *Tjěmpòkòh-manglèh*, md.; *Kěmpheung*, md.; *Manglèh*, md.; *Kěmpheung-tjheueh*, md.; *Kajoe-kěmbang*, j.; *Kadjoe-kěmpheung*, md.; *Rěsiki*, j.; *Kančil-alas*, j. (*Kančil-wânâ*, j.) — Soms ook *Baròs*, j.; bij voorbeeld op den Goenoeng Wilis in Madioen.

Hout van al deze soorten bijzonder duurzaam sterk en fraai; en soms in zeer groote afmetingen te krijgen. Voor huisbouw en meubels zeer gezocht.

5. MANGLIETIA BL.

Manglietia spec. — *Baròs*, s. j. — Dikwijls ook *Manglit*, s. — In Midden-Java niet zelden zonder inlandschen naam; dáár soms tot *Woeroe*, j. gerekend.

Hout bijzonder duurzaam en fraai en in groote afmetingen te krijgen. In West-Java voor huisbouw en meubels gezocht. In Midden-Java de deugdzaame eigenschappen weinig bekend.

6. CULTURBOOMEN:

Michelia spec. A. — *Tjěmpakâ-poetih*, j.; *Tjěmpakah-pòtèh*, md.; *Tjěmpaka-bòdas*, s. — In Banjoewangi *Pětjaripoetih*, j. —

Hout als soort B.

Michelia spec. B. — *Tjěmpaka*, s. ml.; *Tjěmpaka-koening*, s.; *Pětjari-koening*, j. of *Lòtjari*, j. in Banjoewangi; *Kančil*, j. in Samarang. *Kěmpheung-kheunhing*, md. bij Soembéwaroe in Běsoeki.

Hout voor pakkisten bruikbaar, doch zelden gekapt aangezien de bloemen zeer gezocht zijn.

7* ANONACEAE.

7. STELECHOCARPUS BL.

Stelechocarpus spec. — *Boerahòl*, s.; *Kěpěł*, j. in Midden-Java.
De naam *Kěpěł*, j. beantwoordt in Zuid-West-Běsoeki bij Poeger aan *Cynometra ramiflora* L.
Hout misschien bruikbaar voor pakkisten.

8. CANANGA BL.

Cananga spec. — *Kananga*, s.; *Kěnangah*, md.; *Kěnāngǎ*, j. —
Wāngsā, j. in Banjoewangi. — *Sěkra*, j. of *Kěmbang*, of
bij Paré in Kědiri. — Bij Tjilatjap: *Kadjěng-sěkar*, j.
Hout voor pakkisten.

9. POLYALTHIA BL. (*Guattaria*).

Polyalthia spec. div. — *Kalak*, md. j. — Meestal nog met een
„soort”-naam er achter; b. v.: *Kalak-babal*, j.; *Kalak-gěđang*, j. in Banjoewangi; *Kalak-prit*, j. en *Kalak-koenjit*, j. bij Tjilatjap.
Hout van enkele soorten voor pakkisten misschien bruikbaar.

10. SACCOPETALUM BENN.

Saccopetalum spec. — *Djanglòt*, j. — Determinatie nog onzeker.
Hout voor lansstelen gezocht; niet in groote afmetingen te krijgen.

11. ANONACEAE spec. div. — of geheel zonder inlandschen naam; of *Kalak*, j. md. of door zeer locale en onvaste namen aangeduid; b. v.: *Ki-saoehoen*, s. en ? *Ki-pědēs*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger; *Noemi*, md. bij Pantjoer in de bergstreken van Běsoeki. — Die namen gelden nu eens voor één, dan weer voor meer soorten van dezelfde of verschillende geslachten.

12. CULTUURBOOMEN:

Anona L.

Hout van alle 3 soorten onbruikbaar.

Anona spec. A. — *Nāngkā-lāndā*, j.; *Nāngkā-landi*, j.; *Nangka-blanda*, s.; *Swirswak*, ml. (in enkele kustplaatsen); *Zuurzak*, holl.

Anona spec. B. — *Sirikājā*, j.; *Srikājā*, j.; *Sirikaja*, ml. — In N. O. Běsoeki *Sarkadjeuh*, md.

Anona spec. C. — *Mloewā* j.; *Nōna*, s.; *Boewah-nōna*, s.; *Moelwā*, j.

Cananga spec. — Waarschijnlijk slechts een variëteit met sterk-riekende bloemen van de bovenvermelde *Cananga*-soort.

Hout voor pakkisten; maar bloemen zeer gezocht en daarom moeilijk te krijgen.

13* CAPPARIDACEAE.

13. CAPPARIS LINN. (*Niebuhria*).

Hout van beide soorten onbruikbaar.

Capparis spec. div. — *Klèdoeng*, j.; *Klèthoeng* md.

Capparis spec. — *Kěntjoeran*, j. in Poegěr (Běsoeki).

14. CRATAEVA LINN.

Crataeva spec. — *Baroendaj*, s. in Zuid-Preanger bij Palaboehan.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

15* BIXACEAE.

15. SCOLOPIA SCHREB.

Scolopia spec. — Meestal zonder inl. zonder naam; soms wel eens

? *Roekĕm*, j. s. genoemd. Bij Tjilatjap: ? *Kĕmandĕn*, j.

Hout onbruikbaar.

16. FLACOURTIA COMM.

Flacourirta spec. 1 v. 2 — *Roekĕm*, j. s. md; *Koepa-landak*, s. of *Kòpò-landak*, s. in enkele streken van den Preanger.

Hout veel voor rijststampers gebezigd; zeer hard; maar in kleine afmetingen.

Flacourtia spec. — *Saradan*, j. in Oost-Madioen; *Bogòh*, j. in Midden-Samarang. Locaal vaste namen.

Hout onbruikbaar.

Bennetia MIQ.; *Xylosma* FORST en *Bergsmia* BL.: Inlandsche namen onbekend.

17. PANGIUM REINW.

Pangium spec. — *Pitjoeng*, s. de boom en *Kloewak*, s. de vruchten en zaden — *Poetjoeng*, j. in Midden-Java de boom en *Kloewak*, j. de zaden en vruchten. — *Pakĕm*, j. de boom en *Kloewĕg*, j. de zaden en vruchten in Banjoewangi.

Hout voor pakkisten bruikbaar; doch niet uitgelooog vergiftig.

18. TARAKTOGENOS HASSK.

Taraktogenos spec. — *Kandar-loetoeng*, s. of *Ki-loetoeng*, s. in Zuid-Preanger en Zuid-Bantĕn.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

19. CULTUURBOOMEN:

Flacourtia spec. — *Lobi-lobi*, ml. in de Kota-Batavia.

Hout onbruikbaar.

Bixa spec. — *Kĕsoembā-kling*, j.; *Kĕsoembā*, j.; *Glinggĕm*, j.; *Kĕsoembā-kling*, ml. — In Banjoewangi *Gĕloegā* j. of *Gloegā*, j.

Hout onbruikbaar.

20* PITTOSPORACEAE.

20. PITTOSPORUM BANKS.

Pittosporum spec. — *Ki-hòndjè*, s. — In Midden- en Oost-Java òf zonder inl. naam òf met zeer locale namen. Veelal door de inlanders met andere boomsoorten verward. Op den G. Sèndarā in Bagèlèn en bij Pringāmbā in Banjoemas *Tjòmbrangan*, j., een naam, die dezelfde beteekenis heeft als *Ki-hòndjè*, s. daar *Tjòmbrang* gelijk is aan *Hòudjè*.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar

Pittosporum spec. — ? *Kalang-mangkheuh*, md. bij Pantjoer in de afd. Panaroekan van Běsoeki.

Hout onbruikbaar.

21* POLYGALACEAE.

21. XANTHOPHYLLUM RXB.

Xanthophyllum spec. 1 v. 2 — *Ki-ěndòg*, s. — In Midden- en Oost-Java de inl. namen zeer onzeker of zeer lokaal.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

22* HYPERICACEAE.

22. CRATOXYLON BL. (*Tridesmis*).

Cratoxylon spec. A. — *Maróng*, j. of *Maròu*, j. in Banjoemas. — In Samarang inl. naam onbekend. — *Rěmoeng-boetoen*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — Bij

Tjilatjap in Zuid-Banjoemas *Ampët*, j.; deze naam zeer lokaal.

Hout bruikbaar voor huisbouw.

Cratoxylon spec. — *Ki-rěměng*, s. of *Harěměng*, s. In Midden-Java echter meestal door de inlanders met andere boomsoorten verward; en de namen zeer lokaal. — Bij Pingāmbā in Oost-Banjoemas evenals de vorige soort *Maròng*, j.

Hout misschien bruikbaar voor pakkisten.

23* GUTTIFERAE.

23. GARCINIA LINN.

Hout van de grootste dezer soorten misschien voor pakkisten of huisbouw bruikbaar.

Garcinia spec. A. — *Tjeuri*, s.; soms ook? *Ki-tjeuri*, s.; constant in geheel West-Java. In vele streken van Midden-Java (Samarang, Banjoemas) *Kěmčljing*, j. — In Banjoewangi: *Wadoeng*, j. — In sommige deelen van Midden-Java zonder inl. naam.

Garcinia spec. B. — *Manggoe*, s.; *Manggis*, j.; *Manggistan*, ml.

Garcinia spec. C. — *Moendoe*, j. *Moendoe* s., in Midden- en West-Java. — *Moenděr*, j. in Banjoewangi. — *Glédòg-pantò*, s. in Preanger en Banten.

Garcinia spec. div. — *Manggoe-leuweung*, s.; *Glédòg-pantò*, s.

24. OCHROCARPUS THOUARS (*Calysaccion*).

Ochrocarpus spec. — *Kapoerantjak* of *Njampoeng-laki*, bg. (2j.) aan Zuid-kust Banjoewangi.

Hout? duurzaam.

25. **CALOPHYLLUM LINN.**

Calophyllum spec. A. — *Njamploeng*, s. j.; vaste aan de meeste inlanders bekende naam. — *Kapoerantjak*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas.

Hout bijzonder duurzaam; zeer fraai; voor huis- en scheeps-bouw en meubels; wel in zware, maar niet in lange afmetingen te krijgen.

Calophyllum spec. B. — Bij Tjilatjap *Tjěngal*, j.; weinig verspreide en slechts aan enkele inlanders bekende soort. — Inl. naam lokaal, elders voor andere boomsoorten geldend.

Hout lokaal voor huisbouw om duurzaamheid geroemd.

Calophyllum spec. C — Bij Tjilatjap *Slatri*, j. — Lokaal vaste naam. Elders door mij niet gevonden.

Hout lokaal om de duurzaamheid voor huisbouw geroemd.

Calophyllum spec. D. — ? *Sětri* j. bij Kědoengdjati in Samarang. Naam zeer lokaal.

Hout ? duurzaam.

Calophyllum spec. div. — De berg bewonende soorten meestal zonder inl. naam of met vaak wisselende zeer locale namen. Een der het strand bewonende soorten bij Palaboehan in Zuid-Preanger: *Kapoerantjang*, s.

Hout ? onbruikbaar.

26. **CULTURBOOMEN:****MESUA LINN.**

Mesua spec. — *Nāgāsari*, j.; *Nagasari*, s. ml. — In sommige streken hebben een paar *Eugenia*-soorten ook dezen naam.

Hout onbruikbaar; bijzonder hard.

27* TERNSTROEMIACEAE.

27. TERNSTROEMIA LINN.

Ternstroemia spec. 2 v. ? 3. — Inl. namen òf weinig bekend en zeer lokaal òf geheel onbekend; echter van één soort bij Pantjoer in Běsoeki de inl. naam zeer vast, namelijk: *Nangpěnangan*, md.

Hout voor pakkisten bruikbaar.

28. EURYA THUNB.

Hout van al de javaansche soorten onbruikbaar.

Eurya spec. div. — Inl. namen òf alleen van zeer locale òf geheel zonder waarde. Deze soorten door de inlanders vaak met andere speeies verward. — Op G. Sěndārā in Kědōe en bij Pringāmbā in Oost-Banjoemas: *Sadan*, j.

29. ADINANDRA JACK.

Adinandra spec. — Inl. namen òf onbekend òf zeer lokaal en onbetrouwbaar.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.

30. SAURAUJA WILLD.

Hout onbruikbaar.

Saurauja spec. div. — In West-Java worden alle soorten constant *Ki-lěhò*, s. genoemd; daarbij komt dan veelal een soort-naam achter het woord; bijv. *Ki-lěhò-badak*, s.; *Ki-lěhò-beureum*, s.; *Ki-lěho-borloe*, s. — In bijna geheel Midden-Java zijn enkele der meer algemeen voorkomende soorten aan de inlanders onder den naam *Oembělan*, j. bekend; terwijl de zeldzamere soorten dáár meestal òf zeer locale of in het geheel geen inl. namen hebben. — In enkele deelen van Midden-Java zijn voor één of meer *Saurauja*-soorten o. m. een der volgende namen in gebruik: *Tjoewoet*, j. in de bergstreken van Oost-Madioen. — In Oost-Java bij Pantjoer (in Běsoeki)

heet een der soorten *Boeloe*, md. terwijl dáár een paar andere soorten aan de inlanders niet bij name bekend zijn.

31. **PYRENARIA** BL.

Pyrenaria spec. 2. — Zonder inl. naam; zoowel in West- als in Midden-Java.

Hout onbruikbaar.

32. **SCHIMA** REINW.

Duurzaam bouwhout.

Schima spec. (*Schima Noronhae* REINW.) — *Poespa*, s. — Een paar variëteiten worden in enkele streken van de Preanger nog als volgt aangeduid: *Poespa-beureum*, s.; *Poespa-bôdus*, s.; *Poespa-mèrang*, s.

33. **GORDONIA** ELLIS (*Polyspora*).

Gordonia spec. (*G. excelsa*, BLUME et *G. integerrima* T. et B.) — In Oost-Java bij Pantjoer (Běsoeki) aan de inlanders geheel onbekend. In West-Java soms met *Poespa*, s. verward; soms door een afzonderlijken lokalen naam aangeduid; bijv.: *Hoeroe-kěmandjél*, s. of *Ki-mandjél*, s. bij *Takòka* in Djampang- wètan (Preanger).

Duurzaam? bouwhout.

34. **CAMELLIA** LINN. (*Calpandria*).

Camellia spec. — Zonder inl. naam op de mij bekende standplaatsen in de Preanger.

Hout onbruikbaar.

35. **CULTURBOOMEN:**

Camellia (*Thea*) spec. — *Tèh*, s. j. — De *Assam-thee-boom*.

Hout alleen voor wandelstokken bruikbaar.

36* DIPTEROCARPACEAE.

Al deze soorten met hout, dat voor pakkisten en misschien ook voor huisbouw bruikbaar is.

36. DIPTEROCARPUS BL.

Dipterocarpus spec. div. — *Plalar*, j.; *Klalar*, j. *Palahlar*, s. in West- en Midden-Java. — In Z. W. Bantën soms *Parahlar*, s.; doch meestal *Palahlar*, s. — Op den G. Moeria in Djapara :? *Děrmôlâ*, j.

37. VATICA LINN.

Vatica spec. — *Tjěngal*, s. in Z. W. Bantën bij Tjémara; zeer locale naam. Elders andere boomen zóó genoemd.

38. DOONA THW.

Doona spec. — Inl. naam en boom op Java mij nog niet bekend.

39* MALVACEAE.

39. HIBISCUS LINN.

De *Waroe*, waarvan de schors bij voorkeur voor touwslagerij gebezigd wordt, heeft bijzonder deugdzaam hout dat o. a. voor geweerdaden bruikbaar is, doch niet in groote afmetingen te krijgen; de soort A levert verder bruikbaar klein bouwhout; doch het hout van de beide andere soorten is onbruikbaar.

Hibiscus spec. div. (met uitzondering van 2 soorten) *Waroe*, j. s. of *Beuroeh*, md., waarbij dan voor twee der soorten een soortnaam komt, die lokaal nogal varieert. Voor de derde soort: de *Waroe*, waarvan vooral touw gemaakt wordt, is veelal alleen het woord *Waroe* in gebruik. Deze laatste soort heet in Midden-Java vaak *Waroe-lěngis*, j.; in Běsoeki *Beuroe-kópě*, md.; bij Tjilatjap *Waroe-lengâ* j. en bij Pringambâ in Oost-Java *Waroe-*

rangkang, j. — De andere soorten worden dikwijls met een der hieronder volgende namen aangeduid:

Hibiscus spec. A. — *Waroe-goenoeng*, j.; *Waroe-pajoeng*, j. of *Waroe-sòngsòng*, j. in Samarang, Pěkalongan, enz. — *Tisoek*, j. of *Tisoek-těmbaga*, s. in de geheele Preanger. — Bij Pringambā in Oost-Java: *Waroe-dějmbœt*, j. In Bantěn *Těsoek*, s.

Hibiscus spec. B. — *Waroe-gòmbông*, j. en *Waroe-kòpěh*, j. in Midden-Java; soms ook wel eens? *Waroe-lěngis*, j. In Oost-Java *Beuroe-kheutjheu*, md. — Misschien behoort hiertoe *Waroe-rangkang*, j. van Tjilatjap.

Hibiscus spec. C. — *Ki-òraj*, s. in Z. W. Bantěn bij Tjěmara. Met dezen naam in de Preanger een andere boomsoort aangeduid. — In Midden-Java meestal zonder inl. naam; bij Pringambā in Oost-Banjoemas *Waroe-gěli*, j.

40. THESPESIA CORR.

Thespesia spec. — *Waroe-lòt*, j. in Banjoewangi. — In Bantěn nu eens met *Hernandia sonora* L. verward, dan weer bij name geheel onbekend. — Soms bijv. bij Tjilatjap evenals een der *Hibiscus*-soorten *Waroe-laoet*, s. genoemd.

41. BOMBAX LINN.

Bombax spec. 2 — *Dangdeur*, s.; *Randoe-agoeng*, j.; *Randoe-leuweung*, s.; *Dangdeur-leuweung*, s.; *Randoe-alas*, j.; *Randoe-wânâ*, j. — Een dezer namen aan de meeste inlanders bekend en alle zeer constant.

Hout voor pakkisten; in reusachtige afmetingen te krijgen.

42. DURIO LINN.?

Durio spec. — *Doerén*, j. s.; *Kadoe*, s. in de Preanger; *Dœrian*, ml. in Batavia. — In Banjoewangi heet een geheel andere boomsoort constant *Kadoe*, j. of *Kědoe*, j. (zie hieronder *Sideroxylon*).

Hout bruikbaar voor huisbouw, mits uitgeloozd.

43. NEESIA BL.

Neesia spec. — *Běngang*, s. — Zeer constante naam.

Hout voor pakkisten.

44. CULTURBOOMEN:

Hibiscus spec. — *Kěmbang-spatoe*, s. j. ml. — Meestal slechts een heester; zelden een boomheester.

Hout onbruikbaar.

45* STERCULIACEAE.

45. STERCULIA BL.

Hout van al deze soorten voor pakkisten. Vaak in zeer groote afmetingen te krijgen.

Sterculia spec. A. — *Kěpoeh*, j.; *Kěpòh*, j. s. in geheel Java aan bijna elk inlander bekend. — In Běsoeki: *Kloempang*, md.

Sterculia spec. B. — *Woenoeng*, j.; *Moenoen*, j.; *Wining*, j. Bijna geheel Midden- en Oost-Java; — *Binòng*, md. in Běsoeki. — *Binòng*, s. of *Beurih*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger; — *Tòngtòlòk*, s. bij Soemědang in Oost-Preanger. — De Namen *Woenoeng*, j; en *Wining*, j. zijn het meest algemeen. — De vruchten, soms ook de boom zelf, heeten in Midden-Java o. a. in Banjoemas en Samarang: *Sriwil*, j. of *Sriwil-iwil-iwil*, j. — Niet zelden met *Winòng*, j. (*Tetrameles*) verward.

Sterculia spec. C. — *Antap* j.; *Hantap*, s.; *Tjhěphoek*, md. — In Banjoewangi echter *Talěs*, j. of *Talěsan*, j. geheeten, even als elders in vele streken van Java een *Colocasia* soort.

Sterculia spec. D. — *Hantap-heulang*, s. in Preanger. — *Dòk*, j. bij Soebah in Pěkalongan. — *Kalòng*, j. of *Kalongan*,

j., evenals de volgende soort, in bijna geheel Oost- en Midden-Java.

Sterculia spec. E. — Inl. namen veelal als de vorige; niet zelden geheel onbekend of zeer lokaal. In Bantën op den G. Poelasari: *Hantap-dapoeng*, s. of alleen *Hantap*, s. genoemd. In Zuid Běsoeki evenals soort D constant *Kalòng* j. geheeten.

De meeste verschillende soorten van *Sterculia* zijn bij de inlanders onder geheel verschillende namen bekend. Een drietal soorten (C, D, E) worden met een gemeenschappelijken naam *Hantap*, s. aangeduid; daarbij komt dan een soortnaam, die veelal lokaal varieert b. v. *Hantap-heulang*, s.; *Hantap-dapoeng*, s. — Volgens Dr. BOORSMA zijn de zaden van een of meer dezer *Sterculia*-soorten in den inlandschen medicijnhandel als zoete *Prânâ-djinâ*-pitten bekend, terwijl de bittere (? echte) *Prânâ-djinâ*, j. de vruchten van *Euchresta Horsfieldii* BENN. zijn.

46. TARRIETIA BL.

Tarrietia spec. 1. v. 2. — *Galoempit*, s.; *Ki-mèong*, s.; of *Ki-matjan*, s. bij Palaboehan aan Zuidkust Preanger. Namen zeer lokaal en van weinig waarde. Elders op Java vooral een *Terminalia* soort *Galoempit*, j. of *Kloempit*, j. geheeten. In Z. W. Bantën bij Tjëmara: *Ki-mèong*, s. of *Ki-pòlèng*, s.

Hout voor pakkisten.

47. HERITIERA ALT.

Heritiera spec. — *Balang-pasir*, j. bij Poegër in Zuid-Běsoeki. — Bij Tjilatjap in Banjoemas en in Z. W. Bantën soms *Doengoen*, s. j. geheeten; dáár echter evenals elders veelal aan de inlanders weinig bekend en met andere soorten verward. In Zuid-Preanger soms *Tjêrlang-laoet*, s. geheeten.

Hout voor pakkisten.

48. **TETRADIA** BROWN. — Inl. naam en boom aan mij nog onbekend. Zeer zeldzame boom.

49. **REEVESIA** BROWN.

Reevesia spec. — Inl. naam op de eenige mij bekende groeiplaats bij Tjigèntèng in het distr. Tjisondari (Preanger) onbekend.

50. **KLEINHOVIA** LINN.

Kleinhowia spec. — *Timâhâ*, j.; *Kĕtimâhâ*, j.; *Kĕtimângâ*, j.; *Timângâ*, j.; — *Kĕtimaha*, s. j. in Preanger en Westelijk deel van Midden-Java. — *Tangkôlò*, s.; of *Tangkèlè*, s. in Z. W. Bantĕn en Zuid-Preanger. — *Kĕtimâ*, j. bij Poegĕr in Zuid-Bĕsoeki. — *Mangar*, md. in West-Bĕsoeki. — Het gevlekte hout van dezen boom heet, evenals dat van enkele andere boomsoorten *Pĕlĕt*, j. s. md.

Hout voor pakkisten en wellicht ook voor snijwerk. Het gevlekte hout buitengewoon gezocht voor krischeden en lansstelen.

51. **PTEROSPERMUM** SCHREB.

Pterospermum spec. A. en B.? — *Bajoer*, s. j. constant in geheel West-Java; zoomede in de residentieën Bĕsoeki en Prâbâlinggâ. — *Badjoer*, md. in Bĕsoeki. — *Walang*, j.; of *Wadang*, j. in Madioen, Djapârâ en Samarang — *Wajoe*, j. in Zuid-Banjoe-mas en Pĕkalongan. — Op den G. Geloenggoeng in de Preanger *Tjajoer*, s.

Hout duurzaam en sterk. In lange afmetingen en in nogal groote hoeveelheden te krijgen.

Pterospermum spec. C. — *Tjĕrlang*, s. constant in geheel West-Java. — *Balang*, j. of *Walang*, in Samarang en

De in Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indië l. c. genoemde *Sterculiaceae*-geslachten *Helicteres* en *Abroma* zijn op Java alleen door heesters of kleine boomheesters vertegenwoordigd.

Zuid-Běsoeki. Ook wel eens *Wadang*, j. geheeten; b. v. in Samarang.

Hout duurzaam; doch zelden in voldoende afmetingen.

52. **MELOCHIA** LINN. (*Visenia*).

Melochia spec. — *Bintinoe*, s. in geheel West-Java constant. — *Sěnoe*, j. in geheel Midden-Java en *Wisnoe*, j. in geheel Běsoeki. — *Bisnòh*, md. in Panaroekan (Běsoeki).

Hout onbruikbaar.

53. **COMMERSIONIA** FORST.

Commersonia spec. — *Ki-òraj* s. bij Takòka en Palaboean in de Preanger. — *Ki-tjareuh*, s. of *Handèong*, s. in Z. W. Bantěn bij Tjěmara. — In Banjoemas en Pěkalongan aan de inlanders niet onder een vasten naam bekend. In de eerste residentie soms *Blěntjông*, j. geheeten. Deze naam echter zeer lokaal (bij Tjilatjap) en van weinig waarde.

Hout onbruikbaar.

54. **CULTURBOOMEN:**

Guazuma spec. — *Djati-blanda*, ml. s.; *Djati-lândā*, j.; *Djati-landi*, j.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar; voor kruit-fabricatie gezocht.

55* **TILIACEAE.**

(excl. ELAEOCARPACEAE).

55. **PENTACE** HASSK.

Pentace spec. — *Sigeung*, s. in Z. W. Bantěn en Zuid-Preanger. — Soms in de Preanger b.v. bij Palaboehan: ? *Ki-sindoe*k, s. of *Ki-mèong*, s. — Laatste genoemde namen

onzeker (zie boven) en lokaal; de eerstgenoemde echter vrij constant.

Hout voor pakkisten.

56. GREWIA LINN.

Grewia spec. div. — De verschillende soorten van dit geslacht worden door de inlanders veelal met elkander verward; slechts met een drietal soorten is dit minder het geval; n.l. *Oeris-oerisan*, j.; *Talòk*, j.; en *Děloewak*, j. of *Dròwak*, s.

Behalve ééne soort, de echte *Talòk*, j. van Samarang, welke hout levert, dat vooral voor stelen van bijlen gezocht is, schijnen de javaansche *Grewia*-soorten slechts weinig bruikbaar hout te leveren. Misschien is het hout van soort B nog bruikbaar voor pakkisten.

Grewia spec. A. — *Oeris-oerian*, j. in geheel Midden-Java. — Namen in West-Java echter lokaal of onzeker.

Grewia spec. B. — *Děloewak*, j.; *Dloewang*, j.; *Dloewak*, j.; *Dròwak*, s. — Geheel Java. Echter heet *Broussonetia* in Kēdīri ook *Dloewang*, j.

Grewia spec. 3 (C, D en E.) — *Talòk*, s. j. md.; — *Tanglòk*, md. Hierbij zijn in Noord-Banjoewangi nog achtervoegsels in gebruik ter aanduiding van andere soorten; b. v. *Talòk-kapòr*, md.; *Talòk-běngkòh*, md. — De naam *Talòk*, j. in Samarang geldt echter constant voor één enkele soort.

Grewia spec. F. — *Tangkeudjoengan*, md. — Ook de voorgaande soorten soms aldus genoemd.

57. COLUMBIA PERS.

Columbia spec. — *Sampòra*, s. constant in de Zuid-Preanger. — In Z. W. Bantēn *Sampòra*, s. of *Djaloe pang*, s. genoemd.

Hout voor pakkisten.

Diplofractum, DESF. (zie Natuurk. Tijdschr. l. c.) is op Java waarschijnlijk slechts door een heester, niet door een boomsoort vertegenwoordigd.

58. **TRICHOSPERMUM** BL.

Trichospermum spec. — *Dòlòg*, s. j. in geheel West-Java en bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas. — Inl. naam zeer constant.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; schors zeer gezocht voor touw.

59. **SCHOUTENIA**. KORTH.

Schoutenia spec. A. — *Harikoekoekoen*, s. en *Walikoekoekoen*, j. zeer vaste namen. — In West-Běsoeki *Kòkòn*, md. — Een variëteit dezer soort heet in Samarang bij Kědoengdjati *Landji*, j. — In Pěkalongan bij Soebah heet de boom, zoowel *Walikoekoekoen*, j. als *Landji*, j. — In Banjoewangi soms ook *Likoekoekoen*, j.

Hout duurzaam; bijzonder gezocht voor karrenboomen, lansstelen en stelen van bijlen. Niet in groote afmetingen te krijgen.

Schoutenia spec. B. — Meestal *Sindoeck*, j.; soms ook *Walikoekoekoen*, j. genaamd bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas. Door mij alleen op deze standplaats gevonden.

Hout lokaal voor huisbouw zeer geroemd.

60* **ELAEOCARPACEAE**.60. **ECHINOCARPUS** BLUME.

Echinocarpus spec. — *Bělēkětěbèh*, s. of *Boeloe-noenggoel*, s. in de Preanger een vaste naam; eveneens is voor Běsoeki *Kěsompheuh*, md. of ? *Kěsompheuh-kling*, md. een vaste naam. De laatste naam wordt echter elders op Java vooral aan *Bixa Orellana* L. gegeven.

Hout voor pakkisten.

61. ELAEOCARPUS BL. (*Acronodia*, *Monoceras*).

Hout van al deze soorten, behalve van soort G, welke te klein is, voor pakkisten bruikbaar.

Elaeocarpus spec. div. — Slechts een viertal javaansche *Elaeocarpus*-soorten worden op Java met vaste of nogal vaste inl. namen aangeduid; namelijk. *Rědjāsā*, j.; *Djanitri*, of *Ganitri*, j.; *Katoelampak*, s.; of *Talilampak*, j.; en *Kěměsoe*, j. of *Kěměsoh*, md. van Běsoeki. Van de overige *E.*-soorten worden velen niet zelden door de inlanders met andere boomsoorten verward; terwijl sommigen nu eens *Ganitri*, j.; of *Djanitri*, s. (soms ook ? *Glitri*, md.) of *Slětrěh*, md. dan weer met de namen *Katoelampak*, s. of *Talilampak*, j. worden aangeduid. De soorten met aan de onderzijde blauwgrijs-gekleurde bladeren (zooals *E. obtusus* BL., *E. dentatus* REINWT), zoomede enkele anderen (zooals *E. Acronodia* BL.) worden zoowel door de Soendaneezen als Javanen tot de soorten van *Woeroe*, j. of *Hoeroe*, s. gerekend. Namen als *Hoeroe-djanitri*, s.; en *Hoeroe-kòdja*, s. behooren b. v. tot deze categorie. — De naam *Hawoean*, s. of *Hahawoean*, s. wordt in enkele streken van de Preanger aan een paar *Elaeocarpus*-soorten gegeven. — Er zijn verscheidene *E.*-soorten, vooral die der hoogere bergstreken, waarvoor de inlanders òf geen naam weten òf alleen zeer locale en onzekere namen hebben.

Elaeocarpus spec. A. — *Rědjāsā*, j.

Elaeocarpus spec. B. — *Djanitri*, s. j.; *Ganitri*, s. j.

Elaeocarpus spec. C. — *Kěměsoe*, j.; *Kěměsoh*, md. in Běsoeki constant. — In Kědiri *Měsoe*, j.

Elaeocarpus spec. D. — *Katoelampak*, s.; *Talilampak*, j.

Elaeocarpus spec. E. — *Angkoep-angkoep*, j. bij Tjilatjap. Deze soort heeft een stam, die op steltwortels staat.

Elaeocarpus spec. F. — *Ki-òraj*, j. Deze oorspronkelijk soendaneesche naam wordt bij Tjilatjap constant aan een *Elaeocarpus* soort en niet zooals in de Preanger aan *Commersonia spec.* gegeven.

Elaeocarpus spec. G. (*Acronodia*) — Meestal zonder inlandschen naam, zoo bijv. op den G. Oengaran en op de meeste bergen in West-Java. — Op den G. Gëdé bij Tjibòdas soms *Djanitri*, s. genoemd. — Soms tot *Woeroe*, j. of *Hoeroe*, s. gerekend.

Elaeocarpus spec. H. — *Handoel*, j. in Banjoewangi; locale naam.

62* GERANIACEAE.

62. AVERRHOA L.

. Hout van beide soorten onbruikbaar.

Averrhoa spec. A. — *Blimbing*, j.; *Phlimping*, md.; *Tjalintjing*, s. In Samarang bij Këdoeng-djati: *Blimbing-alas*, j.; *Blimbing-lingir*, j. bij Poegër in Běsoeki.

Averrhoa spec. B — *Blimbing-woeloeh*, j. in Midden-Java. — In N. O. Běsoeki *Phlimping-boeloe*, md. — In Pěkalongan heet bij Plèlèn de soort A. steeds *Blimbing-alas*, j. en deze soort B: *Blimbing-woeloeh*, j. — In Djampang-koelon heet deze soort B.: *Tjalintjing*, s. en de soort A.: *Blimbing*, s. — Bij Tjěmara in Z. W. Bantěn heet soort B: *Tjalintjing-woelět*, s.

63. CULTURBOOMEN:

Averrhoa spec. A. (var.) — *Blimbing-manis*, j. ml.; *Phlimping-manès*, md.; *Tjalintjing-manis*, s.

Hout onbruikbaar.

64* RUTACEAE.

64. **EVODIA** FORST. (*Philagonia*).

Hout dezer soorten misschien voor pakkisten bruikbaar.

Evodia spec. — *Sampang*, j. in Banjoewangi. — *Ki-sampang*, s. in Preanger. — Op G. Slamat in Těgal Těmpajang, j. of Sěmpajang, j.

Evodia spec. — *Hawal*, j. of *Awal*, j. in Banjoewangi; *Abeul*, md. bij Sěmpolan in Běsoeki.

Evodia spec. — Soms *Sampang*, j. md. geheeten; soms zonder of met onzekeren inlandschen naam; bijv. *Loh-kheureung* md. bij Pantjoer in Běsoeki; terwijl elders in Běsoeki laatstgenoemde naam met een klein dialect-verschil vrij constant aan een *Alstonia*-soort gegeven wordt.

Evodia. (*Philagonia*) **spec.** — *Ki-bajawak*, s. in Zuid-Preanger; — *Měnjawak*, j. bij Pringāmbā in Banjoemas; — *Tjěmbawak*, j. in Banjoewangi.

65. **ZANTHOXYLUM** L.

Zanthoxylum spec. — *Kajoe-lěmah*, j.; *Kadjěng-siti* j.; *Lěmah*, j. — Deze namen in geheel Midden-Java vrij constant. Slechts ook voor een zeldzame *Linociera*-soort werd mij op één plaats, n.l. bij Kědoeng-djati in Samarang deze naam in loco opgegeven. — In Zuid-Preanger: *Ki-tanah*, s. of *Ki-taneuh*, s. — Bij Plèlèn in Pěkalongan *Kětjipiran*, j.

Hout nogal duurzaam en fijn; echter niet in groote afmetingen.

66. **MICROMELUM** BL. (*Cookia*).

Micromelum spec. — Inl. namen zeer lokaal en onzeker. In vele streken van Java aan de inlanders bij name geheel onbekend. — Bij Kědoeng-djati in Samarang

veelal *Tlauras*, j. of *Lawas*, j. geheeten; bij Pring-
ambâ in Oost-Banjoemas *Sentanèn*, j.

Hout onbruikbaar.

67. MURRAYA L.

Murraya spec. — *Këmoening* j. s.; *Këmònèng*, md. — Een va-
rietëit heet in Samarang bij Këdoeng-djati en bij Pare
in Këdiri *Djénar*, j. — In Banjoewangi en bij Soembër-
waroe (Bësoeki) heet de *Këmoening*, j. veelal *Tajoe-*
man, j. of *Tadjoeman*, j.

Hout duurzaam, zeer fijn en fraai; echter alleen in zeer
kleine afmetingen te krijgen. Bijzonder gezocht voor
wapengevesten.

68. ACRONYCHIA FORST.

Hout van beide soorten of geheel onbruikbaar of mis-
schien voor pakkisten geschikt.

Aronychia spec. A. — *Ki-djërœk*, s. in vele streken van den
Preanger. Niet zelden, vooral in Midden Java zonder
inlandschen naam. — Soms b. v. bij Tjilatjap in Z.-
Banjoemas: *Djërœkan*, j.; — *Ki-salira*, s. in Z. W.
Bantën bij Tjemara; zeer locale naam.

Acronychia spec. B. — *Tjèrmèh-alas*, md. in Bësoeki bij Pan-
tjoer in de bergstreken.

69. FERONIA CORREA.

Feronia spec. — *Kawistâ*, j.; *Kawistâ-krikil*, in Samarang bij
Këdoeng-djati.

Hout als *Aegle* No. 70.

70. AEGLE CORREA.

Aegle spec. — *Madja*, s. nl.; *Mâdjâ*, j.; *Bileu*, md. in Bësoeki.

Hout fijn, fraai en duurzaam; voor wapengevesten nogal
gezocht; niet in groote afmetingen te krijgen.

Noot. — De *Rutaceae*-geslachten: *Glycosmis* CORR. *Limonia* L. en *Clausena*
BURM. zijn waarschijnlijk op Java niet door wildgroeiende boomvormige species
vertegenwoordigd.

71. CULTUURBOOMEN:**CITRUS LINN.**

Citrus spec. div. — *Djěroek*, j. s. ml.; *Tjhěroek*, md. met achtervoeging van inlandsche soortsnamen.

Hout fijn, fraai en duurzaam; voor fijn schrijnwerk gezocht, echter niet in groote afmetingen te krijgen.

72* SIMARUBACEAE.**72. PICRAMMA BL.**

Picrasma spec. — Inl. namen zeer lokaal en onzeker.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.

73. SAMADERA GAERTN. en Brucea MILL. — Inl. namen door mij niet genoteerd.**74* BURSERACEAE.****74. GARUGA RXB.**

Garuga spec. — *Wijoe*, j.; *Bidjoeh*, md. in geheel Midden- en Oost-Java een vaste naam. — In West-Java aan de inlanders niet bij name bekend. — Soms met *Soerèn*, j. s. (zie hieronder *Meliaceae*) verward.

Hout voor pakkisten.

75. PROTIUM WIGHT.

Protium spec. — *Trěnggoeloen*, j.; *Trěng-khoeloen*, md.; *Tanggoeloen*, j. s.; *Tanghoeloen*, md.; *Těnggoeloen*, j.; *Těng-khoeloen*, md. constante, aan bijna elk inlander bekende namen. — In enkele deelen van Java bijv. in Brěbės (Těgal) *Katòs*, j. bij Tjilatjap *Kětòs*, j. geheeten. — Een

variëteit bij Poegër in Běsoeki heet aldaar *Trěnggoeloen-běrnang*, j. of alleen *Běrnang*, j.

Hout zeer duurzaam fijn en zeer sterk; wel in zware, doch niet in lange afmetingen te krijgen.

76. **CANARIUM L. (*Canariopsis*.)**

Canarium spec. div. — Slechts op enkele plaatsen worden ook de wildgroeïende *Canarium*-soorten door de inlanders *Kěnari* of *Kanari*, j. ml. s.; *Kěnarěh* of *Kanarěh*, md. of soms *Ki-kanari*, s. genoemd. — Eene soort, n.l. *Canarium (Canariopsis) hispidum* BL. wordt door hen nooit tot de *Kanari*-soorten gerekend, maar door lokaal zeer verschillende en onzekere namen aangeduid.

Hout van al deze en de ondergenoemde soorten, weinig duurzaam; slechts van enkele en dan alleen uitgeloogd bruikbaar voor huisbouw; voor pakkisten aan te bevelen. Soort D. is alleen voor pakkisten geschikt.

Canarium spec. A. — *Ki-kanari*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — In Midden-Java soms bijv. bij Tjilatjap *Kanarěn*, j., soms *Kanari-alas*, j. of *Kanari-wānā*, j. geheeten; niet zelden bij name geheel onbekend of met zeer locale namen. Soms alleen *Kanari*, j. In Pěkalongan bij Soebah constant: *Raoe-woelan*, j.

Canarium spec. B. — *Sadjěng*, j. bij Tjilatjap in Banjoemas. Locale naam voor een door mij alleen op deze standplaats gevonden soort.

Canarium spec. C. — *Ki-kanari*, s. of ? *Ki-toewak*, s. in Zuid-Preanger en Z. W. Bantěn.

Canarium spec. D. (*Canariopsis*). — Namen meestal zeer lokaal en onzeker. Veelal met andere boomsoorten o. a. met *Dracontomelum* BL. (*Daœ*, s. of *Raoe*, j.) verward. — In vele streken aan de inlanders niet bij name bekend. — Bij Tjilatjap vaak *Sapi*, j. genoemd.

77. CULTUURBOOMEN:

CANARIUM L.

Canarium spec. — *Kanari*, s. j. ml.; *Kanarèh*, md.

Hout als boven onder *Canarium spec. div.*

78* MELIACEAE.

78. MELIA L.

Melia spec. 2 — 3. — *Mindi*, j. ml.; *Mènthih*, md. in bijna geheel Java. — Eene soort: *Gringging*, j. in Banjoemas bij Tjilatjap en in Pèkalongan bij Soebah. — De naam *Tjikra-tjikri*, ml. voor een vaak gecultiveerde, doch ook wildgroeiende soort is vrij algemeen bekend.

Hout fijn en sterk; mits onder dak, bruikbaar voor huisbouw.

79. AZIDARACHTA A. JUSS.

Azidarachta spec. — *Mèmpheuh*, md.; *Mimbâ*, j. in Běsoeki.
Zeer vaste namen.

Hout voor huisbouw; duurzaam; alleen in korte afmetingen te krijgen.

80. DYSOXYLUM BL. (*Epicharis*, *Didymochiton*, *Hartighsia*, *Goniochiton*.)

Hout van enkele *Dysoxylum*-soorten duurzaam en voor huisbouw zeer geschikt; bijv.: *Lolohan*, j. en *Tjěmpāgā*, j. van Banjoewangi, *Pingkie*, s. en *Kapinangō*, s. van de Preanger; van enkele bruikbaar voor huisbouw bijv. *Kheuroek*, md, van Pantjoer in Běsoeki en *Narap*, j. in Banjoewangi; van andere soorten zeer weinig duurzaam en alleen tot pakkisten geschikt; bij *Kědojā*, j. van Midden- en Oest-Java (*Dysoxylum amooroides* MIQ.) Bijna al de hier niet speciaal genoemde soorten voor pakkisten bruikbaar.

Dysoxylum spec. div. Een betrekkelijk groot aantal boomsoorten van Java behoort tot dit geslacht. De

meesten komen in habitus en vooral in bladvorm nogal veel met elkander overeen, doch vertoonen verder niet zelden zeer uitlopende verschillen in houtqualiteit en andere eigenschappen. — Hierdoor is het niet te verwonderen, dat in sommige streken bepaalde soorten constante inl. namen hebben, terwijl die elders door de inlanders veelal met elkander verward en door hen met onzekere namen aangeduid worden. Slechts een paar der meest algemeen verspreide, der nuttigste en der meest karakteristieke soorten hebben inl. namen, die over een groot deel van Java constant zijn. Doch zelfs ook bij die laatste soorten gebeurt het niet zelden, dat zij in enkele streken wederom met andere *Dysoxylum*- of met geheel andere boomsoorten verward worden.

De meeste hieronder vermelde namen moeten dus min of meer als genus-namen voor *Dysoxylum*, niet als namen voor één enkele soort beschouwd worden. Verwarring met soorten van andere *Meliaceë*-geslachten (vooral *Chisocheton* BL.; *Amoora* RXB, en *Aglaja* LOUR), zoomede met enkele geslachten van andere families; b.v. *Pometia* FORST.; *Sapindus* L.: *Dracontomelum* BL.; *Canarium* L. en *Meliosma* BL.

De volgende namen zijn nogal constant voor één enkele *Dysoxylum* soort: In Banjoewangi: *Lolohan*, j.; *Tjěmpôgô*, j.; (niet-*Tjěmpôkâ*, j.); in de Preanger: *Pingkoe*, s. en *Kopinangô*, s.; alle goede timmerhoutsoorten. Voorts *Kědojâ*, of *Dojâ*, j.; *Kědôja*, s. of *Kěthoedjenh*, md. vooral de naam *Kědojâ*, j. in de lagere streken van Midden- en Oost-Java. Ook *Ki-bawang*, s. is in de Preanger een vrij vaste naam voor één enkele soort.

Tot de namen, die meestal minder scherp aan enkele bepaalde soorten beantwoorden en waarbij de eene met de andere soort vaak verwisseld wordt, mogen o.m. de volgende gerekend worden: *Tonglar*, s.; *Ki-tjarirang*, s.; *Pisitan-monjêt*, s.; *Ki-hadji* s.; *Kigěgoela*, s.; *Troes-goenoeng*, s.; *Marang-nginang*, s.; *Pòtrèn*, md.; *Khenroeh*, md.; *Wong-khoenông*, md.;

Kapòtrèn, md.; *Khoeleuh* md.; *Amphéuloeh*, md.;
Wèlahan, j. in Tègal; *Langsat-loetoeng*, j. en *Narap*,
 j. bij Pantjoer en Sèmpòlan in Běsoeki in Banjoewangi.

81. **CHISOCHETON** BL.

Chisocheton spec. div. — Incl. namen als *Dysoxylum* BL.

Hout voor pakkisten.

82. **SANDORICUM** CORR.

Sandoricum spec. — *Sěntoel*, s. j.; *Kětjapi*, s. — In Běsoeki
Sěntòl, md.

Hout voor pakkisten.

83. **AGLAIA** LOUR.

Aglaiia spec. div. — Sommige soorten niet zelden aangeduid met
 namen, die ook voor andere boomsoorten van andere
 families gelden bij v. *Walik-angin*, j.; *Doerènan*, j.;
Wangsoel, j.; *Beungsòl*, md. enz.

Aglaiia spec. A. — *Lòtòng*, md. bij Pantjoer in bergstreken van
 Běsoeki.

Hout buitengewoon duurzaam, bijzonder hard en in
 zeer groote afmetingen te krijgen. Voor huis- en brug-
 gen-bouw uitmuntend.

Aglaiia spec. B. — *Siloewar*, s.; *Silòwar*, s. in Zuid-Preanger. Bij
 Tjilatjap (Zuid-Banjoemas) *Sèlang*, j.

Hout duurzaam voor huisbouw.

Aglaiia spec. C. — *Doerènan*, j.; *Pheungsòl*, md.

Hout voor pakkisten.

Aglaiia spec. E. — *Pantjal-kidang*, j. bij Poegèr in Zuid-Běsoeki;
Pikopian, md. bij Pantjoer in Běsoeki. — Beide namen
 lokaal en de eerste elders op Java ook aan andere boom-
 soorten gegeven. — In vele streken van Java aan de
 inlanders in het geheel niet bij name bekend.

Hout voor pakkisten.

84. LANSIUM RUMPH.

Lansium spec. (cum. var.) — *Doekoe* j.; *Doekoe* ml. j.; *Langsəp*, j. in Midden-Java; *Langsat*, j. in Banjoewangi.

Hout voor pakkisten.

85. AMOORA RXB.

Amoora spec. div. — Inl. namen veelal als *Dysoxylum*; dikwijls lokaal.

Hout voor pakkisten.

86. WALSURA RXB. en Heynea RXB. (1) — Inl. namen aan mij onbekend.**87. CARAPA AUBL. (*Xylocarpus*).**

Carapa spec. 1 v. 2 (v? 3.) — *Njirih*, j. (ook *Njirih-goedik*, j. en *Njirih-abang*, j.) en *Njoeroek*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas. — *Nirih*, j.; *Nèrèh*, md. en *Manirèh*, j. in Banjoewangi. — *Djâmbâ*, j. bij Poegër in Zuid-Besoeke. — *Miri*, s. bij Balekambang aan Zuidkust-Preanger. In Kēdiri heet bij Pare echter *Aleurites moluccana* FORST. vaak *Miri*, j. — In Z. O. Preanger *Ki-njirih*, s.

Hout duurzaam; voor huisbouw; alleen in korte afmetingen te krijgen.

88. CEDRELA LINN.

Cedrela spec. 1 — 3. — *Soerèn*, j. s.; *Sòrèn*, md.; zeer vaste op geheel Java uitsluitend aan soorten van dit geslacht gegeven namen. — Op het Pèngalèngan-plateau in de Preanger worden nog de volgende variëteiten (of ? soorten) van *Cedrela* onderscheiden: *Soerèn-kapas*, s.; *Soerèn-tali*, s. en *Soerèn-tandoek*, s. — Bij Ngēbēl op den G. Willis in Madioen wordt *Soerèn*, j. soms ook *Rēdani*, j. genoemd. — In Z. W. Bantēn bij Tjēmara wordt

(1) Het komt mij waarschijnlijk voor, dat de opgave in de literatuur als zoude *Heynea* op Java door een woudboomsoort vertegenwoordigd zijn, onjuist is.

Soerèn, s.; niet zelden ook *Ki-beureum*, s. geheeten.

Hout duurzaam en in groote afmetingen te krijgen echter niet sterk; niet voor balken, wèl voor planken en meubels aan te bevelen.

89* OLACACEAE.

89. STROMBOSIA BL.

Strombosia spec. — *Ki-katjang*, s. in Preanger en Bantén een vrij vaste naam, die zelden ook aan andere boomsoorten gegeven wordt.

Hout duurzaam; voor huisbouw gezocht.

90. GOMPHANDRA WALL. (*Stemonurus*, *Lasianthera*).

Gomphandra spec. div. — Inl. namen zeer lokaal en meestal zeer onbetrouwbaar.

Hout onbruikbaar.

91. PLATEA BL. en *Villarezia* Ruiz. et Pav. — Inl. namen aan mij onbekend.

92* ILICACEAE.

92. ILEX L. (PRINOS).

Ilex spec. — *Ki-sěkěł*, s. bij Takòka in de Djampangs (Preanger). — Determinatie van den latijnschen naam nog onzeker.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; is echter zeldzaam.

93* CELASTRACEAE.

93. **EUONYMUS** L.; *Lophopetalum* WIGHT en *Siphonodon* GRIFF zijn de inl. namen zoowel in West- als in Midden- en Oost-Java zeer lokaal en onbetrouwbaar, bijv. bij Pringāmbā in Oost-Banjoemas: ? *Koekoeran*, j. — Van *Gymnosporia* W. et A. (*Catha*) en *Microtropis* WALL. (*Paracelastrus*) zijn mij de inl. namen en het voorkomen op Java nog niet bekend.

Het hout van geen enkele der javaansche *Celastraceae* wordt door de inlanders voor huisbouw voldoende duurzaam geacht. Enkele soorten misschien voor pak- kisten bruikbaar; evenwel zeldzaam.

94* RHAMNACEAE.

94. **ZIZYPHUS** JUSS.

Zizyphus spec. — *Dārā* j.; *Widārā*, j.; in bijna geheel Midden- en Oost-Java constant aldus genoemd. — *Phoeköl*, md. in Běsoeki. — *Bidara*, ml. in Kōta-Samarang. Deze laatste naam niet te verwarren met *Kajoe-bidara-laoet*, ml. of *Bidara-laoet*, ml., welke naam volgens VORDERMAN en BOERLAGE voor een op Java misschien niet in wilden staat voorkomenden boom van een andere plantenfamilie geldt; n. l. voor *Eurycoma longifolia* JACK, welke soort op Bangka inheemsch is.

Hout onbruikbaar.

95* AMPELIDACEAE.

95. **LEEA** LINN.

Hout van beide soorten onbruikbaar.

Leea spec. A. — *Lěngki*, j. vrij constant in geheel Midden- en Oost-Java. — Bij Soembërwaroe in Běsoeki *Langkampheudjeuh*. md.; — *Ki-boaja*, s. in Zuid-Preanger; deze naam echter niet constant. — In Těgal? *Boeaja*, j. of? *Kajoe-boeaja*, j.

Leea spec. B. — *Girang*, j.; *Khireung*, md. — In Zuid-Banjoe-mas veelal *Tira*, j.; in Z. W. Bantěn, zoomede in enkele streken van de Preanger *Soelangkar*, s. genoemd. — Hiertoe behoort waarschijnlijk een in Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap *Kajoe-toewa*, j. genoemde soort.

96* SAPINDACEAE.

96. DITTELASMA HOOK F. (*Sapindus*).

Dittelasma spec. — *Lěřěk*, j.; *Lěrak*, j. ml. — *Zeepboom*.

Hout voor pakkisten en mits uitgeloozd, misschien ook voor huisbouw bruikbaar.

97. ERIOGLOSSUM BL.

Erioglossum spec. — *Ki-lalajoe*, s.; *Klajoe*, j. Vaste namen. Soms ook, bijv. in Banjoemas en in Zuid-Běsoeki: *Katilajoe*, j.

Hout onbruikbaar.

98. SCHMIDELIA L. (*Allophyllus*).

Schmidelia spec. — *Tjoekilan*, j. of *Tjoekilang*, j.

Hout onbruikbaar. Bij uitzondering soms voor wapengevesten gebezigd.

99. CUPANIA L.

Hout van al deze soorten voor pakkisten en der bergbewonende soorten voor huisbouw.

Cupania spec. div. — Inl. namen meestal of onzeker of lokaal of geheel onbekend. Het meest bruikbaar zijn nog de volgende namen: *Ki-hó-ě*, s. voor de Preanger *Pěn-*

djalinan, j. voor Zuid-Tégal en Zuid-Banjoemas; *Walikêlar*, j. voor Z. W. Běsoeki.—De soorten van dit geslacht worden door de inlanders niet zelden met soorten van andere geslachten verward; b. v. met *Crypteronia* Bl.

100. **RATONIA** Dc., *Anomasanthes* Bl. en *Lepisanthes* Bl. (1) —
Inl. namen aan mij onbekend.

101. **SCHLEICHERA** Willd.

Schleichera spec. — *Kěsambi*, j. s.; *Kěsamphih*, md.; *Kosambi*, j. — Zeer vaste, aan bijna elk inlander bekende namen.

Hout duurzaam, maar zeer hard; alleen in korte afmetingen te krijgen: voor huisbouw bruikbaar; voor houtskolen bijzonder geschikt (*Arěng-kěsambi*, j.); ook voor meubels.

102. **GANOPHYLLUM** Bl. (2)

Ganophyllum spec. — *Mangir*, j.; *Mangèr*, md. — Zeer vaste naam in geheel Midden- en Oost-Java. — Bij uitzondering daarmede wel eens een *Pithocolobium*-soort door de inlanders verward. — In Z. W. Bantěn bij Tjěmara: ?*Ki-angir*, s.

Hout zeer duurzaam, voor huis- en bruggenbouw uitmuntend geschikt en in zeer groote afmetingen en groote hoeveelheden te krijgen; vooral in Banjoewangi.

103. **SAPINDUS** L.

Sapindus spec. is synoniem met *Dittelasma spec.*

Hout zie boven onder *Dittelasma spec.*

(1) — Volgens de literatuur zou van *Jagera* Bl. (Natuurk. Tijdschr. v. N. I. l. c.) een boomvormige soort op Java inheemsch zijn. Mij komt dit echter zeer onwaarschijnlijk voor.

(2) — Dit geslacht is nieuw voor de flora van Java. In een der eerst volgende afleveringen van het Natuurk. Tijdschr. v. N. I. zullen hierover van de hand van Dr. BOERLAGE en mij eenige mededeelingen verschijnen. Hier zij slechts aangestipt, dat het zoolang onbekend blijven van dit geslacht voor de boomflora van Java daarom zoo opmerkelijk is, omdat de eenige soort, die daartoe behoort, in veel streken van Oost-Java zeer algemeen is en daarbij bij de inlanders om zijn deugdzaam hout hoog in aanzien staat. — JUNGHUHN vermeldt ten onrechte den naam *Mangir*, j. bij *Pithecolobium*.

104. **CAPURA** BL. — Inl. naam aan mij onbekend.

105. **XEROSPERMUM** BL.

Xerospermum spec. — ? *Toendoeng*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas; en ? *Toendoeng-sajòng*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — Deze namen onzeker en zeer lokaal.

Hout onbruikbaar.

106. **NEPHELIUM** L.

Nephelium spec. div. — *Ramboetan*, j. s. nl.; *Ramboetan-djâwâ*, j.

Hout bruikbaar voor pakkisten; maar zelden gekapt om de eetbare vruchten.

107. **POMETIA** FORST. (*Irina*).

Pometia spec. 1 (v. 2?) — *Leungsir*, s. in Preanger en Bantën. In Běsoeki bij Pantjoer: *Tjheukhir*, md.; bij Sěmpòlan (Djěmběr): *Sapèh*, md. — Bij Tjilatjap en Pringāmbā in Banjoemas: *Sapi*, j. of *Kajoe-sapi*, j. — De eerste naam zeer constant; de laatsten niet zelden minder zeker. — Deze soort wordt door de inlanders dikwijls met *Dysoxylum*, *Meliosma* en *Dracontomelum*-soorten verward. — Bij Ngěběl in Madioen heet *Pometia* constant *Kětjapi*, j. (*niet* soendaneesch). — Bij Pringāmbā in Oost-Banjoemas: *Lěngsar*, j.

Hout bruikbaar voor huisbouw; zeer geschikt voor pakkisten.

108. **HARPULLIA** RXB. (*Otonychium*)

Harpullia spec. A. — *Pěloes*, j.; *Pělòs*, md. — In Oost-Java vaste namen.

Hout onbruikbaar.

Harpullia spec. B. — Op den G. Oengarang en in Banjoemas bij Pringāmbā aan de inlanders niet bij name bekend.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.

109. ACER L.

Acer spec. — Inl. namen lokaal zeer verschillend en niet zelden weinig constant. In sommige streken o. a. in de Preanger bij Pangëntjongan (Limangan) rekenen de Soendanezen dezen boom tot de *Hoeroe* (s.)-soorten; ook in enkele streken van Midden-Java is zulks het geval. Als locale namen verdienen alleen vermeld te worden: *Woeroe*, j. en *Hoeroe*, s.; verder ? *Tjalik-angin*, s. voor Tjibòdas ('s Lands Plantentuin) in de Preanger; — ? *Woeroe-kěmbang*, j. op den G. Slamet in Tegal, ? *Woeroe-sānā*, j. in Samarang ? *Walikělar*, j. op den G. Praoc in Pěkalongan; ? *Ki-badak*, s. bij Takòka in de Djampangas (Preanger).

Hout bruikbaar voor huisbouw.

110. DODONAEA L.

Dodonaea spec. — Inl. naam in Midden-Java constant en algemeen bekend; elders onzeker of weinig bekend. — *Těngsěk*, j. in Samarang, Bagělèn en Pěkalongan. — *Krěsěk*, j. op den G. Wilis in Madioen. — *Krisig*, j. of *Krisik*, j. bij Gradjagan in Zuid-Banjoewangi. — ? *Tjantigi*, s. bij Palaboean in Z.-Preanger. — Zonder inl. naam in Z. W. Bantěn. — Soms ook wel eens hier en daar ? *Kajoe-běsi*, j. (ijzerhout) genoemd.

Hout buitengewoon hard en duurzaam, doch alleen voor wandelstokken bruikbaar; nooit in groote afmetingen te krijgen.

111. TURPINIA VENT.

Turpinia spec. — In bijna geheel West-Java constant *Ki-bantjět*, s. geheeten. In Midden- en Oost-Java of door locale en zeer onzekere namen aangeduid; of aan de inlanders geheel bij name onbekend. — Bij Pringāmbā in Oost-Java *Bantjět*, j. — In Z. W. Bantěn bij Tjěmara ? *Ki-bangkòng*, s.

Hout voor pakkisten.

112. Cultuurboomen :**NEPHELIUM L.**

Nephelium spec. div. — *Ramboetan-atjěh*, ml.; *Kapoelasan*, s.

Hout voor pakkisten; echter worden alleen zeer oude, niet meer vruchtdragende boomen gekapt.

113* SABIACEAE.**113. MELIOSMA BL.**

Hout van al deze soorten voor pakkisten geschikt, en soms in zeer groote afmetingen te krijgen, vooral soort B.

Meliosma spec. A. — *Ki-tiwoe*, s. vrij constant in bijna geheel West-Java; dáár op enkele plaatsen echter aan de inlanders alleen onder locale en onzekere namen bekend. In Midden- en Oost-Java meestal bij name onbekend.

Meliosma spec. B. — *Gompông*, j. bij Ngébél op den G. Wilis in Madioen; en *Kadjoeh-tjheureun*, md. bij Pantjoer in Běsoeki. Deze namen lokaal, doch zeer vast. Elders veelal zonder inl. naam. — *Kajoe-djaran*, j. en *Kadjoeh-tjheureun*, md. van andere streken is meestal de naam voor andere boomsoorten (zie o. a. onder *Anacardiaceae*).

Meliosma spec. C. — Zonder inl. naam.

*** 114** ANACARDIACEAE.**114. BUCHANANIA, RXB.**

Buchanania spec. — *Popohan*, j. in geheel Běsoeki; — *Gétasan*, j. in geheel Samarang; — *Rěngas-manoek*, s. bij Palaboehan in Z.-Preanger. — In Z. W. Bantěn bij Tjěmara *Pòpòhan*, s.

Hout voor pakkisten.

115. MANGIFERA L.

Hout van al deze soorten alleen voor pakkisten bruikbaar; daarbij zelden gekapt om de eetbare vruchten.

Mangifera spec. div. — Voor eenige soorten van het geslacht *Mangifera* hebben de inlanders van West- Oost- en Midden-Java elk één gemeenschappelijken „geslachts”-naam. Elke dier namen beantwoordt dus bijna geheel aan het genus *Mangifera*. Door achtervoegsels worden de soorten of variëteiten door hen onderscheiden. Bij deze laatste nomenclatuur bestaan echter veel locale verschillen en verwarring van namen; niet echter bij de gelijkwaardige geslachtsnamen: *Manga*, s. ml.; *Pěləm*, j.; *Paò*, md. en *Pòh*, j. — Deze namen gelden vooral voor de variëteiten van *Mangifera indica* L.

De volgende namen dienen ook tot aanduiding van eenige *Mangifera*-soorten: *Mampləm*, s.; *Pakəl*, j. s.; *Kwèni*, j. s.; *Kěmang*, s. j.; *Běmběm*, s.; *Limoës*, s.; *Pari*, s. en *Pari-manœek*, s. De laatste naam *Pari* niet te verwarren met *Paré*, s. en *Pari*, j. (rijst); evenmin met *Ki-parè*, s.; den naam van een *Glochidion*-soort in de Preanger. — In Zuid-Banjoemas: *Bawang* j. = ? *Limoës*, s. — Elders worden gewone uien (*Allium*) meestal *Bawang*, ml. j. s. geheeten. Als voorbeelden van achtervoegsels mogen de volgende dienen: *Pěləm-madoe*, j.; *Pěləm-santòk*, j.; *Pěləm-kòpjòr*, j.; *Pěləm-kějòng*, j.; *Pěləm-sěngir*, j.; *Pěləm-daging*, j.; *Pěləm-lalidjwā*, j.; *Mangga-tjěngkir*, s.; *Mangga-bapang*, s. ml.; *Mangga-klapa*, s.; *Mangga-gèpèng*, s.; *Mangga-daging*, ml. s.; *Mangga-pari*, s.; *Mangga-sěngir*, s.; *Paò-gòlèk*, md.; *Paò-kainèh*, md.; *Paò-kòtjòr*, md.; *Paò-kòlèh*, md.; *Paò-tělòr*, md.; *Mangga-oedang*, ml.; *Mangga-oebi*, ml.; *Mangga-wangi*, ml.; *Mangga-sěngir-gadoeng*, ml.; *Mangga-běnggala*, ml.; *Mangga-santěn*, ml.; *Mangga-dòdòl*, ml.; *Mangga-kětjipèt*, ml.; *Mangga-kěmběmběm*, ml.; *Mangga-kwèni*, ml.; *Mangga-batjang*, ml.

116. GLUTA L.

Gluta spec. — *Rěngas*, s.; *Ingas*, j. — *Ingas-tělik*, j. Pěkalongan en *Ingas-těmbāgā*, j. in Brěbės (Těgal). — Deze namen niet zelden ook aan *Semecarpus*-soorten gegeven (zie

hieronder). — In Kědiri (bij Pare) heet *Gluta spec.*: *Ingas-tělik*, j. en *Semecarpus spec.* steeds: *Ingas*, j.

Hout duurzaam, sterk en fraai; voor huisbouw en meubels zeer geschikt. Het kappen levert eenige moeilijkheid op, omdat het sap van dezen boom op de huid meestal ontsteking veroorzaakt.

117. BOUEA BL.

Bouea spec. — *Gandarija*, s.; *Gândârijâ*, j.

Hout voor pakkisten; echter zeer zelden gekapt om de eetbare vruchten.

118. SPONDIAS L. (EVIA)

Spondias spec. — *Kědongdong*, j.; *Kědongdong*, s. ml. — In Banjoewangi een variëteit (of ? soort) onderscheiden met den naam *Klontjing*, j.

Hout voor pakkisten; dikwijls in groote afmetingen te krijgen.

119. DRACONTOMELUM BL. (1)

Dracontomelum spec. — *Raoe*, j.; *Theuòh*, md. — Vaste naam in geheel Midden- en Oost-Java. Zelden met andere boomen verward.

Hout voor pakkisten; dikwijls in groote hoeveelheden en in zeer groote afmetingen te krijgen.

120. SEMECARPUS L.

Semecarpus spec. 2 — *Ingas*, j.; *Rěngas*, s.; constante namen.

Hier en dáár echter behalve voor dit geslacht ook voor *Gluta* (zie boven) gebezigd. Laatstgenoemd geslacht kenmerkt zich evenals *Semecarpus* door een scherpe, op de huid ontsteking veroorzakende hars. Deze is echter bij *Semecarpus* meer gevreesd. — In enkele streken wordt de naam *Ingas-tělik*, j. voor

(1) — Het komt wij waarschijnlijk voor, dat de geslachten *Melanochyla* Hook f en *Campnosperma* Tuw. geen van beide op Java door wildgroeiende boomsoorten vertegenwoordigd zijn. Vergelijk het Natuurk. Tijdschr. v. N. I. l. c.

Semecarpus gebezigd, terwijl dan *Gluta* alleen *Ingas*, j. heet. Meestal echter is het omgekeerd. — Een in de bergstreken thuis behoorende *Semecarpus*-soort heet bij Garoet (Preanger) *Rëngas-goenoeng*, j. — Bij Tjilatjap worden 2 *Semecarpus*-soorten als volgt onderscheiden: *Ingas-ka-poer*, j. en *Ingas-kěbo*, j.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar; het kappen levert echter moeilijkheden op doordat het scherpe sap van den schors bij aanraking bijna altijd zweren op de huid veroorzaakt. Deze soort is meer gevreesd dan *Gluta spec.*

121—122. Cultuurboomen:

MANGIFERA L.

Mangifera spec. div. — Inl. namen als boven. Van de bovengenoemde *Mangifera*-soorten komen sommige alleen in gecultiveerden staat op Java voor.

Hout voor pakkisten; echter zelden gekapt om de eetbare vruchten.

ODINA ROXB.

Odina spec. — *Koeda-koeda*, ml.; *Kajoe-djaran*, j.; — in Banjoe-wangi *Santěn*, j.; — in West-Běsoeki *Kadjoeh-tjheureun*, md. — Alleen de maleische naam is zeer constant. De andere namen gelden veel meestal, maar niet altijd voor deze boomsoort, maar soms ook voor in blad daarop gelijkende boomsoorten zooals *Dolichandrone spec.* en *Meliosma spec.*

Hout voor pakkisten; meestal alleen in korte afmetingen te krijgen.

ANACARDIUM L.

Anacardium spec. — *Djamboe-mònjjet*, ml.; *Djamboe-mete*, j.

Hout onbruikbaar.

Spondias spec. — *Kědongdong*, j. *Kědongdong*, ml. s. — Is misschien een variëteit (met minder zure vruchten) van de bovengenoemde wildgroeïende soort.

Hout voor pakkisten, echter zelden gekapt om de eetbare vruchten.

SORINDEIA THOUARS.

Sorindeia spec. — Zeer weinig gecultiveerd; inl. naam aan mij onbekend.

123* LEGUMINOSAE. (1)**123. DESMODIUM DESV. (*Dendrolobium*).**

Desmodium spec. — Inl. namen of zeer lokaal en onzeker of geheel onbekend. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger en in Z. W. Bantën bij Tjemara: *Kanjèrè-laoet*, s.

Hout onbruikbaar.

124. ERYTHRINA L.

Hout van al deze soorten zeer weinig duurzaam; alleen voor pakkisten bruikbaar, en dan nog alleen van oude boomen.

Erythrina spec. div. — Met uitzondering van één soort, n. l. *E. ovalifolia* RXB., die soms alleen *Tjangkring*, j. genoemd wordt, worden alle op Java groeiende *Erythrina*-soorten door de inlanders tot één „geslacht” gebracht; n. l. tot *Dadap*, j ; *Dadap*, s. ml. of *Theutheuk*, md. Door achtervoegsels worden dan de verschillende soorten en variëteiten aangeduid. Hierbij wordt echter niet zelden de eene inl. soorts-naam voor den anderen gebezigd; zelfs in onderling nabij gelegen streken. Daarom is voorzichtigheid bij het trekken van conclusies omtrent de gelijkheid van twee dadap-soorten op grond der gelijkheid hunner inl. namen zeer noodzakelijk; en even noodzakelijk in het omgekeerde geval. —

(1) — Van de in Natuurk. Tijdschr. v. N. I. l. c. genoemde woudboomen-geslachten zijn blijkens nader onderzoek de volgende in de bestaande literatuur ten onrechte als voor Java inheemsch vermeld: *Tephrosia* PERS; *Kiesera* RWT en *Inocarpus* L. Op Java is het laatste geslacht alleen, door een niet inheemschen en het eerste en tweede geslacht alleen door een 2 M. hoogen heester vertegenwoordigd.

Wanneer alleen van *Ḍaḍap*, j.; *Dadap*, ml. s. of *Theuṭheuk*, md. zonder meer gesproken wordt, heeft dit bijna altijd alleen betrekking op *Erythrina lithosperma* BLUME (BOERLAGE).

Erythrina spec. A. — *Ḍaḍap-sěřp* j.; *Ḍaḍap-bòng*, j.; *Ḍaḍap-lěngā*, j.; *Ḍaḍap-lisah*, j.;? *Ḍaḍap-tandoek*, j.; *Theuṭheuk-òlěng*, md.; *Dadap-běñr*, s.; *Dadap-tjoetjoek*, s.; *Ḍaḍap-ri*, j.; *Dadap-doeri*, ml.; *Dadap-rangrang*, s.; alleen *Ḍaḍap*, j.; *Dadap*, ml. s. of *Theuṭheuk*, md. — Soms: *Dadap-kěbon-kopi*, ml. — Zoowel de gedoornde stamvorm als de ongedoornde variëteit worden meestal met één dezer namen aangeduid. Verwisseling met andere soorten is daarbij echter niet zeldzaam. — Misschien behoort hiertoe ook de zoo genaamd *Ḍaḍap-sālā*, ml.

Erythrina spec. B. — *Blěndoeng*, s.; *Ḍaḍap-ujam*, j.; *Ḍaḍap-laoet*, j. — Soms ook *Ḍaḍap-ri*, j.; ook *Theuṭheuk-òlěng*, md.

Erythrina spec. C. — *Tjangkring*, j. s. ml.; *Tjangkrěng*, md.; *Ḍaḍap-tjangkring*, j.; *Dadap-tjangkring*, s. — Behalve in Běsoeki, waar de gedoornde vorm van soort A soms ook zoo heet, zijn deze namen elders op Java zeer vast.

125. BUTEA ROXB.

Butea spec. — *Plāsā*, j.; *Plasa*, s. ml.; *Plasah*, md. — Zeer vaste naam, die aan bijna elk inlander in Midden- en Oost-Java bekend is.

Hout onbruikbaar.

126. DALBERGIA L.

Dalbergia spec. — *Sānā-kling*, j. — Soms, bijv. in Madioen op enkele plaatsen ook *Sānā-soengoe*, j. geheeten, integesting met *Pterocarpus indicus* WILLD., die dáár dan

Sânâ-kapoer, j. heet. — Soms alleen *Sânâ*, j.; — *Zwart-bruin zonnehout*.

Hout prachtig, zeer duurzaam; wellicht het mooiste javaansche meubelhout.

127. **PTEROCARPUS** L.

Pterocarpus spec. — *Angsana*, s.; *Sânâ-kěmbang*, j. — Soms alleen *Sânâ*, j. geheeten. — *Geel zonnehout*.

Hout duurzaam; fraai; voor huisbouw en meubels uitstekend geschikt.

128. **DERRIS** LOUR (*Brachypterum*.)

Derris spec. — *Běkěl*, j. bij Kědoengdjati in Samarang. Dáár vaste naam. Elders b. v. bij Bodjā in Kěndal en in Soerākěrtā inl. naam meestal onbekend of zeer onzeker.

Hout onbruikbaar of misschien voor pakkisten bruikbaar.

129. **PONGAMIA** VENT.

Pongamia spec. A. — Inl. namen lokaal verschillend en veelal onzeker; niet zelden geheel onbekend. — *Ki-pahang*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger, doch met die naam o. m. ook een *Premna*-soort aangeduid. — Bij Tjilatjap ? *Bangkong*, j.; dáár en ook elders ook een paar andere boomsoorten, b. v. een *Pithecolobium* en een *Turpinia*-soort soms aldus genoemd. — In Zuid-Banjoewangi veelal ? *Krandji*, j. — Elders op Java o. a. in de Preanger heeft *Dialum indum* L. en in Kědiri *Pithecolobium dulce* BTH. denzelfden naam

Hout voor pakkisten; dikwijls alleen in korte afmetingen te krijgen.

Pongamia spec. B. — Alleen bij Ngěběl in Madioen gevonden; dáár inl. naam zeer onbetrouwbaar.

Hout als soort A.

130. **SOPHORA** L.

Sophora spec. — Namen zeer lokaal, doch vast. In Zuid-Ban-

joewangi bij Gradjagan? *Pěnawar*, j.; met dien naam elders op Java evenwel niet zelden een boomvaren aangeduid. — In Z. W. Bantěn bij Tjēmara *Mata-koetjing*, s. genoemd. — Meestal een heester; zelden een boomheester.

Hout onbruikbaar.

131. PELTOPHORUM Vog.

Peltophorum spec. — *Sogā*, j. in geheel Midden- en Oost-Java een vaste naam. — *Sòkheuh*, md. in Běsoeki. — Een paar variëteiten heeten op enkele handelsplaatsen: *Sogā-djambal*, j. ml. en *Sogā-Gradjagan*, j. — De naam *Sogā-tingi*, j. ml. van Midden-Java geldt veelal de bast van evenals *Peltophorum* voor verwen gebezigde boom-bast, welke van *Ceriops* (*Rhizophoraceae*) afkomstig is. — Bij Pantjoer op den G. Rahoeng-Idjèn in Běsoeki heet een variëteit van *Pithecolobium montanum* BTH. ook *Sòkheuh-tèngèh*, md.

Hout voor pakkisten bruikbaar; echter zelden gekapt om de kostbare, voor de inlandsche ververij, gebezigde schors.

132. CASSIA L.

Cassia spec. A. — *Trěnggoeli*, j.; *Tranggoeli*, j.; *Tanggoeli*, j. s.; *Těnggoeli*, j. s.; *Klòboer*, md. — In Banjoewangi *Klòhòr*, j. — Namen zeer constant; aan bijna elk inlander bekend.

Hout voor kleine meubels en landbouwwerktuigen bruikbaar; alleen in korte afmetingen te krijgen.

Cassia spec. B. — *Boengboenělan*, s.; vaste naam in geheel West-Java. — In Midden- en Oost-Java de namen òf onzeker òf onbekend òf lokaal. — Bij Kědoengdjati in Samarang *Trěnggoeli-wawang*, j.; bij Pare in Kědiri *Trěnggoeli-klòlèt* j.

Hout misschien voor pakkisten.

Cassia spec. C. — *Nginginy*, j. en *Haringin*, s. (niet te verwarren met *Tjaringin*, s.) in geheel Bantěn en Preanger in geheel

Samarang nogal constant. Elders minder vast; bijv.: *Ēhing*, j. of *Hing* j. bij Pringāmbā in Banjoemas. — In Kēdiri *Minging*, j.

Hout onbruikbaar.

Cassia spec. D. — ? *Āntābogā*, j. op den G. Tēlēmājā in Samarang. Naam zeer locaal. Elders? onbekend.

Hout onbruikbaar.

Cassia spec. E. — Inl. namen onbekend of onbetrouwbaar. — Bijv. bij Klēdoeng op der G. Sēndārā ? *Tajoeman*, j. zeer locale naam. — Meestal heester; zelden boomheester.

Hout onbruikbaar.

133. DIALIUM L.

Dialium spec. — *Krandji*, s. of *Parandji*, s. bij Buitenzorg zeer vaste naam. — Elders meestal onbekend. — Andere ook *Krandji*-genoemde soorten zijn boven onder *Pongamia* vermeld. — In Kēdiri heet een *Pithecolobium*-soort *Asēmkrandji*, j.

Hout voor huisbouw ? bruikbaar.

134. DAUHINIA L. (*Piliostigma*)

Bauhinia spec. — *Kēndajakan*, j.; vaste naam in geheel Midden- en bijna geheel Oost-Java. In Zuid-Banjoewangi echter *Bēntjoeloek*, j. — Bij Soembērwaroe in N. O. Běsoeki *Tjhēmpheuloek*, md.

Hout onbruikbaar.

135. PAUDIA MIQ.

Pahudia spec. — *Ki-djoelang*, s.; in de geheele Preanger een vaste naam. — Inl. naam bij Soebah in Pékalongan onbekend; soms dáár abusievelijk *Sānā*, j. genoemd.

Hout duurzaam; fijn en fraai; voor wapengevesten in West-Java zeer gezocht; in veel streken uitgeroeid en moeilijk te krijgen.

136. AFZELIA Sm.

Afzelia spec. — *Měrbô*, ml. s. constante naam in Z. W. Bantěn. Elders op Java de namen onbetrouwbaar en lokaal; bijv. *Taritih*, s. of ? *Tarisih*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — Elders beantwoordt aan den laatsten naam meestal een *Albizia*- en aan den voorlaatsten naam een *Parinarium*-soort.

Hout zeer duurzaam; voor huisbouw en meubels uitstekend. In Bantěn bijna uitgeroeid.

137. SARACA L.

Saraca spec. 2 — *Sokā*, j. in geheel Samarang zeer vaste naam. — *Kěmbang-àdèdès*, s. ml. bij Buitenzorg. — Elders op Java de namen veelal onzeker. — De naam *Sogā* j. geldt voor een *Peltophorum*-soort (zie boven).

Hout onbruikbaar.

138. CRUDIA SCHREB. (Pryon).

Crudia spec. — *Dègèl*, s. in Zuid-West Bantěn een vaste naam.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; alleen in korte afmetingen.

139. SINDORA Miq.

Sindora spec. — Inl. namen lokaal en slechts aan weinigen bekend; in Z. W. Preanger o. a. bij Sanggrawa in de Djampang: *Samparantoe*, s.; — in Z. O. Preanger; *Oekoeaka*, s. — Bij Tjilatjap: *Djoelang*, j. in de Preanger heet *Pahudia spec.* aldus.

Hout voor huisbouw?; echter zelden gekapt om de olie, welke deze boom oplevert.

140. CYNOMETRA L.

Cynometra spec. — Inl. namen of onbekend of lokaal. — Bij Poegër in Zuid-Běsoeki constant *Kěpěl*, j. geheeten; elders op Java een *Stelechocarpus* meestal aldus genoemd. — Bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas *Kěpěl*, j. of *Katěng*, j. — In Zuid-Preanger bij Balekambang: *Katěng*, s.

Hout onbruikbaar.

141. PARKIA BROWN.

Parkia spec. — *Kědawoeng*, j.; *Pòndeu*, s.; *Kětheuboeng*, md.
 — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger heet een variëteit
 dezer soort of een zeer naverwante species *Pětir*, s. —
 Bij Plèlèn in Pěkalongan zoowel *Gědawoeng*, j. als *Pěte-*
alas, j. (*Pěte-wānā*, j.) geheeten.

Hout voor pakkisten; in reusachtige afmetingen te
 krijgen.

142. ADENANTHERA L.

Beide soorten met duurzaam, voor huisbouw geschikt
 hout; vooral soort A.

Adenanthera spec. A. — *Sěgawe*, j. in Samarang, Soerākěrtā,
 Běsoeki en de meeste andere streken van Midden-
 en Oost-Java. — In Běsoeki ook *Beuj*, md. of
 ? *Sěkheubeuj*, md. — Bij Soebah in Pěkalongan con-
 stant *Sogā*, j. genoemd, terwijl elders meestal
Peltophorum zoo heet (zie boven).

Adenanthera spec. B. — Inl. namen of dezelfde als de voorgaan-
 de of geheel onbekend.

143. DICROSTACHYS DC.

Dicrostachys spec. — *Peueung*, s. In Samarang en Soerākěrtā:
Kòt, j. — In Banjoewangi *Poeng*, j. — Dikwijls
 slechts een boomheester; zelden een boom.

Hout buitengewoon hard en zeer duurzaam; voor
 houten spijkers, kāmradere, enz. zeer gezocht; alleen
 in zeer kleine afmetingen te krijgen.

144. ACACIA WILLD.

Acacia spec. A. — *Pilang*, j. s.; *Pèlang*, md. of *Òpèlang*, md.
 — Vaste naam.

Hout duurzaam; voor huisbouw zeer geschikt; ook
 voor meubels bruikbaar, doch nogal grof.

Acacia spec. B. — *Klampis*, j. s. — Vaste algemeen bekende
 naam. — Bij Soemběrwaroe in Běsoeki: *Langaj*, md.

Hout onbruikbaar.

145. **ALBIZZIA** DURAZZINI.

De meeste *Albizzia*-soorten zijn aan de inlanders goed bekend. Dit is vooral het geval met de volgende. *A. procera* BTH. (spec. A.) en *A. stipulata* BTH. (spec. B.); zoomede met *A. lebekkoides* BTH. (spec. C.) en *A. montana* BTH. (spec. F.) in sommige streken; bijv. de laatste op den G. Sendârâ en Diêng en de eerste bij Kědoengdjati in Samarang. Deze vier soorten worden zelden door de inlanders met andere boomsoorten verward. — *A. littoralis* T. et B. (spec. G.) is aan hen echter geheel onbekend. — Bij de overige soorten (D. en E.) wordt de inlandsche naam van de eene soort ook voor de andere gebezigd.

Albizzia spec. A. — *Ki-hiang*, s. — *Wěroe*, j. in geheel Midden-Java. — In Běsoeki soms *Wěroe*, j.; soms *Wangkal*, j.

Hout zeer duurzaam en sterk; voor huisbouw en meubels geschikt.

Albizzia spec. B. — *Sěngòn*, j. ml.; *Djeundjing*, s.; *Sěngòn-djâwâ*, j.; *Sěngòn-djawi*, j.

Zie verder hieronder cultuurboomen.

Hout voor huisbouw bruikbaar.

Albizzia spec. C. — *Kědinding*, j.; *Rěng*, md. — Niet zelden ook *Těkik*, j. — In Samarang is de naam *Kědinding*, j. zeer constant.

Hout misschien voor huisbouw bruikbaar.

Albizzia spec. D. — *Tarisi*, s. bij Tòmò in Soemědang (Preanger) en *Ki-tòkè*, s. bij Palaboehan in de Preanger. — In Samarang bij Kědoengdjati: *Těkik*, j.

Hout ? onbruikbaar; misschien nog voor pakkisten te gebruiken.

Albizzia spec. E. — Inl. namen weinig bekend en lokaal of ge-

heel onbekend. — In de Preanger *Ki-tòkè*, s.; in Midden-Java *Tèkik*, j.

Hout als soort D.

Albizzia spec. F. — *Kěmlaṇḍingan*, j. of *Kěmlaṇḍingan-goenoeng*, j. in vele bergstreken van Midden-Java. — *Sèlòng*, j. op den G. Slamet in Tègal. — Op Idjèn-plateau in Běsoeki *Poeloengan*, j. — In de Preanger bij Tjibòdas *Haroeman*, s. — De twee eerste namen hebben de meeste waarde. De overige zijn meestal lokaal en weinig bekend. — In sommige deelen van Java heet *Leucaena glauca* L. ook *Kěmlaṇḍingan*, j.; terwijl *Haroeman*, s. soms voor *Pithecolobium montanum* BTH. geldt.

Hout onbruikbaar.

Albizzia spec. G. — Inl. naam op de eenige mij bekende vindplaats op Noesâ-baroeng in Zuid-Běsoeki geheel onbekend.

Hout onbruikbaar.

146. PITHECOLOBIUM MART.

Het hout van al de hierondergenoemde wildgroeijende *Pithecolobium*-soorten onbruikbaar.

Pithecolobium spec. A. — *Ki-pòèk*, s. in de Preanger. Elders inl. namen zeer onbetrouwbaar. In de bergstreken van Samarang enkele malen bij vergissing (?) *Mangir*, j. geheeten.

Pithecolobium spec. B. — *Ki-pòèk*, s. bij Takòka in de Preanger. — Deze soort ontbreekt elders op Java.

Pithecolobium spec. C. — *Lòm*, j. in Zuid-West Běsoeki bij Poegěr en bij Soebah in Pěkalongan; *Haram-haram*, j. in Banjoewangi; *Lamaran*, s. of *Lambaran*, s. bij Tòmò in Soemědang (Preanger). De eerste naam het meest bekend.

Pithecolobium spec. D. — Inl. namen zeer talrijk, meestal lokaal; soms geheel onbekend. — In Samarang op den

G. Oengaran: *Sèngòr*, j. of *Sèngòn-wèwè*, j. op den G. Slamet in Tégál: *Wèwè*, j. — Op G. Wilis in Madioen inl. naam onbekend. — Op Idjèn-plateau in Bèsoeki *Sòkheuh-tèngèh md.* of *Ampè-nang*, md. — Op G. Gède bij Tjibòdas in de Preanger ? *Djeundjing*, s. of *Ki-haroeman*, s. — Op G. Galoenggoeng in de Preanger *Ki-haroeman*, s. — Bij Takòka in de Djampangs en bij Palaboehan in de Preanger: ? *Ki-tòkè*, s.

Pithecolobium spec. E. — Inl. namen meestal weinig bekend. — Bij Pringàmbà in Oost-Banjoemas ? *Bangkongan*, j. — In Z. W. Bantén bij Tjemara *Prèngkèt-djèngkòl*, s.

147. ACROCARPUS ARN.

Acrocarpus spec. — *Dělimas*, j. of *Dlimas*, j.; in Banjoemas en op den G. Oengaran in Samarang zeer vaste naam. De boom elders onbekend.

Hout duurzaam en sterk; voor huisbouw; in zeer groote afmetingen te krijgen.

148. Cultuurboomen:

SESBANIA PERS.

Sesbania spec. — *Toeri*, j. ml. — De beide variëteiten heeten *Toeri-abang*, j. of *Toeri-aprit*, j. en *Toeri-poetih*, j. of *Toeri-pětak*, j. — In N. O. Bèsoeki *Tòreh*, md.

Hout onbruikbaar.

ERYTHRINA L.

Erythrina spec. — De ongedoornde variëteit van *E. lithosperma* BL. komt alleen gecultiaerd op Java voor. Voor de inlandsche namen zie boven onder *Erythrina*.

Hout van deze variëteit onbruikbaar; bijna altijd te klein en te weinig duurzaam.

INOCARPUS FORST.

Inocarpus spec. — *Gajam*, j. — zeer vaste naam.

Hout voor pakkisten.

CAESALPINIA L.

Caesalpinia spec. A. — *Sètjang*, j. — Boomheester.

Hout voor de inl. ververij gebezigd; alleen in zeer kleine afmetingen.

Caesalpinia spec. B. — *Divi-divi* der europeanen.

Hout onbruikbaar.

HAEMATOKYLON L.

Haematoxylon spec. — In Banjoemas zonder inl. naam.

Hout voor ververij (*Campêche hout*).

POINCIANA L.

Poinciana spec. — *Flamme-boyant* der europeanen. — Geen inl. naam mij bekend.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

SCHIZOLOBIUM VOGEL.

Schizolobium spec. — Inl. naam onbekend.

Hout voor pakkisten.

PARKINSONIA L.

Parkinsonia spec. — *Maskemantën*, md. in Panaroekan (Bësoeki).

Hout onbruikbaar.

CASSIA L.

Cassia spec. — *Djoewar*, j. s. ml.; *Djhoewar*, md.; *Djohar*, j. s. ml.; *Tjhoear*, md. — Naam zeer constant; aan elk inlander bekend.

Hout zeer sterk en zeer duurzaam; een der zoogenaamde ijzerhout-soorten. Voor huis- en bruggenbouw. Niet in zeer zware afmetingen.

BAUHINIA L; *Brownea* JACQ. en *Amherstia* WALL. — Inl. namen onbekend.

Hout onbruikbaar?

TAMARINDUS L.

Tamarindus spec. — *Asëm*, j. md. ml; *Aseum*, s.; *Atjëm*, md.
— Zeer vaste naam. — Het kernhout heet *Galeasëm*, j. — Ook kernhout van andere boomsoorten *Galè*, j. of *Galeuh*, s. genaamd.

Kernhout zeer sterk, bijzonder hard en zeer duurzaam; voor karrenassen en wandelstokken zeer gezocht. Zelden gekapt, aangezien de vruchten te veel waarde hebben.

HYMENAEA L.; *Copaifera* L. en *Trachylobium* HAYNE. — Inl. namen onbekend.

Hout in de literatuur als fijn en duurzaam geboekstaafd.

INDIGOFERA L.

Indigofera spec. — *Djanti*, j. in Samarang bij Broemboeng.

Hout onbruikbaar.

CYNOMETRA L.

Cynometra spec. — *Namnam*, j. of *Nanam*, j.; *Poeki-andjing*, ml. s.

Hout onbruikbaar.

PARKIA R. BR.

Parkia spec. — *Pëteuj*, s.; *Pëte*, j.; *Pëtèh*, md.

Hout voor pakkisten.

PROSOPIS L.

Prosopis spec. — Inl. naam onbekend.

LEUCAENA BTH.

Leucaena spec. — *Këmlandingan*, ml. j.; *Lamtârâ*, j. — *Mëlan-ding* s, of *Pëteuj-tjina*, s. in Z. W Bantën.

Hout duurzaam, zeer hard en zeer sterk; voor wagenboomen bijna even gezocht als *Walikoekoën*, j.

ALBIZZIA DURAZZINI.

Albizzia spec. — *Djeungdjing-laoet*, s.; *Sèngòn-laoet*, j. ml.;
Sèngòn-sabrang, j. ml.; *Sèngon-lândâ*, j.; *Sèngòn-*
landi, j.

Hout uitmuntend geschikt voor theekisten; vooral
 wanneer het drogen kunstmatig geschiedt. In Bui-
 tenzorg zijn dan reeds 3—5-jarige boomen bruikbaar.

PITHECOLOBIUM MART.

Pithecolobium spec. A. — *Djèngkòl*, s. j. ml.; *Djìngkòl*, s. j.
 ml. — In Djapara *Tjèlèring*, j. of *Djèring*, j.

Hout voor pakkisten.

Pithecolobium spec. B. (*P. Saman* BTH.) — Zonder inl. naam.

Hout voor pakkisten.

Pithecolobium spec. C. (*P. dulce* BTH.) — *Asëm-krandji*, j.
 in Kèdiri; — *Asëm-lândâ*, j. of *Asëm-landi*, j.
 in Pékalongan. — *Tjandjoer*, ml. in Kòta-
 Batavia.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

149* MORINGACEAE.

Hiertoe alleen een *cultuurboom*:

149. MORINGA spec. — *Kèlòr*, j. ml. heet de boom; de vruchten
Klèntang, j. ml. — Bij Soembërwaroe heet de boom
Mròngkkih, md. en de vruchten *Klètang*, md.

Hout onbruikbaar.

150* ROSACEAE.

150. PARINARIUM JUSS.

Parinarium spec. A. — *Woelòh*, j. of *Woeloeh*, j. in Midden-Samarang zeer vaste naam. — *Gěsing*, j. in Grobogan bij Karangasem (Oost-Samarang). — *Sòlòh*, j. of *Soeloeh*, j. in Banjoewangi; met dezen naam wordt echter elders, en ook in Banjoewangi, soms een *Gironiera*-soort aangeduid. — Namen in West-Java zeer onzeker en weinig bekend; ? *Taritig*, s. in de Djampang's bij Sanggrawa (Preanger). — *Soeloeh*, s. beteekent in de Preanger brandhout in het algemeen.

Hout duurzaam en sterk; maar zeer hard; voor huisbouw.

Parinarium spec. B. — Alleen bij Panoembahan in de Zuid-Preanger gevonden; dáár inl. naam onbekend.

Hout als? bij soort A; maar uiterst zeldzame boom.

151. PRUNUS L.

Prunus spec. — Alleen bij Tjilatjap in Z. Banjoemas gevonden; dáár zonder inl. naam.

Hout waarschijnlijk voor schrijnwerk bruikbaar; echter zeer zeldzame boom.

152. PYGEUM GAERTN.

Pygeum spec. 2. — *Kawòjang*, s.; in bijna de geheele Preanger een vaste algemeen bekende naam. — Bij Tjibòdas ('s Lands Plantentuin) soms ook ? *Ki-badak*, s. of ? *Salamandjing*, s. — Inl. namen in Midden- en Oost-Java meestal òf geheel onbekend of onbetrouwbaar; in sommige streken wordt deze soort dáár soms tot de *Woeroe* (j)-soorten gerekend. — In Těgal op den G. Slamet *Mojang*, j. — Bij Pantjoer in Běsoeki geheel onbekend.

Hout sterk, nogal duurzaam en nogal fijn; voor huisbouw en misschien ook voor meubels.

153. PHOTINIA LINDL.

Photinia spec. — Inl. namen onbekend. — Soms wel eens ? *Tjantigi*, s. geheeten, evenals eenige andere boomen der alpine zone van Java.

Hout onbruikbaar.

154. Cultuurboomen :

Prunus L. — *Pruimen*, *Perzikken* en *Abrikozen* op den Tenggër (Pasoeroean) veel geplant. — Zonder eigen inl. namen.

Pyrus L. — *Appelen* en *Peren* hier en daar in de bergen geplant. — Geen eigen inl. namen.

155* SAXIFRAGACEAE.

Het hout van al de hieronder genoemde 6 soorten onbruikbaar.

155. HYDRANGEA L.

Hydrangea spec. — In de Preanger en op den Dièng zonder inl. naam.

156. ITEA L.

Itea spec. — In Madioen op den G. Wilis en in Běsoeki op het Idjèn-plateau zonder inl. naam.

157. POLYOSMA BL.

Polyosma spec. 2. — Inl. namen of zeer lokaal of geheel onbekend; de locale namen meestal nog onbetrouwbaar; bijv. ? *Ki-pòdòlandak*, s. bij Takòka; — ? *Ki-tjabè*, s. of ? *Ki-palahlar*, s. bij Tjibòdas (Hort. Bogor). — In Bantěn geheel onbekend. — Bij Pantjoer in Běsoeki *Kadjoeh-lanang*, md.

158. WEINMANNIA L.

Weinmannia spec. 2. — Inl. namen òf zeer locaal òf (en dit is meestal het geval) voor beide soorten onbekend. — Bij Tjibòdas (Hort. Bogor) in de Preanger: *Kitjèrmè*, s. — Bij Pringambà in Oost-Banjoemas ? *Gringing*, j. Aldus heet soms ook een *Melia*-soort.

159* HAMAMELIDACEAE.

159. ALTINGIA NOR. (*Liquidambar*).

Altingia spec. — *Mala*, s.; *Rasamala*, s. ml. — In enkele streken worden de volgende variëteiten naar de kleur en de geaardheid van het hout onderscheiden: *Rasamala-bòdas*, s.; *Rasamala-kapas*, s.; *Rasamala-gadòk*, s.; *Rasamala-taritih*, s.; — Bij Takòka: *Rasamala-ki-oepi*, s.; *Rasamala-bòdas*, s. en *Rasamala-beureum*, s. of *Rasamala-bènèr*, s. — De hars heet in de Preanger *Kandaj*, s.

Hout zeer duurzaam en zeer sterk; voor huis- en bruggenbouw uitmuntend geschikt; in reusachtige afmetingen en in grcote hoeveelheden in de Preanger en bij Buitenzorg te krijgen.

160* RHIZOPHORACEAE.

De soorten van *Bruguiera* en *Rhizophora* worden in de meeste streken met één en denzelfden geslachtsnaam aangeduid: *Tandjang*, j. md. of *Bako-bako*; ml. boeg. — Eene soort: *Bruguiera parviflora* BL. heeft echter in Besoeki een afzonderlijken naam; n.l.: *Lindòr*, j. boeg. — De eenige mij van Java bekende soort van het geslacht *Ceriops*, ARN. heet constant *Tingi*, j. in geheel Oost-Java. — De *Carallia*-soorten worden door de inlanders ook niet tot het geslacht „*Tandjang*” gebracht.

160. RHIZOPHORA L.

Rhizophora spec. 1 (v. 2). — *Tandjang*, j. ml.; *Bako-bako*, ml. boeg. — In Zuid-Běsoeki *Tandjang-brangga*, j.; in Zuid-Banjoemas *Tandjang-rajap*, j.

Hout onbruikbaar.

161. BRUGUIERA LAM. (*Kanilia*).

Bruguiera spec. A. — *Tandjang*, j. md.; *Bako-bako*, ml. boeg; in bijna geheel Java; echter in Zuid-Preanger bij Balekambang ? *Poetoet*, s. genoemd.

Hout sterk en duurzaam; voor huisbouw; echter alleen in kleine afmetingen te krijgen.

*Bruguiera spec. B. (*Kanilia*).* — *Lindör*, j. boeg. bij Tratas in Banjoewangi. — *Tanājang-kětèk*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas.

Hout onbruikbaar.

162. CERIOPS ARN.

Ceriops spec. — *Tingi*, j. in Banjoewangi. Zeer vaste naam. Ook bij Tjilatjap aldus genoemd.

Hout duurzaam en in strand-dorpen voor staken bij de vischerij zeer gezocht. Alleen in zeer kleine afmetingen te krijgen.

163. CARALLIA RXB. (1).

Carallia spec. 1—2. — Inl. namen òf lokaal en onzeker òf geheel onbekend. *Ki-koekoeran*, s. in Z. W. Bantěn; ? *Koekoeran*, j. in Zuid-Banjoemas; *Kědalen*, j. bij Kědoengdjati in Samarang. — *Ki-koekoeran*, s. in Z. W. Bantěn bij Tjěmara.

Hout ? onbruikbaar.

Noot 1. Het komt mij hoogst waarschijnlijk voor, dat van de geslachten *Gynatroches* BL. en *Kandelia* WIGHT. op Java geene wildgroeïende soorten voorkomen. Vergelijk Natuurk. Tijdschr. v. N. I. l. c., waarin die genera op grond der bestaande literatuur nog onder de geslachtslijst der javaansche woudboomen opgenomen waren.

164* COMBRETACEAE.

164. TERMINALIA L.

Terminalia spec. A. — *Kětapang*, j. md. ml.; *Kětapang-laoet*, ml.

Hout voor pakkisten.

Terminalia spec. B. — *Kloempit*, of *Klòmprit*, j. in Midden-Java, vooral in Samarang, zeer vaste naam.

Hout uitgeloozd misschien voor huisbouw bruikbaar.

Terminalia spec. C. — *Djaha*, s.; *Djâhâ*, j. in Midden-Java zeer vaste naam. — Volgens VORDERMAN, heeten in de afd. Djombang de oude vruchten: *Djâlawe*, j. en de jonge *Djâkling-soekoen*, j.

Hout voor pakkisten; vaak in reusachtige afmetingen.

Terminalia spec. D. — *Djaha*, s. bij *Takôka* in de Djampang (Preanger. — *Thjeueuh*, md. bij Pantjoer op den G. Raoeng-Idjèn in Běsoeki. Beide aldaar vaste namen. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger soms? *Ki-mèông*, s. geheeten.

Hout voor pakkisten; vaak in reusachtige afmetingen.

165. GYROCARPUS JACQ.

Gyrocarpus spec. — Alleen in Banjoewangi gevonden; dáár bij Gradjagan *Gědrěg*, j. en bij Badjoelmati *Ganggan-gan*, j. — Laatstgenoemde naam elders o. a. in Z. W. Běsoeki niet zelden ook aan *Tetrameles nudiflora* R. BROWN gegeven.

Hout voor pakkisten.

166. LUMNITZERA WILLD.

Lumnitzera spec. 2. — In veel streken door de inlanders met denzelfden naam aangeduid als *Rhizophora* en *Bru-guiera*-soorten (zie hieronder). — Bij Tjilatjap heeten deze 2 soorten: *Doedoek-agoeng*, j. en *Doedoek-rajap*, j.

In Z. W. Bantën *Troentoeng*, s. — Elders soms *Aegiceras spec.* zóó genoemd.

Hout onbruikbaar.

167* MYRTACEAE.

167. LEPTOSPERMUM FORST.

Leptospermum spec. — Inl. namen meestal òf onbekend òf onbetrouwbaar. Bij Tjibòdas (Hort. Bogor) op den G. Gède soms *Kajoe-poetih-lëmboet*, s. — Zie beneden onder *Melaleuca*.

Hout onbruikbaar.

168. RHODAMNIA JACQ.

Rhodamnia spec. — Inl. namen meestal òf lokaal en onzeker òf onbekend; het laatste in Midden-Java. — Bij Palaboehan in Zuid Preanger constant *Ki-djambè*, s. of *Ki-beusi*, s.; bij Takòka in de Djampangs (Preanger) ook *Ki-beusi*, s. Beide namen elders niet zelden ook aan andere boomsoorten gegeven.

Hout zeer hard; maar toch onbruikbaar?

169. DECASPERMUM FORST. (*Nelitis*)

Decaspermum spec. — In Zuid-Preanger zonder vaste inl. naam. Dáár soms ?*Ki-sireum*, s. geheeten; bij Tjilatjap ? *Angin-anginan*, j.; bij Takòka (Preanger) soms ? *Ipis-koelit*, s. genoemd.

Hout onbruikbaar?

170. EUGENIA L. (*Syzygium*; *Jambosa*; *Caryophyllus*; *Macromyrtus*; *Jossinia*; *Eu-eugenia*).

Enkele *Eugenia*-soorten hebben duurzaam en sterk, voor huisbouw geschikt hout, bijv. *Risip.* j. in Banjoewangi, *Ki-těmbaga*, s. in de Preanger.

Er zijn een groot aantal inl. namen, welke elk meer of minder constant, soms zeer constant, aan één of meer soorten van het geslacht *Eugenia* L. beantwoorden. Elk dier inl. namen is dus ongeveer gelijkwaardig aan een der achter *Eugenia* L. genoemde synonyme ondergeslachten; met dien verstande echter, dat de grenzen der inl. en latijnsche ondergeslachten meestal niet overeenkomen. Alleen met een der subgenera, met *Jambosa* BENTH. is dit wel het geval. De meeste soorten van dit subgenus heeten *Kòpò*, s. of *Djamboe*, j. ml.; *Tjheumphoeh*, md.

Als inl. namen, die in den regel voor meerdere *Eugenia*-soorten gelden, kunnen o. m. de volgende vermeld worden: *Ki-sireum*, s.; *Pétag*, s.; *Salam*, s. j.; *Manting*, j.; *Ki-těmbaga*, (1) s. en *Gělam*, s. — Deze beide laatste namen voor *Eugenia*-soorten, met koperrooden, papierdun-afschilferenden schors. — Verder: *Djěmbloek*, j.; *Djambòn Doewět*, j. in Samarang; en *Dhoewěh*, md.; *Djoewět*, j. of *Djamblang*, ml. — *Klis*, j. in Zuid-Běsoeki. — *Gòwòk*, j. in Banjoemas bij Pringambà; — *Dòmppjòug*, j. in Banjoewangi. — *Rěšěk*, md. in Běsoeki. — *Bandje*, j. in Zuid-Běsoeki. — *Risip*, j. in Banjoewangi. — *Nāgāsari*, j. bij Pringambà in Banjoemas; elders heet *Mesua ferrea* L. aldus.

Ter aanduiding der soorten of variëteiten worden achter sommige dezer inl. namen achtervoegsels geplaatst; bijv. *Salam-watoe*, j.; *Kòpò-lalaj*, j. s.; *Kampòk-watoe*, j.; *Dhoewěh-beutòh*, md.; *Djěmbloek-krikil*, j.

Door de inlanders worden ook *Anacardium* en *Psidium* tot het „geslacht” *Djamboe*, ml. gerekend. Zie hieronder voor *Psidium* en boven voor *Anacardium*.

In enkele streken bijv. in Banjoewangi heeft de schors van enkele *Eugenia*-soorten, die voor de ververij dienen, een naam, die verschilt van dien, welke de boom draagt, namelijk: *Manting*, j. de boom en *Salam*, j. de schors.

171. BARRINGTONIA FORST.

Barringtonia spec. A. — *Boetoen*, j. s. in Djapàrà, Banjoewangi en Z. W. Bantěn.

Hout voor pakkisten.

(1) Bij JUNGHUHN (Java l. c.) abusievelijk als *Memecylon*-soorten vermeld.

Barringtonia spec. B. — *Poetut* j. s. In Samarang zeer vaste naam. Elders meestal aan deze soort of ook aan soort E. gegeven.

Hout voor pakkisten: uitgeploegd ook voor huisbouw bruikbaar.

Barringtonia spec. C. — *Leprak*, j. in Banjoewangi en Samarang een vaste naam. Elders namen veelal zeer lokaal onbetrouwbaar of geheel onbekend. — In Samarang heeten bij Kêdoengdjati vruchten *Bésole*, j.

Hout als soort B.

Barringtonia spec. D. — *Songgòm*, s. j. bij Margasari in Tégál; bij Pringambâ in Banjoemas en in Z. W. Banten.

Hout onbruikbaar,

Barringtonia spec. E. — *Pénggoeng*, j.; in Samarang (in de djati-wouden) een vaste naam; elders soms tevens voor soort B en F. geldende.

Hout als soort B.

Barringtonia spec. F. — *Pénggoeng*, j. in Zuid-Bésoeki bij Poegër (in den zoom der vloedbosschen) een vaste naam; elders deze naam soms ook voor soort E gebezigd.

Hout onbruikbaar.

172. PLANCHONIA BL.

Planchonia spec. — Inl. naam en groeiplaats aan mij nog onbekend.

173. Cultuurboomen:

MELALEUCA L. en *Eucalyptus* L'Hér. — De verschillende, vooral van het laatste geslacht, niet zelden gecultiveerde soorten worden soms *Kajoc-poetih*, ml. j. genoemd.

TRISTANIA R. Br. — Zonder inl. namen.

PSIDIUM L.

Psidium spec. — *Djamboe-kloetoeck*, ml. j.; *Djamboe-bidji*, s.;
Tjheumphoeh-beutòh, md.; *Tjheumphoeh-bikhih*, md.

Hout onbruikbaar.

EUCALYPTUS L'HÉR.

Eucalyptus spec. div. — Door de inlanders veelal, evenals eenige andere boomsoorten, *Kajoe-poetih*, ml. j. genoemd.

Hout van *volwassen* boomen in Australië geroemd voor huisbouw. Hout van op Java geplante jonge boomen weinig duurzaam gebleken.

EUGENIA L.

Eugenia spec. div. — Door achtervoegsels achter het woord *Djamboe*, j. ml. s. worden de gecultiveerde (*Jambosa*) *Eugenia*-soorten onderscheiden bijv. *Djamboe-ajër*, ml.; *Djamboe-bòl*, ml. — In N. O. Běsoeki: *Tjheumphoeh-bòl* md.; en *Tjheumphoeh-kakèt*, md. — In Banjoewangi: *Djamboe-pěrtòkal*, j.; *Djamboe-wèr*, j. en *Djamboe-těrsāndā*, j.

Hout onbruikbaar; zeer zelden gekapt om de eetbare vruchten.

174* MELASTOMACEAE.
174. ASTRONIA BL.

Astronia spec. — *Ki-harèndòng*, s. zeer vaste naam in de Preanger en in Bantěn. Op den G. Slamet en Těgal en op den G. Oengaran in Samarang meestal bij name geheel onbekend of zeer slecht bekend. Op laatst-genoemden berg werden mij voor één en dezelfde soort achtereenvolgens 6 verschillende inl. namen opgegeven, die alle slechts zeer locale waarde hebben.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar.

175. KIBESSIA DC.

Kibessia spec. — In de Preanger bij Takòka ? *Ipis-koelit*, s. of
 . ? *Ki-djěboek*, s. in Z. W. Bantèn ? *Ki-beusi*, s. — Elders
 inl. namen onbekend.

Hout zeer hard; voor pakkisten.

176. MEMECLON L. (*Lydenia*).

Memecylon spec. div. — Inl. namen onzeker.

177. MELASTOMA BURM.

Melastoma spec. — *Harèndòng*, s. in de Preanger vaste naam voor
 deze soms boomachtige soorten ook voor de talrijke hees-
 terachtige soorten. — Op G. Wilis in Madioen *Sènggani*,
 j. — Kleine boomheester; zeer zelden een boom.

Hout onbruikbaar.

178* LYTHRACEAE.
178. PEMPHIS FORST.

Pemphis spec. — *Sèntigi*, j. in Zuid-Banjoewangi en op het
 eiland Noesâ-baroeng in Z. W. Běsoeki.

Hout zeer duurzaam, sterk en zeer zwaar; voor inlandsche
 ankers gebezigd. Verder onbruikbaar. Alleen in zeer
 kleine afmetingen te krijgen.

179. LAGERSTROEMIA L.

Lagerstroemia spec. A. — *Boengoer*, s.; *Woengoe*, j. *Boengòr*,
 md.; in Běsoeki *Kětangi*, j.

Hout zeer duurzaam en sterk; uitmuntend voor huis-
 en bruggenbouw; zeer gezocht voor affuiten; ook uit-
 stekend bruikbaar voor meubels. Soms in zeer groote
 afmetingen te krijgen.

Lagerstroemia spec. B. — *Bèngèr*, s. — Zeer vaste naam. —
 Elders soms met denzelfden inl. naam als soort A.

Als soort A, maar niet in zoo groote afmetingen te
 krijgen en veel minder algemeen voorkomend.

180. CRYPTERONIA BL. (*Henslowia*).

Crypteronia spec. — *Ki-banèn*, s. in Zuid-Preanger zeer vaste naam. — Elders inl. namen onbetrouwbaar of zeer lo-
caal.

Hout voor pakkisten en misschien ook voor huisbouw
bruikbaar.

181. DUABANGA HAMILT.

Duabanga spec. — *Takir*, j.; *Takèr*, md. in Běsoeki vaste naam.

Hout voor pakkisten.

182. SONNERATIA L.

Hout onbruikbaar.

Sonneratia spec. A. en B. — Beide soorten nu eens met afzon-
derlijke, dan weer met dezelfde namen aan de in-
landers bekend. — *Bogěm*, s. j. en *Prapat*, j. md.
ml. in Banjoewangi. Beide namen in Běsoeki con-
stant en aan vele inlanders bekend. — In Zuid Prean-
ger heet de boom *Bogěm*, s. en de verschillende deelen
als wortels, enz. *Pasoeng*, s.; *Taròntòng*, s.; *Kajoe-
gaboès*, s. en *Ki-dada*, s. — De boom heet in Z. W. Ban-
tèn bij Tjěmara: *Bidada*, s. — De naam *Kajoe-gaboès*,
ml. wordt elders, behalve voor de adem-wortels van
Sonneratia, soms aan *Aegiceras* en soms aan een *Al-
stonia* gegeven; terwijl in Běsoeki op het Idjèn-plateau
Bogěm-goenoeng, j. de naam van een *Wightia*-soort is.

183. Cultuurboomen:**LAWSONIA** L.

Lawsonia spec. — *Patjar-koekoe*, ml. j. — Kleine boomheester.

Hout onbruikbaar.

PUNICA TOURNEF.

Punica spec. — *Dělima*, ml.; *Dimā*, j.; *Dhělimah*, md. — *Granaat-
appel*. — Boomheester. — De *Dělima-poetih*, ml. is een heester.

Hout onbruikbaar.

184* SAMYDACEAE.

184. CASEARIA JACQ.

Hout van alle soorten zeer weinig duurzaam geacht, doch versch gekapt van sommige soorten zeer hard. Voor pakkisten waarschijnlijk bruikbaar.

Casearia spec. div. — Een paar soorten, vooral die van de laagvlakte van Oost-Java zijn aan de inlanders onder den nogal vasten naam *Baloeng*, j.; *Balòng*, j. of *Pheuloeng*, md. bekend. Een dier soorten wordt echter in Zuid-Besoeki niet zelden met een *Grewia*-soort verward en dan ? *Děloewak*, j. genoemd. — Een soort op den G. Wilis in Madioen heet *Tjikal-baloeng*, j.; niet te verwarren met *Tikěl-baloeng*, j. (een *Euphorbia*-soort). — De in de bergen van West-Java groeiende *Casearia*-soorten zijn aan de inlanders meestal of geheel onbekend of onder onbetrouwbare locale namen; bijv. bij Tjibòdas (Hort. Bogor) op den G. Gédé soms ? *Ki-bòntèng*, s.; ? *Ki-tèròng*, s. of ? *Ki-pinang*, s. voor één en dezelfde soort.

185. HOMALIUM JACQ. (*Blackwellia*)

Homalium spec. — *Dělingsěm*, j.; *Dlingsěm*, j.; *Dlišěm*, j.; *Klingsěm*, j.; zeer vaste aan bijna elk inlander bekende namen. — In de Preanger *Ki-bòdas*, s.; in Běsoeki *Kadjoeh-aboeh* md. of *Aboeh*, md.; in Banjoewangi bij Badjoelmati *Ĕsti*, j.

Hout voor pakkisten zeer geschikt; in groote afmetingen en groote hoeveelheden te krijgen. Versch gekapt zeer hard; echter weinig duurzaam.

186* PASSIFLORACEAE.

186. Hiertoe alleen een cultuurboom:

CARICA L.

Carica spec. — *Papaja*, ml.; — *Katès*, j. in Samarang en Rémbang
Katès-gamplòk, j.; — *Katès-gantoeng*, j. en *Kětèlā-gantoeng*,
 j. in Noord-Soerākertā. — *Gandoel*, j. in Bagalèn en Ban-
 joemas. — *Gědang*, s. bij Buitenzorg. In Midden- en
 Oost-Java is echter *Gědang*, j. de naam voor (*Pisang*)
Musa-soorten — *Katès-kaipoer*, j. in Banjoewangi. — In
 Běsoeki *Katès*, md. — Bij Tjēmara in Bantěn constant
Kětela, s.; elders (o. a. in Midden-Java) aldus een *Manihot*-
 soort (*Cassave*) aldus genoemd.

Hout onbruikbaar.

187* DATISCEAE.**187. TETrameLES R. BR.**

Tetrameles spec. — *Winòng*, j. in Midden-Java zeer vaste naam;
 in Oost-Java òf ook zóó genoemd òf *Binoeng*, md.
 òf *Gangangan*, j. — Laatstgenoemde naam in Banjoe-
 wangi en Z. W. Běsoeki.

Hout voor pakkisten. Vaak in reusachtige afmetingen.

188* CACTACEAE.

188. Hiertoe alleen een cultuurboom:

OPUNTIA MILL.

Opuntia spec. — Bij Panaroekan in Běsoeki *Ri-bājā* j.; *Rih-
 pheudjeuh*, md. geheeten.

189* ARALIACEAE.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Terwijl in Oost-Java, speciaal in Běsoeki, de meeste boomvormige *Araliaceae* aan de inlanders niet bij name bekend zijn, en deze in Midden-Java slechts door enkelen met vaste namen aangeduid worden, worden in de Preanger deze boomsoorten goed geëlassificeerd. De aldaar in gebruik zijnde namen als *Djangkòrang*, s.; *Ki-djangkòrang*, s.; *Panggang*, s. (met achtervoegsels als *Panggang-poejoe*, s.); *Ramògiling*, s. worden uitsluitend aan de soorten dezer familie toegekend, en de meesten door Soendaneezen van de Preanger onder een dezer inl. geslachtsnamen gebracht. Slechts met de veel op een *Dysoxylum* gelijkende *Polyscias* (zie hieronder) is dit niet het geval.

In Midden-Java is een *Ficus*-soort, die ook *Panggang*, j. heet; een soendaneesche naam *Panggang*, s. voor een *Ficus* bestaat echter zoover mij bekend niet.

De in Midden-Java voor boomvormige *Araliaceae* gebruik zijnde inl. namen hebben in den regel elk alleen betrekking op één soort. Algemeene „geslachts”-namen worden zoover mij bekend dáár gemist; tenzij de namen *Gòrang*, j. en *Tanganan*, j. die soms aan meerdere *Araliaceae* gegeven wordt als zoodanig aangemerkt mogen worden.

189. PANAX L. (*Nothopanax*).

Panax spec. — *Panggang-tjěrmè*, s. bij Tjibòdas (Hort. Bogor) in de Preanger. Die naam lócaal en onzeker. Elders de naam meestal geheel onbekend. — In Bagèlèn op den G. Kěmbang *Tjòngkrang*, j.; zeer locale naam.

190. HORSFIELDIA Bl.

Horsfieldia spec. — *Djangkòrang*, s. in de Preanger. — *Gaboës*, bij Ngěběl op den G. Wilis in Madioen. Elders heet het stamhout van een *Alstonia* en het wortelhout (der aerotropische wortels) soms ook *Gaboës*, j. — *Gòrang*, j. bij Soerdjā in Pékalòngan. — *Goeng-grang*, j. op den G. Oengaran in Samarang. In enkele streken de inl. naam geheel onbekend.

191. POLYSCIAS FORST. (*Eupteron*).

Polyscias spec. — Inl. namen veelal wel lokaal, maar toch constant en aan vele inlanders bekend. — *Dělēg*, j. in Samarang en Banjoewangi. — *Djěliroe*, j. bij Pringāmbā in Banjoemas. — Bij Tjilatjap ? *Langit*, j. of ? *Kajoe-langit*, j. of ? *Poetjangan*, j.; ? *Djangkòrang*, s. in de Preanger. — Bij Pare in Kědiri constant *Djaran*, j. geheeten. — Elders meestal een andere boomsoort hiermede bedoeld.

192. HEPTAPLEURUM GAERTN. (*Paratropia*).

Heptapleurum spec. div. — *Panggang*, — s.; *Konjingal*, md.; *Tanganan*, j. s.; *Ramò-giling*, s. — Achter den naam *Panggang* wordt dikwijls nog een „soorts”-naam geplaatst bijv. *Panggang-poejoe*, s.; *Panggang-sèrè̃m*, s.; *Panggang-boeloe*, s. — In Bantěn op den G. Poelasari: *Ramò-gě̃ntjě̃l*, s. — In de Djampang (Preanger) *Tjèrè̃m*, s. — Op G. Kěmbang in Bagalèn ? *Sahang*, j. en ? *Sarahan*, j.; beide zeer locale namen.

193. TREVESIA VIS.

Trevesia spec. — Inl. namen als *Horsfieldia*; echter minder algemeen bekend. Vaak zonder inl. naam. — In Banjoewangi bij Rāgādjampi ? *Plě̃ndā*, j.; zeer locale naam.

194. ARTHROPHYLLUM BL.

Arthrophyllum spec. — *Dělēg*, j. in Banjoewangi. — *Ki-djangkòrang*, s. of *Djangkòrang*, s. in de Preanger. — In Bagělèn en Oost-Banjoemas *Poetjangan*, j. — ? *Langit*, j. in Zuid-Banjoemas. — In Z. W. Bantěn bij Tjěmara *Gòmpong*, s.

195. 196. BRASSAIOPSIS DC. et PLANCH. en **MACROPANAX** MIQ.
— Inl. namen dezelfde als *Heptapleurum*.
Mijn determinaties echter nog onzeker.

197* CORNACEAE.

197. *ALANGIUM* LAM.

Alangium spec. — Inl. namen aan mij onbekend.

198. *MARLEA* ROXB.

Marlea spec. A. — *Ki-tjareuh*, s. in vele streken van de Preanger; o. a. in de Djampangs, bij Tjibòdas (Hort. Bogor) op den G. Gêde; bij Tjigèntèng in Tjisondari. — In Bésoeki op het Idjèn-plateau ? *Opas-opasan*, j. — Elders dikwijls zonder inl. naam.

Hout voor stelen van bijlen gezocht; allen in nogal kleine afmetingen.

Marlea spec. B. — Bij Pantjoer op den G. Rahoeng-Idjèn in Bésoeki zonder inl. naam. — In Banjoewangi *Koeniran*, j.

Hout onbruikbaar.

199. *MASTIXIA* BL.

Mastixia spec. — *Ki-tëndjò*, s. bij Takòka in de Djampangs (Preanger) vaste naam.

Hout voor pakkisten.

200. *NYSSA* L. (*Agathisanthes*, *Ceratostachys*).

Nyssa spec. — *Hiroeng*, s. in de Preanger; o. a. bij Takòka in de Djampangs. Zeer vaste naam.

Hout nogal duurzaam, voor huisbouw bruikbaar.

201* CAPRIFOLIACEAE.

201. *VIBURNUM* L.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Viburnum spec. div. — Inl. namen veelal onbekend of weinig betrouwbaar en lokaal. — *Ki-keujeup*, s. en ? *Ki-*

pahang-goenoeng, s. in de Djampangs; ? *Ki-bèwòk*, j. bij Pangèntjongan op den G. Galoenggoeng in de Preanger. — ? *Tèndilan*, j. op den G. Slamet in Tégál. — ? *Pòr-kapòran*, md. bij Pantjoer op den G. Raoeng Idjèn in Běsoeki — ? *Ki-koekoeran*, s. bij Tjbòdas (Hort. Bogor) op den G. Gěde.

202* RUBIACEAE.

202. SARCOCEPHALUS AFZEL;

Sarcocephalus spec. — *Gěmpòl*, j. — In Midden Java constant.
— Elders de naam soms als *Nauclea* L.

Hout voor pakkisten.

203. NAUCLEA L.; ANTHOCEPHALUS RICH. (*Nauclea* L. (pp)); ADINA SALISB. (*Nauclea* L. (pp)); STEPHEGYNE KORTH. (*Nauclea* L. (pp)).

Alle boomvormige javaansche soorten dezer geslachten gelijken in habitus, inzonderheid in de bloeiwijze en in de plaatsing der bovenste steunblaadjes zeer op elkaar.

Zij zijn voor het grootste deel samengevat onder een der namen: *Klěpoe*, j.; *Kòlpòh*, md.; *Angrit*, s.; *Těngěh-tja-ah*, s.; *Tjangtjaratan*, s.; *Tjaratan*, s.; *Djabòn*, j.; *Klěpoe-kětèk*, j.; *Kòlpòh-kětèk*, md.; *Klampejan*, j.; *Gěmpòl-kětèk*, s. — Vooral worden de namen *Klěpoe*, j. en *Kòlpòh*, md. voor meerdere soorten gebezigd. Herhaaldelijk worden de namen voor de eene soort echter met die van een andere door de inlanders verward.

In sommige streken hebben eenige *Nauclea*-soorten meer of minder vaste inl. namen, die vooral op ééne soort betrekking hebben.

NAUCLEA L. (en aanverwante geslachten).

Nauclea spec. A. — *Angrit*, s. in de Preanger een vrij vaste, aan bijna elk inlander bekende naam. — In Banjoemas bij Pringambā *Klěpoe-pasir*, j. en op G. Kapal *Pitjisan*,

s. — Bij Pantjoer in Běsoeki *Bilis*, md. — Bij Ngěběl op den G. Wilis in Madioen *Poendöengan*, j. — Op den G. Poelasari in Bantěn *Těngěh-tjāh*, s. — Soms in de Preanger ook *Tjangtjaratan*, s. geheeten.

Hout duurzaam en sterk; voor huisbouw geschikt.

Nauclea spec. B. — *Klampejan*, j.; *Djabōn*, s. j.; *Klōpōjan*, md.; *Kōlpōjan*, md. — ? *Tjangtjaratan*, s. of ? *Tjangtjaratan-laet*, s. in Zuid-Preanger in de Djampang. — *Handja*, s. in Z. W. Bantěn en bij Palabochan in Zuid-Preanger.

Hout voor pakkisten.

Nauclea spec. div. — Inl. namen als boven onder *Nauclea* en aanverwante geslachten vermeld zijn.

Hout voor pakkisten.

204. HYMENODICTYON WALL.

Hymenodictyon spec. — *Klēpoe-sapi*, j. bij Tjandiroeboc in Middeu-Samarang. Elders inl. naam onbekend.

Hout voor pakkisten. Zeer zeldzame boom.

205. WENDLANDIA BARTL.

Wendlandia spec. — Inl. namen meestal of lokaal of geheel onbekend. — ? *Lōtrōk*, j. op den G. Telemājā in Samarang; *Sēpat*, j. in de bergstreken van Djapāra.

Hout voor pakkisten. Niet in groote afmetingen.

206. WEBERA SCHREB. (*Stylocoryne* (pp)).

Webera spec. — Inl. namen meestal geheel onbekend; enkele malen hier en daar bekend. — ? *Boengboelang-peutjang*, s., in Zuid-Preanger, terwijl dáár *Boengboelang*, s. (zonder achtervoegsel) de naam voor *Premna tomentosa* WILLD is. Soms heet *Webera* aldaar ook, zoomede in Z. W. Bantěn ? *Ki-tandoek*, s.

Hout voor pakkisten. Niet in groote afmetingen.

207. **RANDIA** L. (*Stylocoryne* CAV. (pp); *Gardenia* L. (pp); *Gynopachys* BL.). — Inl. namen aan mij onbekend.

Hout onbruikbaar.

208. **GARDENIA** L.

Gardenia spec. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger zonder vasten inl. naam.

Hout ? onbruikbaar.

209. **PETUNGA** DC.

Petunga spec. — *Apit*, j. in bijna geheel Midden- en Oost-Java een vaste naam; *Ki-hapit*, s. in de Preanger en in Z. W. Bantën. — Ook enkele andere boomsoorten elders met een dezer namen aangeduid. — Meestal slechts een boomheester.

Hout onbruikbaar.

210. **DIPLOSPORA** KORTH.; *Guettarda* L. en *Vanguiera* JUSS. Inl. namen en vindplaatsen mij nog onbekend.

211. **IXORA** L. (*Pavetta* L. (pp)).

Ixora spec. div. — Zonder vaste inl. namen. Boomheesters; meestal slechts heesters. — *Sikatan*, j. in Samarang locale naam.

Hout onbruikbaar.

212. **PAVETTA** L.

Pavetta spec. — *Brasan*, j. op den G. Telemajã in Samarang. Deze naam echter elders aan eenige andere boomsoorten gegeven. — *Ki-tjangkoedoe*, s. bij Pangentjongan op den G. Galoenggoeng in de Preanger. — Elders op Java de namen veelal geheel onbekend of zeer lokaal en onzeker.

Hout voor geweerkolven geschikt bevonden door den Directeur van den Artillerie Constructie-winkel te Soerabaja. — Dit hout echter niet in groote afmetingen en ook niet in groote hoeveelheden te krijgen.

213. MORINDA L.

Morinda spec. A. — *Koedoe-kras*, j. in Madioen en Samarang.
Dáár vaste naam.

Hout bruikbaar voor stelen van bijlen. Niet in groote afmetingen.

Morinda spec. B. — *Měngkoedoe*, ml.; *Tjangkoedoe*, s.; *Patje*, j. ml.; *Kěmoedoe*, j. — Vaste namen.

Hout onbruikbaar.

214. PSYCHOTRIA L. (*Grumilea*);**215. CHASALIA COMM. (*Psychotria* L. (pp));****216. LITOSANTHES BL. en****217. AMARACARPUS BL.** — Inl. namen en vindplaatsen aan mij nog onbekend. Wellicht behooren enkele der in de Preanger *Ki-kòpi*, s. genoemde boomsoorten hiertoe.**218. CANTHIUM LAM.**

Canthium spec. 2. — Inl. namen wel lokaal; maar niet zelden nogal vast. — *Kòpèn*, j. en *Kěmědjing*, j. in Midden-Samarang. — *Ki-kòpi*, s. bij Takòka in de Preanger. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger *Ki-katjang-batoe*, s.; terwijl dáár *Ki-katjang*, s. (zonder achtervoegsel) de naam van een *Strombosia* is. — *Ki-kangka*, s. in Z. W. Bantěn bij Tjěmara: locale naam.

Hout fijn en nogal duurzaam: alleen in kleine afmetingen.

219. SAPROSMA BL. en LASIANTHUS JACQ. — De verschillende soorten dezer stinkende *Rubiaceae* heeten meestal *Ēntoet-ěntoetan*, s. of *Kasimboehan*, s. — De determinatie is nog onzeker.

Hout onbruikbaar.

220. Cultuurboomen:

CINCHONA L.

Cinchona spec. div. — *Kina*, ml. j. s. holl.; *Kènah*, md.

Hout nogal duurzaam.

COFFEA L.

Coffea spec. div. — *Kòpi*, ml. j. s. md.; *Kawo*, j.; *Koffie*.

Hout voor wandelstokken gezocht.

PAVETTA L.

Pavetta spec. div. — ? *Sikatan*, j. in Midden-Java.

Hout onbruikbaar.

MORINDA L.

Morinda spec. — *Patje*, j. ml.; *Mèngkoedoe*, ml. s.; *Tjangkoedoe*, s. ml.; *Kěmoedoe*, j.

Hout? onbruikbaar.

 221* COMPOSITAE.
221. **VERNONIA** SCHREB.

Vernonia spec. — *Hambiroeng*, s.; *Sěmboeng*, j.; *Sěmphoeng* md.; vaste aan de meeste inlanders bekende namen. — Aangezien ook eenige andere *Vernonia*-soorten, o. a. vele heester- en kruidachtige soorten *Sěmboeng*, j. heeten, wordt ter onderscheiding der boomvormige soort aan den naam *Sěmboeng*, j. soms een andere naam toegevoegd; bijv. *Sěmboeng-děděk*, j. in Oost-Banjoemas; *Sěmboeng-gědę*, j. in Madioen op den G. Wilis; *Sěmboeng-joenoeng*, j. op den G. Oengaran in Samarang. — Een der variëteiten van de eenige boomvormige javaansche *Vernonia*-soort heet in de Preanger: *Hambiroeng-beureum*, s. — In Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap heet de

boom soms *Sēmboeng-dēdēk*, j.; soms alleen *Dēdēk*, j.
— De laatste naam wordt elders vooral aan *Ficus alba* REINW. en een paar naverwante *Ficus*-soorten gegeven.

Hout voor pakkisten geschikt en in zeer hooge bergstreken; bijv. op 1500 Meter zeehoogte ook voor huisbouw bruikbaar. — In groote afmetingen en in sommige streken in groote hoeveelheden te krijgen.

222. ANAPHALIS DC. (*Gnaphalium*).

Anaphalis spec. 2. — In Midden-Java veelal *Sëndârâ*, j. of *Sindârâ*, j. Vaste namen. — Soms door locale namen aangeduid, bijv. op den G. Slamati in Tēgal? *Sarasati*, j.; soms bijv. op het Idjèn-plateau zonder inl. naam. — Met andere *Anaphalis*-soorten wordt deze soort door de europeanen weleens *javaansch Edelweisz* genoemd, ofschoon de gelijkenis bijna alleen in de dichte witachtige beharing der bladeren, niet in de botanische verwantschap bestaat.

Hout onbruikbaar.

223* VACCINIACEAE.

223. AGAPETES DOX. (*Vaccinium* MIQ. (haud L.))

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Agapetes spec. div. — Inl. namen meestal of geheel onbekend of zeer lokaal en onzeker. In sommige streken van de Preanger o. a. bij Tjibòdas (Hort. Bogor.), evenals enkele andere alpine boomsoorten *Tjantigi*, s. genoemd. Op het Idjèn-plateau in Běsoeki? *Patjar-goenoeng*, j. — Op den G. Měrbaboe en G. Sëndârâ in Bagělèn en Samarang constant *Manisrēdjâ* j. geheeten.

224* MYRSINACEAE.

224. MAESA FORST.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Maesa spec. div. — In de meeste streken zonder inl. naam. Enkele soorten aan de inlanders bij name bekend: — *Ki-piit*, s. bij Takòka in de Djampangs (Preanger); *Ki-oerang*, s. in Bantën op den G. Poelasari en in de Preanger op den G. Gëde. — In Bësoeki geheel zonder inl. naam.

225. MYRSIN L. — Inl. namen aan mij onbekend.

226. ARDISIA SWARTZ. (*Climacandra*).

Hout der grootste soorten misschien voor pakkisten te gebruiken.

Ardisia spec. div. — Inl. namen der meeste soorten meestal of zeer lokaal en onzeker of geheel onbekend. Slechts de naam *Lëmpëni*, j. s. of *Pëlëmpëni*, j., welke in de laagvlakte van Samarang, in Bantën en in Zuid-West-Preanger aan één en dezelfde species beantwoordt, maakt hierop een uitzondering. Als zeer locale namen mogen genoemd worden: ? *Bareubeu-kakali*, s.; ? *Ki-damar*, s.; *Ki-rësép*, s. en *Ki-haroepat*, s. alle 4 namen voor één enkele soort (met eenige variëteiten) bij Tjibòdas (Hort. Bogor.); ? *Ki-koekoeran*, s. bij Pangëntjongan op den G. Galoeng-goeng; ? *Djirëk*, j. op den G. Oengaran in Samarang; ? *Ki-adjag*, s. bij Sanggrawa in de Djampangs (Preanger) — *Samparantoe*, j. op den G. Këmbang in Bagëlèn; zeer locale naam. In de Preanger heet *Sindora spec.* aldus.

227. AEGICERAS GAERTN.

Aegiceras spec. — *Troentoeng*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas en in Zuid-West-Bësoeki. — Boomachtige heester; nooit een boom.

Hout onbruikbaar.

228* SAPOTACEAE.

228. CHRYSOPHYLLUM.

Hout van beide soorten voor pakkisten.

Chrysophyllum spec. A. — *Sělakět*, j. of *Tjělakět*, md. in Banjoewangi. Elders nog niet gevonden boomsoort.

Chrysophyllum spec. B. — *Ki-lakětan*, s.; in de Preanger vaste naam; in Midden- en Oost-Java of zonder naam of slechts onder onzekere namen aan de inlanders bekend.

229. SIDEROXYLON BL.

Sideroxylon spec. A. — *Kadoe*, j. of *Kědoe*, j. in Banjoewangi. — In West-Běsoeki *Kědoe*, md. of *Kěthoeh*, md. In Kědiri bij Pare *Badoet*, j. of *Kadoet*, j. In Pěkalongan en Banjoemas *Kěmit*, j. — Deze namen zijn alle meer of minder constant. — In Samarang is deze soort aan de meeste inlanders bij name onbekend; wordt dáár o. a. bij Kědoengdjati soms ? *Dělər*, j.; ? *Kětjik*, j. of ? *Gěmblak*, j. genoemd. In de Preanger en Bantěn ook veelal onbekend of weinig bekend. Dáár o. a.: soms ? *Baloen-indjoek*, s. of *Rěngas-gědèpèr*, s. geheeten. Van deze namen hebben bijna alleen *Kědoe*, j. en *Kěmit*, j. eenige waarde. In de Preanger is er een *Diospyros*-soort, die soms ook ? *Baloenindjoek*, s. genoemd wordt; terwijl dáár de naam *Rěngas*, s. (zonder of met achtervoegsel) in het algemeen aan *Semecarpus*- en *Gluta*-soorten beantwoordt.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen en in nogal groote hoeveelheden te krijgen.

Sideroxylon spec. B. — Inl. namen dezelfde als *Payena spec. A* (zie hieronder).

Hout onbruikbaar.

Sideroxylon spec. C. — Inl. namen of geheel onbekend of zeer lokaal. Op het Idjèn-plateau in Běsoeki en aan Zuidkust-Preanger aan de inlanders onbekend. In Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap ? *Antoe-laoet* j.

Hout voor pakkisten.

230. PALAQUIUM BLANCO.

Palaquium spec. A. — In Banjoewangi constant *Njatoe*, j.; *Njatòh*, md. of *Kawang*, j. geheeten. In Samarang bij Karangasem (Grobogan) *Djěmpinô*, j. en *Grawang*, j. Misschien is de laatste een andere soort. Deze beide namen zijn aldaar ook constant. In Zuid-West Běsoeki bij name aan de inlanders onbekend.

Hout duurzaam; voor huisbouw. In Banjoewangi voor gamélans gezocht.

Palaquium spec. B. — Bij Pringambā in Oost-Banjoemas *Woeroesantěn*, j.; in Zuid-Preanger bij Palaboean *Ki-běngang*, s. — Beide namen alleen lokaal van waarde. Zeer zeldzame boom. In den laatsten naam beteekent *Ki* „als”; de boom gelijkt namelijk zeer op *Běngang*, s. (*Neesia altissima* BL.).

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.

231. PAYENA DC. (*Bassia*)

Hout van deze soorten voor pakkisten.

Payena spec. A. — In Preanger en Bantěn meestal *Djěngkòt*, s. of *Djěnggòt*, s.; soms ook ? *Njatoe*, s. of ? *Kakadoeän*, s. In Těgal ook *Djěngkòt*, j. In Běsoeki alleen onder zeer onzekere en zeer locale namen bekend; bijv. *Khětah*, md.; *Reusbreusan*, md. en *Njatòh*, md. Deze namen gelden echter ook voor eenige andere boomsoorten. — In Samarang op den G. Oengaran ook zeer locale, onzekere namen; bijv. *Saoe-goenoeng* j. en *Nangkahan*, j. — Alleen is de naam *Djěngkòt*, s. nogal constant. Al de andere hebben weinig waarde.

Payena spec. B. — Bij Tjëmara in Zuid-West-Bantën vrij constant *Pasra*, s. of *Kasra*, s. geheeten.

232. MIMUSOPS L.

Mimusops spec. — *Sawo*, j. ml.; *Sawoe*, j.; *Sace*, j.; *Sawo-djāwā*, j.; *Sawo-djawi*, j. — Zeer vaste namen.

Hout zeer duurzaam en fraai; prachtig meubelhout. Met *Sono kling*, j (*Dalbergia latifolia* ROXB.) een der beste en meest gezocht meubelhoutsoorten van Java.

233. Cultuurboomen:

MIMUSOPS L.

Mimusops spec. — *Tandjoeng*, j. ml.

Hout voor pakkisten. Zelden gekapt om de bloemen.

ACHRAS L.

Achras spec. — *Saoe-manila*, ml. j.

Hout onbruikbaar. Boom zeer zeldzaam.

PALAEQUIM.

Palaquium spec. div. — De gecultiveerde sumatraansche *Palaquium*-soorten waren aan de door mij ondervraagde inlanders bij name onbekend.

233* EBENACEAE.

234. MABA FORST. (*Rhipidostigma*)

Maba spec. div. — Behalve hierondergenoemde 2 species zijn de *Maba*-soorten aan de inlanders bij name meestal geheel onbekend.

Maba spec. A. — Bij Poegër in Běsoeki *Loetoeng*, j. of *Boeděng*, j.

Hout voor pakkisten; zeer hard.

Maba spec. B. — In Samarang bij Kēdoengdjati constant *Bibis*, j. of *Bibisan*, j. — *Tjantigi*, s. bij Panoembahan aan Zuid-kust Preanger. — *Mērakan*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoe-mas. Laatstgenoemde naam ook voor *Diospyros spec. B.*

Hout voor pakkisten. Zelden in groote afmetingen.

235. DIOSPYROS L. (*Cargillia*; *Leucoxydon*) — Terwijl enkele *Diospyros*-soorten, hetzij lokaal, hetzij over groote uitgestrektheden aan de inlanders onder vaste namen bekend zijn, ontbreken de inl. namen voor andere soorten of geheel en al of zijn die namen zeer onzeker; hetzij doordat ook andere boomsoorten met diezelfde namen aangeduid worden, hetzij doordat de boomsoort aan de meeste inlanders geheel onbekend is.

Diospyros spec. A. — *Kēsēmak*, j. of *Sēmak*, j. in Grobogan (Samarang); — *Klegā*, j. bij Tēlawā in Soerākērtā; ? *Baloeng*, j. in Pēkalōngan bij Soebah; — *Kēsēmēg*, j. of *Sēmēg*, md. in geheel Bēsoeki. — Hiervan zijn alle namen constant; behalve den naam in Pēkalōngan. Deze geldt elders bijv. ook voor een *Casearea*-soort. — In Bantēn is de soort aan de inlanders bij name onbekend.

Hout voor pakkisten; niet in groote afmetingen.

Diospyros spec. B. — *Kolang-kaling-dōngkōl*, j. bij Rāgādjampi in Banjoewangi en *Tōkbrōl*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — Beide namen zeer lokaal. In Z. W. Bantēn aan de inlanders niet bij name bekend.

Hout onbruikbaar.

Diospyros spec. C. — *Bibis*, j.; *Bibisan*, j. of *Kēloran*, j. in Banjoewangi. In Pēkalōngan bij Soebah *Mērakan*, j. In Z. W. Bantēn *Ki-mērak*, s. — Met laatstgenoemden naam in de Preanger een *Podocarpus*-soort aangeduid. — Deze *Diospyros*-soort wordt door de meeste inlanders verward met *Maba spec. B.* — De vermelde namen

alle locaal. In sommige streken is de boom aan de inlanders bij name geheel onbekend.

Hout voor pakkisten. Zelden in groote afmetingen.

Diospyros spec. D. — *Gëntëlan*, s. bij Palaboehan in Z.-Preanger *Ki-gëntël*, s. in Z. W. Bantën bij Tjémara.

Hout soms voor stelen van bijlen. Niet in groote afmetingen. Zeldzame boom.

Diospyros spec. E. — *Ki-tjaloeng*, s.

Hout voor pakkisten; echter zeer hard.

Diospyros spec. F. — *Ki-tjémara*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. Naam alleen van locale waarde. — Elders heet in de Preanger een *Podocarpus*-soort meestal aldus.

Hout onbruikbaar — Zeer zeldzame boom.

Diospyros spec. G. — *Përèlèk*, s. bij Sanggrawa in de Djampang (Preanger).

Hout onbruikbaar. Zeldzaam.

Diospyros spec. H. — *Ki-tjaloeng-mas*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger.

Hout onbruikbaar. Zeldzaam.

Diospyros spec. I. — ? *Brâmâ*, j. bij Tjilatjap in Z.-Banjoemas.

Hout onbruikbaar.

Diospyros spec. J. — *Kajoe-arěng*, s. bij Pasirpandjang in Djampang-koelòn (Preanger). — *Javaansch- of Onecht-indisch-ebben-hout*.

Kernhout zeer gezocht voor wandelstokken en handvatten van wapens. Echter bijna uitgeroeid.

236. Cultuurboomen.

Diospyros spec. — Door de europeanen soms *Kaki* of *Diospyros Kaki* genoemd.

Hout onbruikbaar.

237* STYRACACEAE.

237. SYMPLOCOS L.

Hout van de grootste soorten voor pakkisten; der kleinere onbruikbaar.

Symplocos spec. div. — *Djirak*, s.; *Djirag*, s.; *Djirak-sasak*, s.; *Sasak*, s.; *Sariawan*, s.; *Sasak-badak*, s.; *Djarak-hideung*, s.; *Djirək-woeloeh*, s.; *Sasag-goenoeng*, s.; *Ki-djirak*, s.; *Ki-glədòg*, s. in de Preanger of in Bantën. — In Midden-Java: *Djirək*, j. zonder achtervoegsels. — In Oost-Java zonder vaste inl. namen. — Bij Tjibòdas ('s Lands Plantentuin) in de Preanger *Ki-glədòk*, s.

238. BRUINSMEA BOERLAGE et KOORDERS.

Bruinsmea spec. — *Ki-hoerang*, s. op den G. Karang in het district Tjimanoeck van de afdeeling Pandeglang in Bantën. Deze naam geldt dáár (locaal) uitsluitend voor deze zeldzame boomsoort. Elders worden op Java ook eenige andere boomsoorten met dezen naam aangeduid.

Hout niet ? duurzaam; voor pakkisten. Zeldzame boom.

239. STYRAX L.

Styrax spec. — *Měnjan*, s. ml.; *Minjan*, s. — *Benzoëboom*.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom; en zelden gekapt om de benzoë, die de schors oplevert.

240* OLEACEAE.

240. LINOCIERA Sw. (*Chionanthus*), OLEA LINN.; (*Stereoderma*), en LIGUSTRUM, L. (*Visiania*). — De meeste soorten dezer geslachten zijn door hun zeldzaamheid aan de inlanders bij name onbekend, of

zij dragen alleen zeer locale en veelal onbetrouwbare namen. Voor één soort werden door mij op verschillende plaatsen in de Preanger alleen een 10 tal dergelijke namen genoteerd. Vele dier namen golden in diezelfde streek voor andere boomsoorten. — Een paar namen van soorten, die tot de bovenvermelde 3 geslachten behooren, mogen hier vermeld worden: ? *Ki-haroe*pat, s. bij Pangentjongan op den G. Galoenggoeng; ? *Lěmah*, j. bij Tjandiroeboeh in Samarang; *Ki-bòlèt*, s. in Djampang-koelòn (Preanger); *Hoeroe*, s. in de Preanger en *Woeroe*, j. in enkele streken van Midden- en Oost-Java.

241. FRAXINUS L.

Fraxinus spec. — Inl. naam bij Pantjoer op het Raoeng-Idjèn-gebergte in Běsoeki: *Kètheung*, md. of *Kadjoe*h-*kètheung*, md. — *Ki-dang*, j. en *Kajoe*-*kidang*, j. zijn onbestemde, aan verschillende boomsoorten gegeven namen. De naam *Kètheung*, md. is op de bedoelde standplaats evenwel zeer constant op het Jang-gebergte in Běsoeki (distr. Banjoe-angět) ? *Poetèn* geheeten. — *Javaansche esch*.

Hout wellicht voor huisbouw bruikbaar; in elk geval voor pakkisten.

242* APOCYNACEAE.

Eenige *Apocynaceae*, van verschillende geslachten, die in blad veel overeenkomst hebben met *Rauwolfia*-soorten of met *Alstonia scholaris* R. BR. worden door de inlanders niet zelden door een der volgende namen aangeduid: *Poele*, j.; *Pólaj*, md. of *Lumè*, s. Daarbij wordt dan veelal een achtervoegsel achter den naam geplaatst. De *Apocynaceae* met andere bladeren hebben echter alle geheel andere namen bijv. *Bintarò*, s. en *Djěmbirit*, s.

242. HUNTERIA ROXB.

Hunteria spec. — Groeiplaats en inl. naam aan mij onbekend.

243. CERBERA L.

Cerbera spec. — *Bintarò*, j. ml.; *Bintarò*, s. — Zeer vaste naam. —

In enkele streken worden nog twee variëteiten onderscheiden onder de namen *Bintarò-gède*, s. *Bintarò-leutik*, s.

Hout onbruikbaar.

244. OCHROSIA JUSS (*Lactaria*).

Ochrosia spec. 2. — Beide aan de inlanders bij name onbekend; met uitzondering van Tjilatjap, waar mij voor een der soorten *Sānggā-laungit*, j. als naam opgegeven werd. — Zeer zeldzame boomen.

Hout onbruikbaar.

245. KOPSIA BL.

Kopsia spec. 2. — Inl. namen of geheel onbekend of alleen zeer lokaal en dan nog onzeker; bijv. bij Takòka in Preanger *Ki-kòpi*, s.; op den G. Slamet in Tégál ? *Djambòn*, j. Met beide namen worden ook andere boomsoorten aangeduid bijv. een paar *Rubiaceae* en een paar *Myrtaceae*. — In Poëgër bij Běsoeki is de naam geheel onbekend.

Hout van beide soorten onbruikbaar.

246. RAUWOLFIA L. (*Cyrtosiphonia*, *Ophioxylou*).

Rauwolfia spec. div. — Tot de inl. „geslachtsnamen” *Poele*, j.; *Lamè*, s. of *Pòlaj*, md. gerekend of geheel bij name aan de inlanders onbekend. Het laatste is echter minder het geval dan het eerste. — Hiertoe behoort *Poele-pañdak*, j.; *Pòlaj-pañthk*, md. van Sěmpòlan in Djěmběr (Běsoeki).

Hout van alle soorten onbruikbaar.

247. ALSTONIA BROWN.

Alstonia spec. A en B. — *Poele*, j.; *Lamè*, s.; *Pòlaj*, md. Indien deze namen zonder achtervoegsels gebezigd worden

gelden zij bijna uitsluitend en in alle streken van Java voor een dezer twee *Alstonia*-soorten. Deze drie namen zijn zeer constant en één er van is aan bijna elk inlander bekend. — Het hout heet in enkele streken *Kajoe-gaboes*, j. terwijl het weke hout der acrotropische wortels van 2 *Sonneratia*-soorten eveneens soms *Kajoe-gaboes*, j. genoemd wordt.

Hout voor pakkisten. Bijzonder licht en zeer week; maar niet duurzaam. In zeer groote afmetingen te krijgen.

Alstonia spec. C. — *Lëgarang*, j. of *Logarang*, j. In geheel Midden- en Oost-Java aan de meeste inlanders bekend. In West-Java weinig bekend en dáár de namen veelal lokaal en onzeker. In Zuid-Preanger bij Palabochan *Lamè*, s. geheeten. — In Pékalongan bij Soebah heeft deze soort een paar zeer locale namen: *Ilal-ilatan*, j. of *Baloeng*, j. — Laatstgenoemde naam wordt elders o. m. aan een paar *Cascaria*-soorten, eerstgenoemde meer algemeen aan een *Ficus*-soort gegeven.

Hout nogal duurzaam; voor huisbouw bruikbaar.

Alstonia spec. D. — Aan het Danoe- „meer” in de afdeeling Pandeglang (Bantën) constant *Gaboesan*, s. geheeten. Elders beantwoordt deze naam aan andere plantensoorten.

Hout onbruikbaar. Zeer zeldzame boom.

248. ORCHIPEDA Bl.

Orchipeda spec. A. — *Amproe*, s. of *Amproe-badak*, s. in Djam-pangkoelön (Preanger).

Hout onbruikbaar.

Orchipeda spec. B. — *Lòh-kambing*, j. of *Lèr-kamphing*, md. in Banjoewangi.

Hout onbruikbaar.

249. TABERNAEMONTANA L.

Tabernaemontana spec. — *Këmbirit*, j. in Zuid-Banjoemas en Banjoewangi; *Tjëmbirit*, j. — In Prâbalinggâ,

bij Ngëbël in Madioen en bij Poegér in Z. W. Běsoeki *Gěmbirit*, j. in Pěkalongan en N. W. Samarang. — In Oost-Banjoemas: *Djěmbirit*, j. of *Gěmbirit*, j. — Bij Sěmpòlan in Djěmbër (Běsoeki) ? *Lèr-kamphing*, md. — Bij Pangěntjòngan op den G. Galoenggoeng in de Preanger ? *Amproe-badak*, s. geheeten. — Behalve de laatste twee namen, die meer lokaal zijn, hebben de overigen veel waarde, omdat zeer zelden ook andere boomen met een dierzelfde namen aangeduid worden.

Hout onbruikbaar.

250. WRIGHTIA BROWN.

Wrightia spec. A. en B. — *Měntaos*, s. j.; *Bintaos*, s.; *Běntaos*, s. j. — Vaste namen. — In Zuid-Preanger bij Palabochan soms: *Běntaleus*, s.; in Soemědang (Preanger) *Djalitri*, s. (niet *Djanitri*, s.). — Beide laatste namen zeer lokaal.

Hout voor handvatten van wapens nogal gezocht. Niet in groote afmetingen te krijgen.

251. KICKXIA BL.

Kickxia spec. — In Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap en in Pěkalongan bij Soebah *Santěn*, j. Dáár geen andere, doch elders wèl, andere boomsoorten ook aldus genoemd. — In Z. W. Bantěn bij Tjěmara *Ki-běntěli*, s.

Hout nogal duurzaam; voor huisbouw bruikbaar. Zelden gekapt, omdat de boom zeldzaam is en het sap uit de schors een zeer gezochte inlandsche medicijn is.

252. Cultuurboomen :

PLUMERIA L.

Plumeria spec. — *Sěmbodjâ*, j.; *Sěmbodja*, j. ml.; *Kěmbodja*, s. j. ml. — Algemeen bekende vaste namen. — In Djěmbër (Běsoeki) *Tjěmpakah-moeldjěuh* md.

Hout onbruikbaar.

252* LOGANIACEAE. (1)

252. BUDDLEIA L.

Buddleia spec. — Inl. namen meestal zeer lokaal en dikwijls onbetrouwbaar. — Op G. Sendarā en Diēng *Goedehan*, j. of *Goetihan*, j. — Op G. Wilis in Madioen ? *Ēndjit-ēndjitan*, j. — Veelal heester; soms boomheester.

Hout onbruikbaar.

253. FRAGRAEA THUNB.

Fragraea spec. div. — Inl. namen zeer lokaal, onbetrouwbaar of geheel onbekend. Een soort heet bij Palaboechan in Zuid-Preanger en in Z. W. Bantēn *Tjatjangkoedoean*, s. of *Tjangkoedoe-badak*, s. — Een andere soort heet bij Pantjoer in Bēsoeki *Kalang-mangkheuh*, ml. Laatstgenoemde naam dāār ook aan 2 *Pittosporum*-soorten gegeven. — Niet zelden ook tot het „geslacht” *Woeroe*, j. gebracht; bijv. in Madioen. In Bēsoeki soms *Kajoe-tērōng*, j.

Hout van in Bantēn en Z. Preanger *Tjatjangkoedoean*, s. genoemde soort bruikbaar voor huisbouw; van andere javaansche soorten geheel onbruikbaar.

254. Cultuurboomen.

Fragraea 2 spec. — *Tēmbēsoe*, ml.

Hout zeer duurzaam, fraai en zeer fijn; uitmuntend voor huisbouw en menbels. — Op Java zeer zeldzaam aangeplant en hoogst zelden gekapt.

(1) — Het voortgezet onderzoek naar de boomsoorten van Java heeft mij geleerd, dat waarschijnlijk ten onrechte *Strychnos* L. en *Geniostoma* FORST. (Zie het Natuurk. Tijdschr. v. N. I. l. c.) in de literatuur als woudboomen-geslachten vermeld zijn. Beide zijn op Java waarschijnlijk niet door boomvormige wildgroeijende soorten vertegenwoordigd.

254* BORAGINACEAE.

255. *CORDIA* L.

Cordia spec. A. — *Kěṇḍal*, j.; *Kěṇḍal*, s. — Vaste naam in geheel Java, aan de meeste inlanders bekend.

Hout onbruikbaar.

Cordia spec. B. — *Poernāmāsādā*, j.; *Prāmāsādā*, j. of *Klimāsādā*, j. in Banjoewangi en bij Poegër in Zuid-Besoeki. — Vaste naam.

Hout voor wapengevesten en klein schijrnwerk gezocht. Niet in groote afmetingen. Zeldzame boom.

Cordia spec. C. — Inl. namen òf meestal onbekend òf lokaal en van weinig waarde. Bij Palaboehan in Zuid-Preanger *Blěndoeng-tjai*, s.; dáár heet een *Erythrina*-soort *Blěndoeng* s. — Bij Tjilatjap *Běkak*, j. en in Banjoewangi, zoomede aan de Zuidkust van Djampang-koelòn in de Preanger aan de inlanders geheel onbekend.

Hout onbruikbaar.

256. *EHRETIA* L.

Ehretia spec. div. — Inl. namen meestal onbekend. Namen als *Ki-bakò*, s. (bij Takòka in de Preanger) en *Ki-těróng-gěde*, s. (op den G. Gěde bij Tjibòdas) hebben alleen eenige locale waarde. Eigenaardig is, dat op den Diěng een dezer soorten ? *Kěṇḍal*, j. genoemd wordt, terwijl elders eene soort van het naverwante geslacht constant *Cordia* (zie boven) dezen naam draagt. — Op het Idjěn-plateau in Besoeki heet een der soorten *Kěṇḍal-banjoe*, j. en bij Pringambā in Oost-Banjoemas een andere: *Brabo*, j. Beide namen zeer lokaal.

Hout voor pakkisten.

257. *TOURNEFORTIA* L.

Tournefortia spec. — Inl. namen zeer lokaal of geheel onbekend. — Bij Tjěmarā in Z. W. Bantěn. *Ki-bakò*, s. of *Babakòan*, s.

Hout onbruikbaar.

258* SOLANACEAE.**258. SOLANUM L.**

Solanum spec. — Bij Tjibòdas op den G. Gédé in de Preanger
Tětër, s.

Hout onbruikbaar.

259—260. Cultuurboomen:**SOLANUM L.**

Solanum spec. — *Takòka*, j. in Samarang bij Sâlâtigã. Elders
meestal zonder inl. naam. — Bij *Takòka* in de Preanger
heeten eenige dáár wildgroeïende heesterachtige *Solanum*-
soorten *Takòka*, s.

Hout onbruikbaar.

CYPHOMANDRA SENDTN.

Cyphomandra spec. — *Tèròng-blanda*, ml. s. — Boomheester.

Hout onbruikbaar.

261* SCROPHULARIACEAE.**261. WIGHTIA WALL.**

Wightia spec. — Op het Idjèn-plateau in Bésoeki soms *Bògēm-
goenoeng*, j. geheeten. Die naam zeer lokaal en slechts
aan enkelen bekend. Buiten Bésoeki is deze soort op
Java nog niet waargenomen. — *Bògēm*, j. is meestal de
naam voor een *Sonneratia*-soort

Hout onbruikbaar.

262* GESNERIACEAE.**CYRTANDRA FORST.**

Cyrtandra spec. — Inl. namen meestal onbekend. — Boomheester.

Hout onbruikbaar.

263* BIGNONIACEAE.

263. **OROXylum** VENT. (*Calosanthos*)

Oroxylum spec. — *Pongpòrang*, s. in geheel West-Java. — *Moengli*, j. of *Woengli*, j. in Midden Java. — In Z. W. Běsoeki bij Poegěr en in Banjoewangi *Lanang*, j. of *Kajoelanang*, j.
Hout onbruikbaar.

264. **DOLICHANDRONE** SEEM. (*Spathodea* BEAUV. (pp)).

Dolichandrone spec. — *Kajoe-djaran*, j. in bijna geheel Midden- en Oost-Java. — *Djaran-pèlòk*, j. in Pěkalongan bij Soebah. — *Ki-djaran*, s. in Zuid-Preanger en Z. W. Bantén. — De naam *Djaran*, j. ook aan *Odi-na* spec. en een paar andere boomsoorten gegeven.
Hout onbruikbaar.

265. **STEREOSPERMUM** CHAM. (*Spathodea* BEAUV. (pp)).

Stereospermum spec. A. — *Kědali*, j.; *Pědali*, j.; *Gědali*, j.; *Dali*, j. en *Bědali*, j.; vaste namen in bijna geheel Midden- en Oost-Java. — In West Běsoeki bij Pantjoer en Sěmpòlan *Kar-pòtè*, md. of *Pò-tějan*, md. Deze beide namen ook aan een paar andere boomsoorten gegeven. — In West-Java constant *Ki-padali*, s. geheeten.

Hout nogal duurzaam en sterk; voor huisbouw geschikt. In groote afmetingen te krijgen.

Stereospermum spec. B. — Zonder inl. naam in de meeste streken van Java. Soms door locale, weinig betrouwbare namen aangeduid; bijv. ? *Ki-hapit*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger; en ? *Ambal*, j. in Oost-Banjoemas bij Pringāmbā. — Soms, bijv. op den G. Slamāt in Těgal en in Zuid-Preanger bij Palaboehan met denzelfden naam als de voorgaande soort benoemd; dus *Kědali*, j. of *Ki-padali*, s.

Hout nagenoeg onbruikbaar.

266. Cultuurboomen:

CRESCENTIA L.

Crescentia spec. — In Z. W. Bantën bij Tjëmara *Bërnoek*, s. —
Inl. naam van elders mij nog onbekend.

Hout onbruikbaar.

MILLINGTONIA L. f.

Millingtonia spec. — In Banjoewangi *Sëkar-pětak*, j. — Deze
naam alleen lokaal van eenige waarde.

Hout ? onbruikbaar.

KIGELIA DC.

Kigelia spec. — De algemeen bekende *Worstenboom*. — Zonder
inl. naam.

Hout ? onbruikbaar.

267* VERBENACEAE.

267. **GEUNSLA BL.**

Geunsia spec. — Inl. namen weinig bekend; alleen constant in
de Djampang (Zuid-Preanger); daár *Oempang*, s. ge-
heeten. — Elders meestal door de inlanders met dezelfde
namen aangeduid als de boomvormige javaansche *Ver-*
nonia (zie boven).

Hout voor pakkisten.

268. **CALLICARPA L.**

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

Callicarpa spec. div. — Inl. namen òf geheel onbekend òf zeer
locaal en weinig bekend; bijv. in Z. W. Bantën
Katoempang, s.; — op den G. Wilis in Madioen
? Gambiran, j.; — in Banjoewangi *? Brasan*, j. — Met
elk dezer namen elders soms andere plantensoorten
aangeduid. — Kleine boomheesters.

269. **TECTONA L.**

Tectona spec. — *Djati*, j. s. ml.; *Tjheutèh*, md. — In Rëmbang worden de volgende variëteiten onderscheiden: *Djati-wéroet*, j.; *Djati-ri*, j.; *Djati-dòrèng*, j.; *Djati-këmbang*, j.; *Djati-soengoe*, j.; *Djati-lëngâ*, j. of *Djati-lisah*, j.; *Djati-kéjòng*, j. en *Djati-ka-poer*, j. terwijl de groote knoestvormige uitwassen, die soms aan djatiboomen voorkomen dáár en ook elders in Midden-Java *Djati-gèmból*, j. genoemd worden; zonder dat met laatstgenoemden naam een bepaalde variëteit bedoeld wordt. — In de Preanger bij Tòmò (Soemëdang) kennen de inlanders de volgende variëteiten: *Djati-kapas*, s.; *Djati-leutik*, s.; *Djati-tjoetjoeck*, s. en *Djati-minjak*, s. terwijl dáár een jonge djatiboom *Dòdòlan*, s. geheeten wordt.

Hout bijzonder duurzaam, zeer fraai en zeer sterk; uitmuntend voor huisbouw en meubels. Het *teak-hout* van den handel is van een in Britsch-Indië gegroeide variëteit deze soort afkomstig. *Djati* wordt dikwijls ook *Java-teak* genoemd.

270. **PREMNA L.**

Premna spec. A. — *Boengboelang*, s. in de Zuid-Preanger; — *Boelang*, j. of *Gëmboelang*, j. in Tëgal; — *Bolang*, j.; *Boelang*, j. of *Boenglang*, j. in Samarang en Banjoemas. — In Z. W. Bësoeki bij Poegër en in Banjoewangi *Gadoengan*, j. — Deze naam niet te verwarren met *Gadoeng*, j., met welken naam meestal *Dioscorea*-soorten aangeduid worden.

Hout duurzaam en sterk; voor huisbouw geschikt. Niet in groote afmetingen te krijgen.

Premna spec. B. — *Singkil*, j. in Z. W. Bësoeki bij Poegër en in Banjoewangi een vaste naam. — In de Preanger en Bantën weinig, en alleen onder zeer locale onzekere namen bekend; bijv. *Ki-soengit*, s.; *Ki-pahang*, s.; *Ki-pahang-gëde*, s. en ? *Binar*, s.

Hout onbruikbaar.

271. **GMELENA L.**

Gmelina spec. — *Warèng*, j. s. in Samarang en in Z. W.

Bantén. — Namen elders door mij nog niet genoteerd. —
Boomheester.

Hout onbruikbaar.

272 VITEX L.

Vitex spec. A. — *Lagoendi*, s. j. of *Lëgoendi*, j. s. — Meestal
heester; soms een boom.

Hout onbruikbaar.

Vitex spec. B. — *Laban* j. s.; *Heuras*, s.; *Heas*, s. of *Lëpën*,
md. in geheel Java vaste namen, welke vooral voor de
op Java meest algemeen voorkomende *Vitex*-soort (*V. pubes-*
cens VAHL) geldt, doch ook soms aan *Vitex spec. C* en *D*
gegeven wordt. Als locale namen dienen nog de volgende
vermeld te worden: *Laban-Këtilëng* j. of *Këtilëng*, j. (soms)
bij Poegér in Z. W. Bësoeki en (soms) bij Këdoengdjati
in Samarang; — *Ki-laban-gëde* s. en *Laban-tandoek*, s. in de
Preanger; — *Laban-bërnang*, j. in Z. W. Bësoeki; — *Laban-*
soengoe j.; *Laban-ka-poer*, j. en *Laban-koenjit*, j. — De
laatste 3 namen gelden bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas
voor den stamvorm met twee variëteiten.

Hout zeer duurzaam, fraai sterk en fijn; uitmuntend
voor huisbouw en meubels. Zelden in groote afmetingen
(bij Tjilatjap).

Vitex spec. C. — *Ki-bangbara*. s. in Bantén en de Preanger vrij
constante naam. In Samarang meestal *Tilëng*, j. of *Kë-*
tilëng, of *Gëntilëng*, j. — De laatste naam soms ook voor
de vorige en volgende soort. — Soms zonder inl. naam.

Hout bruikbaar voor huisbouw; zelden in voldoende
afmetingen.

Vitex spec. D. — In Zuid-West-Bantén zonder inl. naam.

Hout voor ?huisbouw.

Vitex spec. E. — *Bigboel*, s. in de Djampangs, bij Palaboehan
en bij Soemedang in de Preanger een constante naam, die
voor geen andere boomsoort geldt. — In Tégal en in Zuid-
Banjoemas bij Tjilatjap *Këtilëng*, j. — In Samarang bij

Kědoengdjati *Laban*, j. — Beide laatste namen gelden ook voor een paar andere *Vitex*-soorten.

Hout voor huisbouw.

273. **PERONEMA** JACK.

Peronema spec. — *Ki-sabrang*, s.; locale naam op de eenige mij bekende groeiplaats bij Tjaringin in West-Bantën.

Hout duurzaam; voor huisbouw geschikt. Op Java zeer zeldzaam.

274. **AVICENNIA** L.

Avicennia spec. 1 (v. 2?). — In Běsoeki *Api-api*, j. ml. — Met dezen naam worden in sommige kustplaatsen ook eenige andere boomsoorten aangeduid. — Naam in Běsoeki echter constant voor *Avicennia*. — Aldaar ook *Apěh-apěh*, md. geheeten.

Hout onbruikbaar.

275. Cultuurboomen:

DURANTA L.

Duranta spec. — Zonder inl. naam.

Hout onbruikbaar.

276* NYCTAGINACEAE.

276. **PISONIA** L.

Hout van alle hieronder genoemde soorten onbruikbaar.

Pisonia spec. A. — *Widjājā-koesoemā*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas (1). In Noord-Djapāra (o. a. op de Karimōn-djawa-eilanden) *Sěntōlōng*, j.

(1) De rots, waar de »Bloem der overwinning» vooral groeit en vanwaar de bloemen voor de kroning der javaansche »keizers» gehaald worden, is door mij in 1891 beklommen, terwijl aldaar van een paar bloeiende *Pisonia*'s door mij herbarium verzameld werd.

Pisonia spec. B. — *Ki-tjaoe*, s.; *Kajoe-gědang*, j. of *Gědang*, j.; *Kadjoe-khětheung*, md.; *Kadjěng-pisang*, j. — Behalve de laatste naam, die zelden gebezigd wordt, zijn de overige namen zeer vast en aan vele inlanders bekend. Ook *Musa*-soorten worden *Gědang*, j.; *Pisang*, ml. of *Khětheung*, md. genoemd. — Op den G. Oengaran in Samarang en in Oost-Banjoemas heet de boom *Arès*, j. (evenals de schijnstam van een banaan) en de vruchten *Blândā*, j. — In Banjoewangi heet de boom *Gedang*, j. of *Kajoe-gědang*, j. en worden de vruchten *Poeloetan*, j. genoemd. — Elders heeten enkele andere (heesterachtige) gewassen ook *Poeloetan*, j. — In West-Java heet *Carica* soms ook *Gědang*, s. — De bovengenoemde namen, waarin *Ki*, *Kajoe*, *Kadjěng* of *Kadjoe* voorkomt, sluiten vergissingen met *Musa*, *Carica* en andere planten-soorten geheel buiten. — Deze soort zou de *javaansche vogelvangende boom* genoemd mogen worden.

277. Cultuurboomen :

Pisonia spec. — *Kool-banda*, ml.; soms ook *Kool-blanda*, ml. — Op Java door mij nooit bloeiend waargenomen. Bijzonder moeilijk van *Pisonia spec. A* te onderscheiden.
Hout onbruikbaar.

278* MYRISTICACEAE.

278. MYRISTICA L.

Hout van 3 eerstgenoemde soorten en van de overige groot wordende soorten bruikbaar voor pakkisten.

Myristica spec. A. — *Klapatjoeng*, s. in de Preanger en Bantën een vaste naam. — In Zuid- en Oost-Banjoemas ook *Klapa-tjoeng*, j.; in Běsoeki bij Pantjoer op het Raoeng-Idjèn-gebergte *Theureu* of *Theureu-měrah*, md. In Midden-Java soms *Nangkahan*, j. geheeten.

Myristica spec. B. — In Samarang bij Kědoengdjati *Kiringan*, j. in Soerakěrtā bij Tělawā *Klapan*, j.; — in Zuid-Preanger bij Palaboehan soms *Klapatjoeng*, j. s. — In vele streken zonder inl. naam.

Myristica spec. C. — *Ki-mòkla*, s. in de Preanger en Bantěn. Namen in Midden- en Oost-Java onzeker en lokaal of geheel onbekend. In West-Běsoeki *Theureu*, md. of *Theureu-pòtèh*, md.

Myristica spec. div. — Sommige soorten geheel zonder inl. naam, anderen met locale namen, wěer anderen met dezelfde namen als een der voorgaande soorten: *Rah*, j. of *Kadjěng-rah*, j. in Zuid- en Oost-Banjoemas; — *Laka*, s. of *Ki-laka*, s. in Zuid-Preanger en Z. W. Bantěn; — *Tjoe-likět*, s. in Z. W. Bantěn; — *Ki-tjareulang*, s. in Zuid-Preanger; ? *Kakadoean*, s. bij Sanggrawa in de Djampang (Preanger). Voorts niet zelden ook tot *Woeroe*, j. of *Hoe-roe*, s. gerekend. — In Banjoewangi soms *Walikangin*, j.

279. Cultuurboomen:

Myristica spec. — *Pala*, ml. s.; *Pâlā*, j.; *Notenmuskaut*.

280* MONIMIACEAE.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

280. **TAMBOURISSA** SONN.

Tambourissa spec. — Inl. naam en boom aan mij onbekend.

281. **KIBARA** ENDL.

Kibara spec. — In de Djampang (Preanger) en in Bantěn *Kikoeja*, s. — Elders inl. namen onbekend of onbetrouwbaar.

282* LAURACEAE.

Terwijl enkele *Lauraceae* aan de inlanders bij name geheel onbekend zijn en enkelen door hen met zeer constante, onderling echter geheel verschillende namen (bijv. *Ki-lèmòk*, s.; *Ki-sèrèh*, s.; *Tangkalak*, s.) aangeduid worden, dragen een zeer groot aantal soorten samengestelde namen, waarvan het eerste lid hetzelfde is. In West-Java is die eerste, die algemeene naam *Hoeroe*, s.; in bijna geheel Midden- en Oost-Java *Woeroe*, j.; in de door Madoereezen bewoonde streken van Oost-Java *Boeroeh*, md.; in Madioen op den G. Wilis en in Prâbalinggâ op den G. Smeroe *Njampoe*, j.

Wanneer in een inlandschen boom-naam het eerste lid uit een dezer 4 woorden bestaat, dan mag men in de meeste gevallen, vooral bij west-javaansche-namen aannemen, dat de betreffende boomsoort tot de familie der *Lauraceae* behoort. Evenwel zijn de gevallen, waarin ook tot andere families behoorende boomsoorten door de inlanders tot een dezer inlandsche „geslachten” gebracht worden niet zeldzaam. Dit is bijv. het geval met enkele *Myristicaceae*, *Euphorbiaceae*, *Juglandaceae*, *Myricaceae*; in het algemeen met boomsoorten, die in habitus, bloeiwijze of anderszins op eenige der meest algemeen voorkomende typische „*Hoeroe*”-soorten gelijken en daarbij, zooals *Acer spec.*; *Myristica spec.* en *Daphniphyllum spec.* bladeren bezitten, die aan de onderzijde (evenals bij vele *Lauraceae*) dofblauwachtig-grijs van kleur zijn.

Terwijl de naam *Hoeroe*, s. bijna uitsluitend in West-Java in gebruik is en in javaansche landen door *Woeroe*, j. vervangen is, wordt in Tëgal ook het woord *Hoeroe*, j. door de Javanen gebezigd.

Terwijl de Soendaneezen als uitmuntende plantenkenner een zeer groot aantal *Hoeroe*-soorten van elkander onderscheiden en betrekkelijk weinig boomsoorten van andere families tot *Hoeroe*, s. rekenen, kennen de Javanen, althans die in Samarang en Madioen, slechts weinige *Lauraceae*, terwijl zij daarbij een groot aantal soorten van andere families ook tot hunne geslachten *Woeroe*, j. of *Njampoe*, j. rekenen. De madoereesche naam *Boeroeh*, md. heeft nog minder waarde. In streken, waar ik zooals in West-Bësoeki een 15—20 tal boomvormige *Lauraceae* vond, brachten de bewoners (Madoereezen) aldaar er slechts een 5-tal tot hun „geslacht” *Boeroeh*, md. en onderscheidde die door bijzondere soortnamen, terwijl de overigen of geheel bij name onbekend waren of door hen met andere boom-

soorten verward werden. De naam *Boeroeh*, md. is bijzonder onbestemd, de namen *Woeroe*, j. en *Njampoe*, j. zijn iets scherper begrensd en de naam *Hoeroe*, s. is in veel gevallen gelijkwaardig met de familie der *Lauraceae*.

In de Preanger en Bantën worden de volgende soorten van *Hoeroe*, s. onderscheiden, welke tot de *Lauraceae* behooren:

Hoeroe-apoe, s.; *H.-batoe*, s.; *H.-beès*, s.; *H.-bòdas*, s.; *H.-dapoeng*, s.; *H.-djamoer*, s.; *H.-gading*, s.; *H.-gambir*, s.; *H.-hiris*, s.; *H.-kadantja*, s.; *H.-kamplòng*, s.; *H.-katjang*, s.; *H.-kònèng*, s.; *H.-leueur*, s.; *H.-leuksa*, s.; *H.-madang*, s.; *H.-mangga*, s.; *H.-manglid*, s.; *H.-meuhmal*, s.; *H.-mèntèk*, s.; *H.-mèrang*, s.; *H.-minjak*, s.; *H.-pajoeng*, s.; *H.-sapoe*, s.; *H.-sintòk*, s.; *H.-talès*, s.; *H.-tantoek*, s.; *H.-tèdjò*, s.; *H.-tjabè*, s.; *H.-toembilan*, s.; *H.-toendoeng*, s.

In Midden- en Oost-Java worden de volgende soorten van *Woeroe*, j. onderscheiden, welke tot *Lauraceae* behooren:

Woeroe-dòbòs, j.; *W.-dapoeng*, j.; *W.-djati*, j.; *W.-dèdak*, j.; *W.-dèdèk*, j.; *W.-gèdang*, j.; *W.-gèdòbòs*, j.; *W.-gèdāwā*, j.; *W.-gèmplòng*, j.; *W.-gòmbòng*, j.; *W.-kapoer*, j.; *W.-kamplòng*, j.; *W.-kèmbang*, j.; *W.-kèmploeng*, j.; *W.-kètèk*, j.; *W.-kindjèng*, j.; *W.-konjit* of *W.-koenjit*, j.; *W.-lèmah*, j.; *W.-loetoeng*, j.; *W.-mangir*, j.; *W.-mèdang*, j.; *W.-pajoeng* of *W.-sòngsòng*, j.; *W.-pètjèl*, j.; *W.-prit* of *Emprit*, j.; *W.-pinggang*, j.; *W.-sèpat*, j.; *W.-sèpèt*, j.; *W.-sèmoet*, j.; *W.-sintòk*, j.; *W.-tjèlèng*, j.; *W.-? tjèmpākā*, j.; *W.-tjilirang*, j.; *W.-watoe*, j.; *W.-widjèn*, j.; *W.-wingkā*, j.

In Madioen en Prābālinggā behooren de volgende soorten van *Njampoe*, j. tot de *Lauraceae*: *Njampoe-gagang*, j.; *Nj.-gòmbòr*, j.; *Nj.-tinggi*, j.; *Nj.-krikil*, j.; *Nj.-gòmbòng*, j.

In Bèsoeki worden de volgende (en nog weinige meer) soorten van *Boeroeh*, md. onderscheiden, welke tot de *Lauraceae* behooren:

Boeroeh-pòtèh, md.; *B.-bibis*, md.; *B.-kheutjheuh*, md.; *B.-mèrah*, md.; *B.-kònèng*, md.

Hetzij in Midden- en Oost-, hetzij in West-Java worden de volgende namen, waarin de woorden *Woeroe*, j.; *Hoeroe*, j.; *Boeroeh*, md. en *Njampoe*, j. ontbreken, aan eenige *Lauraceae* gegeven, zonder dat daarbij altijd dezelfde naam constant voor dezelfde soort

gebezigd wordt: In West-Java: *Tedjā*, j.; *Tedja*, s.; *Ki-pajoeng*, s.; *Ki-taleus*, s.; *Ki-tèdja*, s.; ? *Meuhmal*, s. — In Madioen: *Talėsan*, j.; *Slasih-tjèlèng*, j. en *Trawas*, j. — In Běsoeki: *Prabeus*, md.; *Padjoeng*, md.; *Tjartjina*, md.

Terwijl op Sumatra veel *Lauraceae* met den naam *Mědang*, ml. of *Madang*, ml. aangeduid worden, heeten in Z. W. Bantën bij Tjémara 2 Lauraceeën-species ook *Mědang*, s. namelijk *Mědang-kapas*, s. en *Mědang-batoe*, s.

Van vele, maar op verre na niet van de meeste Lauraceae, *echte hoeroe-soorten*, is het hout duurzaam en voor huisbouw of meubels geschikt.

De volgende soorten van *Lauraceae* hebben zeer constante inlandsche namen; die niet zelden over zeer groote uitgestrektheden aan één en dezelfde species gegeven worden:

Soort A. — *Ki-lèmòk*, s.; *Krangejan*, j.

Hout onbruikbaar.

Soort B. — *Tangkalak*, s.; soms ook *Hoeroe-tangkalak*, s.

Hout ? onbruikbaar. — Zelden gekapt om de eetbare vruchten.

Soort C. — *Slasèjan*, md. in West-Běsoeki bij Pantjoer op het Raoeng-Idjèn-gebergte; *Tėlasih*, j. in Madioen op den G. Wilis.

Hout zeer duurzaam en zeer sterk; bijzonder geschikt voor huisbouw. Even deugdzaam als djati. In zeer groote afmetingen te krijgen.

Soort D. — *Manis-djangan*, j.; *Manės-tjheungan*, md.; *Ki-amis*, s.; *Kaneelboom*.

Hout onbruikbaar.

Soort E. — *Adēm-ati*, j. in Samarang bij Kědoengdjati en in Z. W. Běsoeki bij Poegèr.

Hout onbruikbaar.

Soort F. — *Ki-sèrèh*, s.: *Ki-pédès*, s. — Misschien is de laatste een variëteit van de eerste soort.

Hout duurzaam en sterk; voor huisbouw gezocht. In de meeste streken zijn de volwassen boomen uitgeroeid.

Soort G. — *Ki-kadantja*, s. in bijna de geheele Preanger een vaste naam; vooral in de Djampang. — Bij Tjibòdas ('s Lands Plantentuin) op den G. Gède soms *Hoeroe-tjèmpaka*, s. genoemd.

Hout voor pakkisten geschikt. In groote afmetingen en in sommige streken; bijv. op den G. Slamet in Tègal in groote hoeveelheden.

Soort H. — *Gèmpoer*, j. in Grobogan (Samarang). — In de Preanger bij Pangèntjongan op den G. Galoenggoeng *Hoeroe-kònèng*, s.

Hout onbruikbaar.

Soort I. — *Hoeroe-katjang*, s. in de Djampang. en vele andere streken van de Preanger bijzonder vaste naam.

Hout buitengewoon duurzaam. In groote afmetingen. Echter bijna uitgeroeid.

283. HERNANDIA L.

Hernandia spec. — In Z. W. Bantén bij Tjémara *Kampak*, s.; in Zuid-Preanger bij Palaboehan *Binòng-laoet*, s.; in Zuid-Banjoemas bij Tjilatjap *Kèmirèn*, j.; in Banjoewangi *Bèngkak*, j.; op het Noordwachters-eiland en enkele strandplaatsen *Kèmiri-tjina*, ml.

Hout onbruikbaar.

284. Cultuurboomen:

PERSEA GAERTN.

Persea spec. — *Apokat*, ml.; *Advokaat-boom*.

Hout? onbruikbaar. Boom hoogst zelden gekapt om de eetbare vruchten.

CINNAMOMUM BL.

Cinnamomum spec. — *Ki-amis*, s.; *Manis-djangan*, j.; *Ceylon-sche Kaneelboom*.

Hout onbruikbaar. Boom zeer zelden gekapt om de schors, welke als *kaneel* aan ieder bekend is.

285* **PROTEACEAE.****285. HELICIA** LOUR.

Helicia spec. div. — *Kěndoeng*, s. — In Midden-Java: *Kěndoeng*, j. of *Kěndang*, j. — In sommige streken bijv. in Madioen op den G. Wilis zonder inl. naam.

Hout der groote soorten voor huisbouw: der kleinste soort onbruikbaar.

286* **THYMELAEACEAE.****286. AQUILARIA** LAM.

Aquilaria spec. — *Kajoe-garoe*, s.; *Garoe*, s. — In West Běsoeki heeten een paar *Dysoxylum*-soorten ook *Kheuroeh*, md. — In Z. W. Bantěn onderscheiden de inlanders 2 variëteiten: *Garoe-kapas*, s. en *Garoe-hideung* s.

Het oude hout als het kostbare *Garoe*- of *Wierook-hout* algemeen bekend. Zeer zeldzame, reeds bijna uitgeroeide boom.

287. GONYSTYLUS TEYSM. et BINX.

Gonystylus spec. — Bij Plělèn in Pěkalongan *Sěndarèn*, j. Deze naam zeer lokaal en slechts aan enkelen bekend.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.

288* SANTALACEAE.

288. SANTALUM L.

Santalum spec. — *Tjéntheunah*, md. bij Laras in afd. Panaroekan (Běsoeki); *Echt-santal-hout*; *Tjëndānā*, j. in Běsoeki. Veelal ook *Sandelhout* genoemd.

Hout welriekend, duurzaam en zeer fijn; voor fijn schrijnwerk en wapengevesten bijzonder gezocht. Bijna uitgeroeid. Alleen in kleine afmetingen.

289. EXOCARPUS LABILL.

Exocarpus spec. — *Tjéntheunah-kastòrèh*, md.; *Tjëndānā-sěmoet*, j.; beide namen bij Badjoelmati in Banjoewangi. — *Onecht-santal-hout*.

Hout als van *Santalum*, doch minder welriekend. Door mij alleen in N. O. Běsoeki gevonden.

290* EUPHORBIAEAE.

290. BRIDELIA WILLD. (*Briedelia*)

Bridelia spec. div. — *Kanjèrè*, s.; *Kanjèrè-leutik*, s.; *Kanjèrè-badak*, s.; *Ki-anjèrè*, s. — *Kandri*, j. in Samarang en Banjoemas. — In Běsoeki aan de inlanders bij name onbekend; bij Pantjoer op het Raoeng-Idjèn-gebergte ? *Landak*, md. genoemd. Die naam echter lokaal. — De naam *Kanjèrè*, s. algemeen bekend en vrij constant. — Soms wordt *Dendrobium spec.* ook *Kanjèrè-laoet*, s. genoemd.

Hout van de grootste soort, (*Kanjèrè badak*, s.) voor pak- kisten bruikbaar, der overige soorten onbruikbaar.

291. CLEISTHANTHUS HOOK. (*Nanopetalum*)

Cleistanthus spec. — Inl. namen onbekend of zeer lokaal en onbetrouwbaar. Bij Poegër in Z. W. Běsoeki werden mij achtereenvolgens voor één en dezelfde

soort 4 namen opgegeven, welke in den regel voor andere boomsoorten gelden.

Hout onbruikbaar. Zeldzame boom.

292. EUPHORBIA L.

Euphorbia spec. — Op de eenige mij bekende vindplaats heet deze boomvormige wildgroeierende *Euphorbia* constant *Soeroeh-kěbo*, j. of *Soeroeh-maisā*, j.

Hout onbruikbaar.

293. ACTEPHILA MUELL. ARG.;

294. HEMICYCLIA W. et ARN.;

295. GALEARIA ZOLL. et MOR.;

296. PARACROTON MIQ.;

297. COELODEPAS HASSK.

De groeiplaats op Java of de inl. namen van 293—296 aan mij onbekend; van 297 bij Palaboehan in Preanger is de locale naam *Kěmandèn*, s.

298. PHYLLANTHUS L.

Emblica GAERTN.; *Reidia* WIGHT; *Ceramanthus* HASSK; *Anisonema* A. JUSS; *Scepasma* BL.; *Prosorus* DALZ.

Phyllanthus spec. A. (Emblica). — *Kěmlākā*, j.; *Mělākā*, j.; *Kěmlaka*, j.; *Mělaka*, s. — Zeer vaste namen; aan de meeste inlanders bekend. — *Malakah*, md. in N. O. Běsoeki.

Hout onbruikbaar.

Phyllanthus spec. B. (Prosorus) — Inl. naam meestal geheel onbekend. Bij Tjěmara in Z. W. Bantěn : ? *Pantjal-kidang*, s. zeer locale naam. Elders andere boomsoorten aldus geheeten.

Hout zeer fijn; waarschijnlijk voor fijn schrijnwerk geschikt; niet in groote afmetingen.

299. FLUEGGEA WILLD.

Flueggea spec. — *Imër*, j. in Zuid-Banjoemas. — In Z. W. Bantën bij Tjemara *Sěmpěřēm*, s. — Determinatie onzeker.

Hout onbruikbaar.

300. GLOCHIDION FORST. (*Glochidionopsis*).

Glochidion spec. div. — *Marèhmèh*, s.; *Děmpoel*, j.; hierachter komen dan de soortsnamen; bijv. *Děmpoel-watoe* j.; *Děmpoel-lětět*, j. — De volgende, ten deele locale namen van *Glochidion*-soorten, werden nog door mij genoteerd: *Ki-parè* s.; *Lamèr*, j. in Banjoewangi en Z. W. Běsoeki; *Ki-hoe-oet*, s. bij Tòmò en Pangěntjongan in de Preanger; *Tjaboek*, j. in Banjoewangi; *Kalěmaeng*, md. in Z. W. Běsoeki; *Ki-kěrtas*, s. bij Tjibòdas (Hort. Bogor.) in de Preanger; *Rěmeme*, j. en *Tjěrmèn*, j. in Oost- en Zuid-Banjoemas; *Lěmpir*, j. op den G. Papdan in Madioen; *Kajoe-pari*, j. in Těgal op den G. Slamet. Enkele soorten soms *Woeroe*, j. geheeten.

Hout der grootere soorten voor pakkisten; der overige soorten onbruikbaar.

301. PUTRANJIVA WALL.

Putranjiva spec. — Op de weinige mij bekende vindplaatsen o.a. bij Karangasěm in Grobogan (Samarang) en bij Pantjoer in Běsoeki aan de inlanders bij name onbekend. — Soms door locale namen aangeduid; bijv. ? *Lawas*, j. bij Kědoengdjati in Samarang.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.

302. CYCLOSTEMON BL. (*Dodecastemon*).

Cyclostemon spec. — In Banjoewangi *Endòg-ěndògan*, j.; elders meestal *Xanthophyllum spec.* aldus genoemd. — Inl. namen in andere streken of geheel onbekend of lokaal en onbetrouwbaar; bijv. ? *Poerwākā*, j. bij Pringāmbā in Oost-Banjoemas; ? *Djirak-ěndog*, j.

Télawa in Soerâkĕrtâ. — In Z. W. Bantĕn geheel zonder inl. naam.

Hout voor pakkisten.

303. BISCHOFIA BL.

Bischofia spec. — *Gadòk*, s.; *Gintoengan*, j.; *Glintoengan*, j. md.; *Gĕntoengan*, j.; *Glintoeng*, j. — Zeer constante, aan de meeste inlanders bekende namen. — In Z. W. Bantĕn zoowel *Gadòk*, s. als *Gintoeng*, s. geheeten.

Hout duurzaam en sterk; voor huis- en bruggenbouw zeer geschikt. In zeer groote afmetingen te krijgen.

303. APOROSA BL. (*Leiocarpus*, *Tetractinostigma*.)

Hout van beide soorten voor pakkisten.

Aporosa spec. A. — *Peuris*, s. in Z. W. Bantĕn en in de Zuid-Preanger. — Elders o. a. in Midden-Java bij Karangasĕm in Samarang onbekend.

Aporosa spec. B. — Zonder inl. naam.

304. DAPHNIPHYLLUM BL.

Hout van beide soorten onbruikbaar

Daphniphyllum spec. 2. — Soms *Woeroe*, j. of *Hoeroe*, s. genoemd. Dikwijls aan de inlanders geheel onbekend. — Bij Tjibòdas (Hort. Bogoz.) in de Preanger ? *Ki-tédja-minjak*, s. geheeten. Deze naam zeer lokaal.

305. ANTIDESMA L.

Hout der grootere soorten voor pakkisten; der overige onbruikbaar.

Antidesma spec. div. — Een paar soorten heeten *Hoeni*, s. j.; *Boernĕh*, md. of *Woeni*, j.; hetzij zonder of met een tweeden naam er achter; bijv. *Woeni-laoet*,

j.; *Woeni-liris*, j. — Enkele soorten hebben zeer vaste namen, waarin één der 3 eerstgenoemde woorden ontbreekt; bijv.: *Ki-seueur*, s. bij Takòka in Preanger; *Ande-andean*, j. en *Ande-ande*, j. in Midde. Java (Pèkalòngan, Samarang, Tègal). — Sommige hebben zeer locale namen; bijv. ? *Kònjam*, j. en ? *Drědjěg*, j. bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas; *Kònjam-pasir*, j. in Tègal bij Margasari.

306. BACCAUREA LOUR. (*Pierardia*, *Adenocrepis*, *Hedycarpus*)

Baccaurea spec. div. — *Kěpoendoeng*, j.; *Poendoeng*, j.; *Kěmoen-doeng*, j.; *Měntěng*, s. in Bantěn; *Heutjip*, s. in de Z.-Preanger. — ? *Tjhirěk*, md. bij Simpòlan in Z. W. Běsoeki is misschien een andere soort. — De laatste naam zeer lokaal en daarbij onzeker. Soms tot *Woeroe*, j. gerekend. In West-Běsoeki *Kěmónthoeng*, md.

Hout der grootste soort (*Kepoendoeng* j.) voor pakkisten bruikbaar, doch om de eetbare vruchten zelden gekapt. Hout van de overige soorten onbruikbaar.

307. ELATAERIOSPERMUM BL.

Elataeriospermum spec. — *Tòkbraj*, s. in de Djampang (Preanger) een vaste naam, uitsluitend aan deze boomspecies gegeven. — In Z.-Preanger bij Palaboehan zonder inl. naam. — Ontbreekt waarschijnlijk in Midden- en Oost-Java.

Hout voor pakkisten. Zeldzame boom.

308. ALEURITES FORST.

Aleurites spec. — *Kěmiri*, j.; *Kěmèrěh*, *Miri*, j.; *Moentjang*, s.; — *Miri*, j. in soms Samarang. — De 4 eerste namen zeer vast. — *Kěmirèn*, j. worden sommige boomsoorten geheeten, die in blad aan *Aleurites* herinneren.

Hout voor pakkisten bruikbaar; en voor grof weinig duurzaam snijwerk gebezigd. Om de olie leverende zaden zelden gekapt.

309. **CROTON** LINN.

Croton spec. A. — *Djarak-brâmâ*, j. in Madioen op den G. Wilis bij Ngëbël een zeer vaste naam — Groeiplaats mij elders niet bekend.

Hout voor pakkisten. Doordat het sap van de schors en takken bij aanraking der oogen blindheid veroorzaakt, wordt deze boom zeer ongaarne door de inlanders gekapt: is daarbij nogal zelzaam.

Croton spec. B. — *Përkāsâ*, j. bij Karangasëm in Samarang (Grobogan); *Ki-djaj*, s. in Bantën en in de Djampangs (Preanger); ? *Tapèn-kěbo*, j. bij Tjilatjap in Z.-Banjoemas. — Al deze namen meer of minder lokaal. — In sommige streken aan de inlanders onbekend. — Bij Pantjoer in Běsoeki constant *Lěprak*, md. geheeten. — In Grobogan (Samarang) wordt *Barringtonia Vriesii* T & B aldus genoemd.

Hout voor pakkisten; om de lampolie leverende zaden zelden door de inlanders gekapt.

Croton spec. C. — *Tjheureuk*, md. bij Pantjoer (afd. Panaroe-kan) in Běsoeki. — Elders in Běsoeki en ook dáár heeten behalve deze soort (*C. laevifolium* BL.) ook *Curcas* L. en *Ricinus* L. evenzoo.

Hout onbruikbaar.

310. **OSTODES** BL.

Ostodes spec. — Inl. namen of onbekend of zeer lokaal; niet zelden echter lokaal nog van waarde. — *Kaliki-bantěn*, s. op den G. Galoenggoeng in de Preanger; ? *Kawòrò*, s. bij Tjibòdas (Preanger); *Kěmiri-sěpět*, j. of ? *Tjipir*, j. bij Pringāmbâ in Oost-Banjoemas.

Hout misschien voor pakkisten onbruikbaar.

311. **CLAOXYLON** JUSS.

Claoxylon spec. div. — *Blěkětoepoek*, j.; *Kětoepoek*, j.; *Běrkětoepoek*, j.; *Talingkoep*, s. — In Banjoewangi ? *Soeroe-ajam*, j.; in West-Běsoeki *Katěrphi*, md. — De beide laatste namen lokaal.

Hout van al deze soorten onbruikbaar.

312. ACALYPHA L.

Acalypha spec. — *Koejam*, j. of *Kojam*, j. in Oost- en Zuid-Banjoemas, Madioen, Pëkalongan en Tëgal. — In Banjoemas soms *Toetoep*, j. geheeten. Bij Karangasëm in Samarang: *Gëdrëg-idjo*, j. — Bij Pantjoer op het Raoeng-Idjën-gebergte in Bësoeki meestal *Tòtòp*, md., soms ? *Klangkòngan*, md. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger en in Bantën weinig bekende loeale namen: ? *Ki-tjamoen*, s. ? *Handjavar*, s.; en ? *Ki-rawaj*, s. — In Banjoewangi zonder inl. naam. — In Oost-Samarang bij Karangasëm heet *Pipturus spec. Gëdrëg*, j. of *Gëdrëg-poetih*, j.

Hout voor pakkisten; niet in groote afmetingen; doch soms in groote hoeveelheden te krijgen.

313. TREWIA L.

Trewia spec. — Inl. namen in Zuid-Preanger, Midden-Samarang en West-Bësoeki, en waarschijnlijk ook elders geheel onbekend of zeer onbetrouwbaar en loeaal. — Soms wel eens *Toetoep*, j.; *Tapèn*, j.; *Tòtòp* md. of *Mara*, s. genoemd.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen.

314. MALLOTUS (*Rottlera*; *Plagianthera*, *Melanolepis*.)

Mallotus spec. A. — *Tjalik-angin*, s. in Bantën en Preanger een nogal vaste naam. — Inl. namen in Midden- en Oost-Java weinig zeker en slechts aan enkelen bekend; op G. Wilis in Madioen *Toetoep*, j.; op G. Oengaran in Samarang *Toetoep* ? *Kantjil*, j.; bij Soerdjâ in Pëkalongan *Walikangin*, j.; bij Pringâmbâ in Oost-Banjoemas ? *Walang*, j.; bij Sëmpòlan in West-Bësoeki *Phalikangèn*, md. — Elders worden met deze namen nog andere boomsoorten aangeduid; vooral boomen met aan de onderzijde grijs of wit gekleurde en min of meer hartvormige bladeren.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. B. — Deze om zijne, in gedroogden toestand, welriekende bladeren aan de meeste inlanders welbe-

kende boom heet in geheel Midden- en Oost-Java constant: *Tapèn*, j. md. — Soms, doch zelden worden ook nog een paar andere *Euphorbiaceae* aldus genoemd. — Bij Sanggrawa in de Djampang (Preanger) ook *Tapèn*, s. geheeten. (*Mallotus floribundus* MUELL. ARG.)

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. C. — *Toetoe*p, j.; *Tòtòp*, md; beide namen meestal met een achtervoegsel; bijv. *Toetoe*p-*awoe*, j.; *Tòtòp*-*binèk*, md. — Dit achtervoegsel is echter weinig constant. — In Bantèn *Mara*, s. — (*Mallotus macrostachyus* MUELL. ARG.)

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. D. — Meestal als soort *C* genoemd; bij Poegér in Z. W. Bésœki onder den lokalen naam *Padang*. j. of *Pudjang*, j. bekend.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. E. — Inl. naam in Bantèn, bijna geheele Preanger en Banjoewangi geheel onbekend. — In Oost-Banjoemas met lokalen onbetrouwbaren naam ?*Katimoeroe*, j. aangeduid.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. F. — Inl. naam op de eenige mij bekende groeiplaats boven Simpar in Tégál op den G. Slamát constant *Sěroet*, j. — In de laagvlakte van Tégál en elders in Midden- en Oost-Java heet *Streblus spec.* constant *Sěroet*, j. waarop deze *Mallotus* door de bladeren bedriegelijk gelijk.

Hout voor pakkisten; in zeer groote afmetingen. Echter zeldzaam; bijna alleen in Tégál.

Mallotus spec. G. — Inl. naam op de eenige vindplaats bij Poegér in Z. W. Bésœki onbekend.

Hout onbruikbaar.

Mallotus spec. H. — Inl. namen talrijk en zeer lokaal, doch veelal toch bruikbaar. — Bij Tòmò in Soemédang *Ki-*

mèdng, s. en bij Palaboehan in Zuid-Preanger zonder inl. naam. — Bij Karangasëm in de afd. Grobogan zonder inl. naam; bij Kědoengdjati en Tjandj-roeboeh in Samarang veelal *Palan*, j. of *Plalan*, j.; soms ook zonder inl. naam, of met namen aangeduid die meestal voor andere boomsoorten gelden; bijv. *Parang-dewā*, j.; *Tapèn*, j.; *Pěndjalinan*, j. of ? *Apèn-apèn*, j. bij Soebah in Pěkalongan; — Bij Poegër in Z. W. Běsoeki veelal met andere boomsoorten verward; soms dáár *Kupasan*, j.; ? *Paskapasan*, j. of ? *Woeloeh*, j. of *Papasan*, j. geheeten. — In Banjoewangi inl. namen zeer onzeker: dáár o. a. de volgende namen genoteerd: ? *Waliklar*, j.; *Walikangin*, j.; ? *Woeloehan*, j. en ? *Tapèn*, j; niet zelden aan de inlanders geheel onbekend. — (*Mallotus Philippensis* MUELL. ARG.)

Hout voor geweerkolven bruikbaar gebleken volgens den Directeur der Geweermakers-school te Meester-Cornelis. Niet in groote afmetingen te krijgen. Door de inlanders nooit gebezigd.

Mallotus spec. I. — Inl. namen of geheel onbekend of zeer lokaal en onbetrouwbaar; bijv. ? *Ki-harěpang*, s. bij Takòka in de Djanpangs (Preanger); ? *Djirak-woelan*, j. bij Soebah in Pěkalongan; *Djirak-tjèlèng*, s. bij Karangasëm in Grobogan (Samarang). — Determinatie onzeker; misschien zijn onder deze letter I twee soorten door mij vereenigd. — (? *Mallotus acuminatus* MUELL. ARG.)

Hout onbruikbaar.

315. **MACARANGA** THOUARS (*Mappa*, *Pachystemon*).

Macaranga spec. A. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger: *Parěngpěng*, s.; bij Tjěmara in Z. W. Bantěn *Marěngpěng*, s.; deze beide namen constant. — In Oost-Banjoemas bij Pringambā: ? *Toetoep-rama*, j.; en bij Pandan-aroem op den G. Kapal: ? *Pasoengan*, j. — (*Macaranga javanica* MUELL. ARG.)

Hout onbruikbaar.

Macaranga spec. B. — In de Preanger meestal *Mara*, s. Soms

Mara-beureum, s.; *Mara-leutik*, s. of *Mara-leuweung*, s. — In Midden-Java meestal *Toetoep*, j.; soms *Toetoep-antjoer*, j. — (*Macaranga triloba* MUELL. ARG.)

Hout onbruikbaar.

Macaranga spec. C. — *Toetoep*, j.; *Tòtòp*, md.; *Mara*, s. — Het is vooral deze, en de volgende bijna even veelvuldig voorkomende *Macaranga*-soort, welke bedoeld wordt, wanneer van een dezer drie inl. namen sprake is. — Locaal heet vooral deze soort *Toetoep-antjoer*, j. (o. a. in Samarang en Pekalongan) en *Tòtòp-lakèh*, md. in West-Bésoeki. — Deze soort is aan bijna elk inlander onder een der drie vermelde namen bekend. — (*Macaranga Tanarius* MUELL. ARG.)

Macaranga spec. D. — Inl. namen als de voorgaande soort; evenwel niet zóó algemeen bekend; inzonderheid niet in Midden-Java. In Oost-Java bij Pantjoer (Bésoeki), waar deze soort zeldzaam is, is zij aan de meeste onbekend, doch wordt door enkelen ook tot *Tòtòp*, md. gerekend. — Bij deze soort wordt veelal achter de woorden *Toetoep*, j.; *Tòtòp*, md. of *Mara*, s. nog een tweede naam gevoegd om aan te duiden, dat deze soort van de voorgaande verschilt. — (*Macaranga denticulata* MUELL. ARG.)

316. CLEIDION BL.

Cleidion spec. — Bij Soebah in Pekalongan ? *Djirak-kèbo*, j.; bij Karangasëm in Grobogan (Samarang) ? *Djirak-djâwâ*, j.; bij Kědoengdjati (Samarang) zonder inl. naam. — Bij Poegër in Z. W. Bésoeki ? *Tjakarajam*, j.; bij Rāgadjāmpi in Banjoewangi ? *Brasan*, j. — Al deze namen alleen lokaal van cenige waarde; aangezien zij onzeker en slechts aan enkele inlanders bekend zijn.

Hout onbruikbaar.

317. CHEILOSA BL.

Cheilosa spec. — Inl. naam bij Pringāmbā in Oost-Banjoemas, bij Palaboehan (Preanger) op den G. Poelasari in Bantën en

bij Ngëbël in Madioen aan de inlanders geheel onbekend. — Bij Pantjoer op het Raoen-Idjèn-gebergte in Běsoeki constant *Kòlèk-lapheung* md. geheeten en dáár aan de meeste inlanders bekend. De laatste naam lokaal zeer bruikbaar. — Determinatie door het ontbreken der mannelijke bloemen onzeker.

Hout onbruikbaar.

318. GELONIUM ROXB.

Hout van beide soorten onbruikbaar.

Gelonium spec. A. — *Ki-djéroek-laoet*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — Zeer locale en onzekere naam. — Zeldzame boom.

Gelonium spec. B. — *Bòtòran*, j. op den G. Kapal in Oost-Banjoemas. Locale onzekere naam. Zeldzame boom.

319. HOMALANTHUS A. JUSS. (*Carumbium*).

Homalanthus spec. A. — In geheel West- en Midden-Java zeer algemeen en dáár constant, met uitsluiting van alle andere boomsoorten *Krěmbi*, s. j. of *Kareumbi*, s. genoemd. — In Oost-Java in Běsoeki o. a. bij Pantjoer zeldzaam en slechts aan weinige inlanders goed bij name bekend. Dáár in Běsoeki meestal *Tòtòp*, md.; *Toetoeb*, j. of *Toetoep*, j. geheeten. — Bij Pantjoer (Běsoeki) soms *Tòtòp-lapheung*, md.; ook *Djarak-pati*, j.

Hout voor pakkisten misschien bruikbaar.

Homalanthus spec. B. — In Madioen bij Ngëbël zonder inl. naam of soms ? *Toetoep*, j. geheeten; bij Pantjoer in Běsoeki ? *Tòtòp-pòtèh*, md. of *Tòtòp-lapheung*, md. en op het Idjèn-plateau (Běsoeki): *Djarak-pati-gěde* j.

Hout onbruikbaar.

320. SAPIUM R. BROWN.

Sapium spec. — In Bantën en de Preanger constant *Dawòlang*,

s. geheeten; en dáár aan de meeste inlanders goed bekend. — In Midden-Java weinig, en bijna alleen onder zeer locale namen bekend; bijv. *Děrwâlâ*, j. bij Soebah in Pěkalongan; ? *Sembirit*, j. en *Rawan*, j. bij Kědoengdjati en ? *Arěng-arěngan*, j. bij Karangasěm in Grobogan (Samarang). — In Těgal constant *Dawolang*, j.

Hout voor pakkisten. Niet in groote afmetingen.

321. EXOECARIA L.

Exoecaria spec. — *Měňengan*, j. bij Poegěr in Z. W. Běsocki en in Banjoewangi een vaste, algemeen bekende uitsluitend aan deze soort gegeven inl. naam. — Namen in Midden- en Oost-Java veelal zeer lokaal: *Gětah*, j. bij Tjilatjap (Zuid-Banjoemas); ? *Bětah*, j. of ? *Bětahan*, j. in Noord-Pekalongan; ? *Bintaos-laoet*, s. bij Bale-kambang in de Djampangs (Preanger); *Boeta-boeta*, ml. of *Kajoe-boeta-boeta*, ml. in sommige groote kustplaatsen. — Bij Soemběrwaroe in N. O. Běsoeki *Malěngan*, md.

Het kernhout dient soms als wierookhout. Het sap veroorzaakt, wanneer het in de oogen geraakt, blindheid en de boom wordt daarom ongaarne gekapt. — Niet in groote afmetingen.

322. SAUROPUS.

Sauropus spec. — *Iměr*, j. bij Ngěběl in Madioen. — Zelden een kleine boom; meestal een heester. — Determinatie nog onzeker.

Hout onbruikbaar.

Behalve de hierboven opgesomde species bevinden zich nog in mijne herbarium een 10-tal soorten, welke hoogst waarschijnlijk tot de *Euphorbiaceae* behooren, doch waarvan door de onvolledigheid van het herbarium het geslacht door mij nog niet bepaald kon worden. De meeste dier soorten hebben geen inl. namen. Slechts bij de volgende was dit wel het geval *Ēndōg-Ēndōgan*, j. bij Tjilatjap (Banjoemas) en *Heutjip*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. De laatste naam beantwoordt misschien aan *Adenocrepis* (= *Beccaurea*).

323. Cultuurboomen:

PHYLLANTHUS L.

Phyllanthus spec. — *Tjěrmè*, j. ml.; *Tjěrmè*, s.

Hout onbruikbaar.

BACCAUREA LOUR.

Baccaurea spec. — *Kěpoendjoeng*, j.; *Kapoendoeng*, s.; *Kěpoendoeng*, ml.; *Mèntèng*, s.

Hout voor pakkisten. Om de eetbare vruchten zelden gekapt.

ANTIDESMA L.

Antidesma spec. — *Woeni*, j. ml. s.; *Hoeni*, s.; *Boernèh*, md.

Hout voor pakkisten. Om de eetbare vruchten zelden gekapt.

HEVEA AUBL.

Hevea spec. — Zonder inl. naam.

Hout voor pakkisten? bruikbaar. Om het caoutchouc leverende sap zelden gekapt. Daarbij nog zeer weinig geplant.

JATROPHA L. (*Curcas*)

Jatropha spec. — *Djarak*, j. ml.; *Djarak-pagër*, j. *Djarak-tjina*, ml. j. — De inlandsche namen van deze soort veelal verwisseld met die van den *Wonderolie-boom* (*Ricinus*).

Hout onbruikbaar.

CROTON L.

Croton spec. — *Ki-malakian*, s. in de Zuid-Preanger. Van deze soort komt de bekende *Croton-olie*. — Misschien is deze soort dezelfde als boven *Croton spec.* C. genoemd werd.

Hout onbruikbaar; om de vruchten, die als vischvergift zeer gezocht zijn, zelden gekapt.

CODIAEUM RUMPH.

Codiaeum spec. — *Kroton*, hollandsch, ml.; — *Poering*, j. in Banjoewangi. Meestal een heester.

Hout onbruikbaar.

MANIHOT ADANS.

Manihot spec. — Op Java door de Europeanen *Caoutchouc-Manihot*, genoemd. — De *Cassave-Manihot* blijft op Java heesterachtig en is daarom hier niet opgenomen.

Hout onbruikbaar. Om het caoutchouc leverende sap zelden gekapt.

RICINUS L.

Ricinus spec. — *Djarak*, j. ml.; *Wonderolieboom* of *Ricinus-olieboom*. — Van deze soort wordt de *Castor*- of *Ricinus*-olie verkregen (vergelijk boven onder *Jatropha*).

Hout onbruikbaar.

HURA L.

Hura spec. — *Boeta-boeta*, ml. in Batavia.

Hout voor pakkisten wellicht bruikbaar. Aangezien het sap in de oogen geraakt blindheid veroorzaakt, wordt deze boom ongaarne gekapt. — Zeldzaam geplant.

EUPHORBIA L.

Euphorbia spec. — *Tikël-baloeng*, j.; *Kajoe-oerip*, j.; *Thélisòh*, md.

Hout onbruikbaar.

324* URTICACEAE.

324. CELTIS L. (*Solenostigma*).

Celtis spec. A. — *Ki-tamiang*, s. in bijna de geheele Preanger constant. Bij Pangèntjongan op den G. Galoenggoeng soms *Ki-djeunghil*, s. — Bij Tjibòdas (Hort. Bogor.) op den G. Gède wordt beweerd, dat deze soort een soort van *Kajoe-tai*, s. zou opleveren; dit komt mij zeer twijfelachtig voor. Het echte *Kajoe-tai*, ml. (*Stinkhout*) is door mij in Atjeh op Poeloe Bras gevonden en is wel van *Celtis* afkomstig, doch niet van een op Java wild-

groeijende species. — Inl. namen in Oost-Java constant: *Télitig*, j. op den G. Wilis in Madioen en *Taritig*, j.; *Tarètèg*, md. in Běsoeki (o. a. bij Pantjoer en Sěmpòlan). — In Midden-Java o. a. op den G. Oengaran aan de meeste inlanders bij name onbekend of door locale onzekere namen aangeduid.

Hout voor pakkisten. Soms in zeer groote afmetingen en in groote hoeveelheden.

Celtis spec. B. — Inl. namen zoowel in West- als in Midden- en Oost-Java of geheel onbekend of zeer lokaal en onbetrouwbaar. — Vaak met andere boomsoorten verward.

Hout misschien voor pakkisten bruikbaar; niet in groote afmetingen.

325. TREMA BL. (*Sponia*).

Trema spec. 2 — 3. — *Anggroeng*, j.; *Angkhroeng*, md.; *Koeraj*, s. — Vaste namen. — Bij uitzondering een dezer namen ook aan de volgende soort, doch aan geen andere boomsoorten gegeven.

Hout der (beide) grootste soorten voor pakkisten geschikt; der kleine soort onbruikbaar.

326. PARASPONIA BL.

Parasponia spec. — *Anggring*, j. in Midden-Java. — Soms ook ? *Anggroeng*, j. geheeten.

Hout onbruikbaar.

327. GIRONNIERA GAUDICH. (*Galumpita*).

Gironniera spec. A. — In Zuid-Preanger en Bantěn constant *Ki-boeloe*, s. — In Midden- en Oost-Java door mij nog niet gevonden.

Hout bruikbaar voor pakkisten.

Gironniera spec. B. — In Z. W. Běsoeki bij Poegěr en in Banjoewangi *Woeloeh*, j.; *Woelòh*, j. of *Sòlò*, j.; in Pěkalongan bij Soebah meestal *Woelòh*, j.; *Woeloeh*, j. of *Woeloehan*, j. — Met den naam *Woelòh*, j. wordt

in Samarang bij Kědoeng-djati dikwijls *Parinarium scabrum* HASSK. aangeduid, deze gelijkt in blad veel op deze *Gironniera*-soort.

Hout misschien bruikbaar voor huisbouw. Voor pak-kisten geschikt.

328. *STREBLUS* LOUR.

Streblus spec. — *Sěroet*, j. — In de laagvlakte van geheel Midden- en Oost-Java een zeer vaste, aan de meeste inlanders bekende naam. — Op één standplaats echter, n. l. in de bergstreken van Těgal wordt een *Mallotus*, welke in blad bedriegelijk op deze *Streblus* gelijkt, ook *Sěroet*, j. genoemd. — In West-Běsoeki constant *Pěllěh*, md.

Hout onbruikbaar.

329. *FICUS* L. (*Covellia*; *Urostigma*; *Synoecia*; *Pogonotrophe*).

Het aantal wildgroeende vijgenboomen bedraagt op Java volgens mijne schatting een 60—70-tal. Bijna al die soorten hebben inlandsche namen.

Sommige dier inl. namen beantwoorden uitsluitend aan één enkele species, andere namen hebben op een groep van op elkaar gelijkende soorten betrekking. Het laatste is het geval met de meeste, echter niet met alle soorten van het ondergeslacht *Urostigma* KING.

In het onderstaande overzicht zal tot beter verstand van den omvang der inl. namen de rangschikking der soorten zooveel mogelijk naar die namen zelf plaats hebben. Soorten die door de inlanders veelvuldig met elkander verward en dikwijls met slechts één naam aangeduid worden, zullen daarom hier tot één groep gebracht worden,

Door het voortgezet onderzoek der javaansche bosschen komt het mij waarschijnlijk voor, dat de in de literatuur vermelde, en ook in het Natuurk. Tijdschr. v. N. I. l. c. genoemde geslachten *Pseudostreblus* BURM.; *Taxotrophis* BL., *Phyllochlyamys* BURM.; *Sloetia* T. et B., *Pouzolzia* GAUD.; en *Boehmeria* JACQ. op Java of in het geheel niet of niet door wildgroeende boomachtige soorten vertegenwoordigd zijn.

Door KING (G.) worden in zijn *Species of Ficus* ongeveer 55 boomvormige inheemsche soorten reeds voor Java vermeld.

bijv. *Boeloeh*, j.; *Kiara*, j.; *Djëraka*, j.; terwijl sommige soorten als *Gòndang*, j.; *Lòh*, j.; *Rèmplas*, j. enz., welke door de inlanders slechts zelden met andere species verward worden, hier afzonderlijk behandeld zullen worden.

Ficus spec. A. — *Lòh*, j.; *Lo*, j.; *Arak*, md.; *Elo*, j.; *Lòwa*, s.
— Inl. naam aan bijna alle inlanders bekend en uitsluitend voor deze species gebezigd.

Hout voor pakkisten. Rechte stammen echter zeer zeldzaam. Om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Ficus spec. B. — *Gòndang*, j. s.; *Khoentheueng*, md; *Kòndang*, s.; *Goendang*, j. s.; *Koendang*, s. — In enkele streken worden nog een paar variëteiten (of ? soorten) onderscheiden *Gòndang-idjo*, j.; *Gòndang-poetih*, j. en *Kòndang-lèlès*, s. De laatste soms alleen *Lèlès*, s. genoemd. — De eerstgenoemde 5 namen zijn zeer algemeen bekend en gelden bijna altijd voor ééne soort. — Door de eetbare vruchten en de nit het melksap verkregen was (*Lilin-gondang*, s. j.) is deze *Groote was-vijgeboom* aan de meeste inlanders goed bekend. Bij Tjilatjap worden 3 variëteiten onderscheiden; *Gòndang-tjarat* j.; *Gòndang-idjo*, en *Gòndang-kasèh*, j.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen en in groote hoeveelheden. Om de eetbare vruchten en het was opleverende melksap in enkele streken ongaarne gekapt.

Ficus spec. C. — *Ki-tjiat*, s.; *Avar-avar*, j. — Vaste aan de meeste inlanders bekende namen. Geen andere soorten aldus genoemd. — In de Zuid-Preanger heet een *Nuclea*-soort *Ki-tjaät*, s. — In N. O. Běsoeki *Lambileung*, md. of *Kalang-bibang*, md.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. D. — *Walèn*, s. in geheel West-Java een aan de meeste inlanders bekende en uitsluitend aan deze soort, gegeven naam. — In Oost- en Midden-Java of alleen onder locale onzekere namen of geheel onbekend. — Bij Simpar in Těgal *Kòpèng*, j.; bij Ngěběl in Madioen onbekend; op

den G. Oengaran *Ampĕlas-bawang*, j.; bij Pantjoer in Běsoeki *Ampĕrĕ*, md. De drie laatste namen gelden ook voor andere boomsoorten. — Bij Buitenzorg soms *Gambir-oetan*, ml. geheeten. Deze naam echter ook aan eenige andere plantensoorten gegeven.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. E. — *Rĕmplas*, j.; in Midden- en Oost-Java zoo goed als uitsluitend aan deze soort gegeven naam. — *Ampĕlas*, s. md. meestal en indien zonder tweeden naam er achter, bijna uitsluitend voor deze bekende soort gebezigd. — Soms „*Schuurbladeren*” genoemd om de op Java voor polijsten en schuren gebruikte bladeren.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. F. — *Gambiran*, j. bij Tjandiroeboeh in Samarang; een locale, doch vaste naam voor deze soort, die in de Preanger bij Palaboehan *Kiara-gambir*, s. heet. — In sommige streken van Midden-Java tot *Boeloe*, j. gerekend.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. G. — *Lĕsĕs*, j. in Madioen bij Ngĕbĕl, bij Pare in Kĕdiri en in Banjoewangi bij Rĕgĕdjampi *Lĕtjĕs*, j. — Beide vaste, doch locale namen. Nogal zeldzame boom.

Hout voor pakkisten. In reusachtige afmetingen.

Ficus spec. H. — *Loewing*, j.; *Bisòrò*, s. — Beide zeer vaste, aan de meeste inlanders bekende, uitsluitend aan deze soort gegeven namen. — Bij Soembĕrwaroe in N. O. Běsoeki *Kròngròng*, md.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. I. — *Wilĕdĕ*, j.; *Lĕdĕ*, j.; *Beunjing*, s. — *Sĕmpòl*, md. of *Simpòl*, md. bij Pantjoer in West-Běsoeki. — De drie eerste namen zeer vast en aan de meeste inlanders bekend. Zelden met andere boomsoorten verward.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. J. — *Karèt*, s. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger en in Zuid-Bantèn. — Zeer vaste naam.

De boom bijna nooit gekapt om het gomelastiek leverende melksap.

Ficus spec. K. — *Ilāt-ilāt*, j.; *Lat-ilatan*, j.; *Ilāt-ilatan*, j.; vaste, doch met uitzondering van Banjoewangi, slechts aan weinige inlanders bekende namen. — *Tjhileu-kērphoej*, md. in West-Běsoeki. — *Pangsòr*, s. bij Sanggrawa en Palaboehan in de Preanger. — Deze soort soms met andere boomsoorten verward; soms tot ? *Woeroe*, j. of ? *Boeloe*, j. gerekend.

Hout voor pakkisten. In zeer groote afmetingen.

Ficus spec. L. — *Sampejan*, j. in Banjoewangi bij Râgâdjampi; locale, doch zeer vaste naam. — Andere groeiplaats mij niet bekend.

Hout zeer geschikt voor pakkisten.

Ficus spec. M. — *Ki-kònèng*, s. bij Pangèntjongan op den G. Galoenggoeng en *Ki-kantèh*, s. bij Takòka in de Djampang (Preanger). — Bij Pringâmbâ in Banjoemas *Tjèling*, j. — Bij Ngèbèl in Madioen en bij Pantjoer in Běsoeki aan de inlanders bij name geheel onbekend. — Bij Palaboehan in Zuid-Preanger ? *Kěrtaoe*, s. — Van alle andere javaansche *Ficus*-soorten is deze soort dadelijk te herkennen aan het zeer *bittersmakende*, *citroengele* melksap.

Hout voor pakkisten. Nogal zeldzame boom.

Ficus spec. N. — *Waringin*, j. ml. *Wringin*, j.; *Ringin*, j.; *Bringèn*, md.; *Tjaringin*, s. — Enkele malen geldt een dezer namen ook voor een paar naverwante species.

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. O. — *Hamèrang*, s. of *Hambèrang*, s.; — Bij Pringâmbâ in Banjoemas *Kěběk-poetih*, j. — Een naverwante *Ficus* heet in Banjoemas *Kěběk*, j. — Indien achter den naam *Hamèrang*, s. geen tweede naam staat, geldt deze bijna altijd alleen voor deze soort, welke door mij niet

oostwaarts van Samarang is waargenomen. Door de uit het sap gemaakte was (*Lilin-hamèrang*, s.) is deze *Kleine was-vijgeboom*, aan de meeste inlanders goed bekend (*Ficus fulva* REINWT.)

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. P. — *Hamèrang-minjak*, s. of *Hamèrang-leutik*, s.; in de Preanger. Door sommige inlanders veelal ook alleen *Hambèrang*, s. genoemd. In Z. W. Bantën bij Tjëmara *Ki-sohang*, s. of ? *Koejang*, s.; bij Palaboehan in Z. Preanger *Seuhang*, s. — De laatste 3 namen lokaal; de drie eerste algemeen in gebruik in bijna de geheele Preanger. — In Midden-Java *Kěběk*, j. of *Kěbak*, j. echter in Tégál *Kěběk-bèrang*, j. of ? *Bèrang*, j. — Beide laatste namen lokaal, de twee vóórlaatste algemeen in gebruik. — In Běsoeki bij Pantjoer *Kalòng*, md.; elders heet een *Sterculia* aldus. In Oost-Java weinig bekend. (*Ficus alba* REINWT.)

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. Q. — Inl. namen als de voorgaande soort *Ficus spec. P.* — Deze soort is in Oost-Java zeer weinig bekend. — (*Ficus hirta* REINWT.)

Hout onbruikbaar.

Ficus spec. div. — Een groot aantal *Ficus*-soorten van het ondergeslacht *Urostigma* KING worden door de Soendanceezen tot het inl. „geslacht” *Kiara*, s. gebracht en de onderscheidene soorten door het daarachter plaatsen van een tweeden naam aangeduid; bijv. *Kiara-gěde*, s.; *Kiara-djingkang*, s.; *Kiara-běas*, s.; *Kiara-boenoet*, s.; *Kiara-rambaj*, s.; *Kiara-tapòk*, s. enz. — Aan dit ondergeslacht *Kiara*, s. beantwoorden min of meer de javaansche namen *Boeloe*, j.; *Amboeloe*, j.; *Djěraka*, j.; *Gědat*, j.; *Běrgědat*, j. (in Samarang); *Brěkat*, j.; *Kowang*, j.; *Woenoet*, j.; *Sěprěh*, j.; *Prěh*, j.; *Iprěh*, j.; *Ipe*, j.; *Panggang*, s.; *Krasak*, j. md.; *Amphoeloe*, md. -- Door het achtervoegen van een tweeden naam worden ook hier de soorten onderscheiden. Doch evenals in West-Java, worden ook in Oost- en Midden-Java sommige soorten herhaaldelijk door de in-

landers met elkander verwisseld en heeft daarom dikwijls alleen de eerste naam waarde.

De volgende namen werden nog door mij van *Ficus*-soorten genoteerd: Bij Kědoengdjati in Samarang: *Oejah-oejahan*, j. en *Bibis*, j.; de laatste naam wordt soms ook aan een *Diospyros* gegeven. — In de Preanger: bij Palaboehan: *Pè-èr*, s. en *Drandang*, s.; bij Pangèntjòngan *Pèrèng*, s.; bij Sanggrawa *Kòpèng*, s. — In Bantèn aan het Danoe-„meer” *Djawaj*, of *Ki-djadjawaj*, s. — In Běsoeki bij Sěmpolan *Anjang*, md. en *Langpangkheung*, md. — In Madioen bij Slahoeng (Pānārāgā) heet ééne *Ficus*-soort constant *Apah-apah*, j. (niet *Apā-āpā*, j.), terwijl *Adā-āpā*, j. in Samarang en Djapāra de naam is van een kleine heester uit de familie der *Leguminosae*.

Niet zelden worden twee der bovengenoemde namen verenigd; bijv. *Lòh-gondang*, j. (Banjoewangi); *Kiara-kòwang*, s. (Bantèn) *Brěkat-ipèh*, j. (Djapāra).

Van geen enkele der onder *Ficus spec. div.* genoemde soorten is het hout voldoende duurzaam om voor huisbouw of meubels te kunnen dienen. Van sommige is het hout misschien voor pakkisten te gebruiken.

330. ANTIARIS LESCHEN.

Antiaris spec. A. — *Antjar*, j. in Z. W. Běsoeki en Banjoewangi.
— *De giftboom van Oost-Java.*

Hout voor pakkisten bruikbaar. Sap zeer gevreesd en daarom bijna nooit gekapt. Daarbij zeer zeldzaam.

Antiaris spec. B. — *Antjar*, j. in Samarang en Banjoewangi.
Deze soort is niet giftig.

Hout voor pakkisten.

Antiaris spec. C. — ? *Boeloe-baloeng*, j. bij Tjandj-rocboeh in Samarang. Onzekere zeer locale naam. Deze soort is niet giftig.

Hout als soort B.

331. CUDRANIA TRÉCUL.

Cudrania spec. — *Těgěrang*, j. in Běsoeki. — Zeer vaste uit-

sluitend aan deze soort gegeven naam. Meer klimmende heester dan boom.

Hout in de inlandsche ververij veel gebezigd. Alleen in kleine afmetingen. In veel streken de volwassen planten uitgeroeid.

332. ARTOCARPUS FORST.

Artocarpus spec. A. — *Teureup*, s.; *Treup*, s.; *Těřep*, s.; *Běṇḍā*, j.; *Kòkap*, md. — Alle zeer vaste, aan de meeste inlanders bekende, uitsluitend aan deze soort gegeven namen. — In Banjoewangi worden soms 2 variëteiten onderscheiden: *Běṇḍā-wingkâ*, j. en *Běṇḍā-loeloep*, j.

Hout bruikbaar voor huisbouw; maar niet bijzonder duurzaam; uitmuntend voor pakkisten. In zeer groote afmetingen.

Artocarpus spec. B. — *Kěrtaoe*, s. of *Kértò*, s. bij Takòka in de Djampang (Preanger). — Zeer zeldzame boom.

Hout voor ? huisbouw. Zeldzame boom.

Artocarpus spec. C. — *Tiwoe-landak*, s. bij Tjēmara in Zuid-west Bantēn. Locale, vaste naam voor deze zeer zeldzame soort.

Hout voor huisbouw. Zeldzame boom.

Artocarpus spec. D. — Zonder vaste inl. naam bij Poegër en Běsoeki. Zeer zeldzame boom.

Hout voor huisbouw op Sumatra; op Java zeer zelden gebruikt.

Artocarpus spec. F. — *Sěmbir*, j. bij Pringāmbā in Oost-Banjoemas; onzekere zeer locale naam van deze zeer zeldzame soort (misschien dezelfde als soort D.)

Hout misschien voor huisbouw bruikbaar.

Artocarpus spec. E. — *Nangka*, s.; *Nangkah*, md.; *Nangka-leuweung*, s.; *Nāṅkâ*, j.

Hout duurzaam; voor huisbouw uitmuntend; voor meubels bruikbaar. Om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Artocarpus spec. G. — *Boeloe-angkā*, j. in Banjoewangi bij Litjin.
— Vaste locale naam.

Hout misschien voor huisbouw bruikbaar. Zeer zeldzame boom.

Artocarpus spec. H. — *Poesar*, s. of *Peusar*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. Locaal vaste naam.

Hout voor pakkisten.

Artocarpus spec. I. — *Poeroet*, s. j. bij Palaboehan in Zuid-Preanger, bij Tjilatjap in Zuid-Banjoemas en bij Tjëmara in Z. W. Bantën.

Hout voor pakkisten.

333. LAPORTEA GAUDICH.

Laportea spec. div. — *Brandnetelboom*; *Poeloes*, s.; *Kēmadoe*, j.; *Kēmathoeh*, md.; *Latěng*, j. — Ter aanduiding der soorten wordt dan daarachter nog een andere naam gevoegd. Deze tweede naam is veelal lokaal. In enkele streken wordt één der *Laportea*-soorten met een afzonderlijken naam aangeduid, waarin de eerstgenoemde 3 „geslachts”-namen ontbreken.

Hout van soort A bruikbaar voor pakkisten; der overige soorten onbruikbaar. Deze boomen worden ongaarne gekapt, doordat de bladeren even erg als of nog erger dan brandnetels branden.

Laportea spec. A. — *Pěngā*, j. bij Ngěbël op den G. Wilis in Madioen. — *Djingkat*, j. bij Pare in Kědiri; — In Banjoewangi *Latěng-kěbo*, j.; bij Sěmpòlan in Běsoeki soms alleen *Kēmathoe*, md. soms *Kēmathoe-kěrboej*, md. — In West-Java door mij niet gevonden. — In Těgal zeer zeldzaam; dáár weinig bekend aan de inlanders en om de gelijkenis der bladeren met *Tetrameles spec.* soms *Winong*, j. genoemd. — (*Laportea peltata* GAUD).

Laportea spec. B. — In Midden-Java meestal *Kēmadoe-kěrbo*, j. of *Kēmadoe-maisā*, j. — In Těgal, Banjoemas bij Prin-

gãmbã *Broenja*, j. of *Kěmadoe-broenja*, j. — In Tégál *Kěmadoe-kěbo*, j. of *Kěmadoe-broenja*, j. — In Běsoeki bij Sěmpòlan *Kěmathoe-kěrbœj*, md. of alleen *Kěmathoe*, md. — (*Laportea amplissima* MIQ.).

Laportea spec. C. — *Kěmadoe*, j. in Samarang, Pěkalongan en Tégál. — Bij Kědoengdjati in Samarang *Kěmadoe-kěbo*, j.

Laportea spec. D. — Door mij alleen in Běsoeki gevonden. Dáár bij Sěmpòlan constant *Kěmadoe-kědang*, md.; bij Rãgãdjampi in Banjoewangi *Latěug-sapi*, j. of *Latěng-goenoeng*, j. bij Poegër in Z. W. Běsoeki *Latěug*, j. of *Latěng-kidang*, j. — (*Laportea stimulaus* MIQ.).

Laportea spec. E. — Bij Sěmpòlan in Z. W. Běsoeki *Kěmathoeh*, md. of *Kěmathoeh-kětheung*, md. — In Banjoemas bij Pringãmbã *Kěmadoe*, j. — (*Laportea costata* MIQ.).

Laportea spec. F. — *Poeloes*, s. vaste naam in geheel Bantěn en de Preanger. — Bij Palaboehan en Tjibòdas (Hort. Bogor.) *Poeloes-djlatrang*, s. — In Midden-Java *Kěmadoe*, j.; *Kěmadoe-sapi*, j.; *Kěmadoe-kidang*, j. of *Madoe*, j. — Bij Sěmpòlan in Z. W. Běsoeki *Kěmadoe-kòdòk*, md. (?) j. — (*Laportea oblougata* MIQ.).

334. PIPTURUS WEDD.

Pipturus spec. A. — *Ki-tjamoen*, s. bij Palaboehan in Zuid-Preanger. — *Lawe*, j. in Banjoewangi. — *Wèlawèau*, md. bij Sěmpòlan in Z. W. Běsoeki. — In Samarang bij Kědoengdjati ? *Trěmběsi*, j. — Bij Karangasěm in Grobagan *Gědrěg*, j. — In Madioen bij Ngěběl *Toetoep-wěsi*, j. — In Tégál tot *Toetoep*, j. gerekend om de groote gelijkenis der bladeren op de echte *Toetoep*, j.-soorten.

Hout onbruikbaar.

Pipturus spec. B. — *Ki-beunteur*, s. in Oendjoeng-koelòn in Z. W. Bantén. Zeer zeldzame boomheester. Naam alleen lokaal van waarde. (Zie verder *Leucosyke*). — Determinatie onzeker.

Hout onbruikbaar.

335. VILLEBRUNEA GAUD.

Villebrunea spec. — *Nangsi*, s.; *Djoerang*, j. in West- en Midden-Java. — Vaste algemeen bekende namen. — Bij Pantjoer in Běsoeki *Pělangkògan*, md.; locale naam. — Bij Sempòlan in Z. W. Běsoeki; *Markalěmaran*, md. Eveneens locale naam. — Niet zelden, vooral in de lagere streken, inlandsche naam onbekend.

Hout onbruikbaar.

336. MAOUTIA WEDD.

Maoutia spec. — In Midden-Java meestal *Walik-angin*, j. (evenals eenige andere boomsoorten). — Op sommige plaatsen dáár echter onder locale namen bekend: *Prèngpèng*, j. in Oost-Banjoemas en Zuid-Pěkalongan; *Kěběntěr*, j. bij Simpar in Těgal. — *Ki-beunteur*, s. in de Preanger; evenals *Leucosyke spec.*

Hout onbruikbaar.

337. DEBREGEASIA GAUD.

Debregeasia spec. — *Ki-tòngòh*, s. in de Preanger bij Pangèntjògan. — *Tòngòh*, j. in Těgal op den G. Slammat. — In Madioen bij Ngěběl ? *Mentjoegan*, j. — Bij Pantjoer op het Raoeng-Idjèn geb. in Běsoeki *Těntjògan*, md. — Al deze namen zijn weinig bekend en lokaal. — In Midden-Java soms ? *Oerang-oerangan*, j. Aldus echter ook andere boomsoorten soms genoemd.

Hout onbruikbaar.

338. LEUCOSYKE Z. et M.

Leucosyke spec. 2. — *Ki-beunteur*, s. in de Preanger; bij Palaboehan echter ? *Ki-paraj*, s. De eerste naam nogal

constant en algemeen, de laatste onzeker en weinig bekend. — Bij Nēgbēl in Madioen *Walikangin*, j. — Bij Tjilatjap in Banjoemas: *Prèngpèng*, j. — Bij Pring-āmbā in Banjoemas *Mlantjogan*, j. — Bij Soerdjā in Pēkalongan *Parèngpèng-kēbo*, j.

Hout van beide soorten onbruikbaar.

338* Cultuurboomen:

Artocarpus spec. A. — *Kloewih*, j. en *Soekoen*, j. De laatste is een variëteit van de eerste zonder zaden. — In West-Bēsoeki heet *Kloewih*, j. steeds *Kōlōr*, md. — In de Preanger heet *Kloewih*, j. steeds *Kaleuwih*, s. of *Timboel*, terwijl *Soekoen*, j. dáár eveneens *Soekoen*, s. genoemd wordt. — (*Artocarpus incisa* LINN. F.)

Hout voor pakkisten; om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Artocarpus spec. B. — Verschillende variëteiten, bijv. *Nangka*, s. en *Nangka-boeboer*, s.; *Nangka*, j. en *Nāngkā-tjèlèng*, j.; *Nāngkā-boeboer*, j. — In Z. W. Bantēn: *Nangka-salak*, s.; *Nangka-boeboer*, s. en *Nangka-tjangkoewang*, s. — (*Artocarpus integrifolia* L.)

Hout als *Artocarpus spec. E.*

Artocarpus spec. C. — *Tjěmpědak*, s. ml. Uitsluitend in West-Java. (*Artocarpus polyphema* PERS.)

Hout voor pakkisten; om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Morus spec. — *Babasaran*, j. ml. s. — Javaansche *Moerbei-boom*.

Hout onbruikbaar; om de eetbare vruchten zelden gekapt.

Broussonetia spec. — In Madioen bij Pānārāgā: *Kajoe-gloegoe*, j. Locale vaste naam. — Elders heet de stam van sommige palmsoorten *Gloegoe*, j.

Hout onbruikbaar. Om de schors, welke bij Pānārāgā in Madioen tot fabricatie van »javaansch» papier dient, zelden gekapt. Alleen in Madioen veel aangeplant.

339* JUGLANDACEAE.

339. ENGELHARDTIA L.

Hout van al deze soorten voor pakkisten. Soms in groote afmetingen en groote hoeveelheden te krijgen.

Engelhardtia spec. div. — *Ki-hoedjan*, s.; *Ki-kěpěr*, s.; beide in de Preanger nogal algemeen bekende en nogal vaste namen. Soms met locale namen bijv. bij Tjibòdas op den G. Gěde *Ki-soerèn*, s. — ; met andere woorden gelijkend op *Soerèn*, s. (*Cedrela spec.*) — In Midden-Java meestal met een der volgende namen aangeduid: *Mārāsāwā*, j. in Madioen bij Ngěbėl. — *Klimāsāwā*, j. of *Mēsāwā*, j. in Oost-Banjoemas. — *Mēsāwā*, j. in Madioen, Banjoemas en Zuid-Pěkalongan. — *Sāwā*, j. op den Dièng in Bagalèn. — *Gringging*, j. in Těgal op den G. Slamāt. — In Běsoeki aan de inlanders meestal bij name onbekend; soms met localen, aan weinigen bekenden naam *Kalipāpā*, j. op het Idjèn-plateau. — In Samarang op den G. Oengaran: *Woeroe-sāwā*, j. — De bovenstaande namen beantwoorden in Oosten Midden-Java alle aan één soort; in West-Java aan 2 of 3 soorten. Op Takòka (Preanger) heet de eene soort *Ki-kěpěr*, s. en de andere *Ki-hoedjan*, s. — Elders worden in de Preanger een dezer beide namen voor dezelfde soort gebezigd.

340* MYRICACEAE.

340. MYRICA L.

Myrica spec. — Inl. namen in de meeste streken of geheel onbekend of zeer lokaal en weinig bekend. Slechts op den G. Sěṇḍārā heeft de soort een aan de meeste inlanders bekenden vasten naam, nl: *Pitjisan*, j. Echter

wordt in Oost-Banjoemas soms ook *Nauclea lanceolata* BL. aldus genoemd. Locale namen: *Woeroe-kòntèt*, j. op den G. Praoe in Pèkalongan; *Mangkoan*, j. op den G. Mèrbaboe in Samarang.

Hout onbruikbaar.

341* SALICACEAE.

341. Hiertoe alleen een cultuurboom:

SALIX L.

Salix spec. — Op den G. Dièng *Kajoe-tjoemëti*, j. op den G. Galoenggoeng *Ki-ròtan*, s. — *Javaansche wilg* of *Javaansche treurwilg*.

Hout onbruikbaar. Zelden geplant.

342* CUPULIFERAE.

342. **QUERCUS L.** (*Lithocarpus*).

Hout van de meeste javaansche eiksoorten voor huisbouw uitmuntend geschikt.

Quercus spec. div. — Bijna alle soorten worden constant *Pasang*, j. s. (in Midden-Oost- en West-Java) *Kasang*, md. of *Masang* md. (in Oost-Java) genoemd. Die naam beantwoordt dus vrij wel aan het geslacht *Quercus*, L. — Door het daarachter plaatsen van een tweeden naam worden de soorten door de inlanders onderscheiden; bijv. *Pasang-kajang*, s.; *Pasang-bòdas* s.; *Pasang-djambè*, s.; *Pasang-tjèlèng*, s.; *Pasang-parèngpèng*, s.; *Pasang-batoe*, s.; *Pasang-luwe*, j.; *Pasang-tangâgâ*, j.; *Pasang-baloeng*, j.; *Masang-binèk*, md., enz. — Bij het bezigen dezer inl. „soortsnamen” hebben echter meestal zooveel vergissingen plaats en bestaan zoovele locale verschillen,

dat het raadzaam is als regel aan te nemen op deze namen niet voor de determinatie der speciesnamen te vertrouwen. In het gebruik van den „geslachtsnaam” vergist de inlander zich echter zóó zelden, dat de namen *Pasang*, j.; *Kasang*, md. en *Masang*, md. zoo goed als altijd alleen aan *Quercus*-soorten beantwoorden.

Er zijn echter een paar *Quercus*-soorten, welke namen dragen, waarin die geslachtsnamen steeds of meestal ontbreken; bijv. de volgende: *Boetaroewa*, s.; *Kajang*, s. en *Tangògò*, s. in de Preanger; *Mranak*, j. of *Pranak*, j. op den G. Praoe in Pèkalongan en den G. Moeriā in Djapāra; *Wrakas*, j. bij Ngébèl in Madioen.

343. *CASTANOPSIS* SPACH. (*Castanea*).

Hout van al de javaansche kastanje-boom voor huisbouw meer of minder geschikt; van *Ki-hioer*, s. en *Toenggeureuk*, s. zelfs zeer geschikt. — *Sanintèn*, s. wordt ongaarne gekapt, omdat de zaden eetbaar zijn.

Castanopsis spec. div. — Voor elk der 4—5 soorten, welke van dit geslacht op Java wilgroeïend voorkomen hebben de inlanders geen gemeenschappelijken naam; maar alle worden met afzonderlijke namen aangeduid, waarbij dikwijls de eene soort met de andere verward wordt. Inzonderheid is dit het geval met de in de Preanger *Toenggeureuk*, s. en *Kalimòròt*, s. genoemd soorten. Het minst komen vergissingen voor met *Ki-hioer*, s.; *Rioeng-anak*, s. of *Ki-rioeng*, s. en *Sanintèn*, s. of *Sarangan*, j. — De laatste naam kan in Midden-Java slechts aan één soort beantwoorden n.l. aan *Castanea argentea* BL., omdat zoover mij bekend is, dit aldaar de eenige *Castanea*-soort is. In de Preanger en in Bantèn wordt wel is waar deze soort bijna altijd *Sanintèn*, s. genoemd en vergissen de inlanders zich zelden in den naam van dezen boom, wanneer hij vruchten draagt (doordat dit op Java de eenige eetbare kastanjes zijn) maar in het tijdperk, dat de boom alleen bladeren draagt, wordt deze species door hen

niet zelden met een der andere *Castanea*-soorten verward. Bij het geven van den naam *Ki-ríoeng*, s. of *Ríoeng-anak*, s. (soms ook op het Pèngalèngan-plateau *Djara-unak*, s.) vergissen de inlanders zich zelden, doordat deze soort o. m. zich nogal gemakkelijk laat herkennen aan het groot aantal jonge loten, welke den stamvoet meestal omgeven (en waarnaar de boom ook door de inlanders zóó benoemd is).

In het algemeen hebben de hierboven vermelde namen toch veel waarde, aangezien men bijna altijd zeker kan zijn, dat het soorten zijn van het geslacht *Castanea*. Het zijn dus min of meer geslachtsnamen.

De in Midden-Java op den G. Praoc *Mranak*, j. genoemde boomsoort, welke door MIQUEL in zijn Flora Ind. Bat. nog tot *Castanea* GAERTN. gerekend wordt is door KING in zijne laatste werk over *Cupuliferae* tot het geslacht *Quercus* gebracht (zie boven).

Bij Sanggrawa (Preanger) vond ik nog een eigenaardige *Castanopsis*-soort, welke aldaar onder den lokalen onzekeren naam *Tjèngal*, s. bekend is. Die naam beantwoordt elders ook aan een paar andere boomsoorten.

344* GNETACEAE.

344. GNETUM L.

Gnetum spec. — *Tangkil*, s. j.; *Ki-tangkil*, s.; *Mlindjo*, j. *Mélinjo*, ml. — In Banjoewangi heet de boom, *Bagoe*, j. of soms ook *Bagòr*, j. (? md.). De eerste naam geldt echter meestal voor de schors (*Loeloep-bagoe*, j.) De vruchten heeten dáár *Mlindjo*, j.; de bloemen *Tjèngkarang*, j.; de bladeren *Sòh*, j. — In Djapàrà heet de boom *Trangkil*, j. — De naam *Ki-tankil*, s. geldt soms ook voor een paar andere boomsoorten.

Hout onbruikbaar; zeer zelden gekapt om de voor touw gebezigde schors en de eetbare vruchten en bladeren.

345* CONIFERAE.

345. **PODOCARPUS** L'. HÉR.

Podocarpus spec. A. — In de Preanger meestal *Ki-tjēmara*, s. (bijv. bij Tjibòdas op den G. Gède) of *Djamoedjoe*, s. (bijv. in de Djampang). Bij Pangèntjongan in de afd. Limbangan *Ki-hadès*, s. De beide eerste namen gelden uitsluitend voor deze species. (*Podocarpus cupressina* R. Br.) — Op den G. Slammat in Tégál *Tjēmārā*, j.; elders heeten *Casuarina*-soorten aldus. — In Madioen bij Ngébél *Tjēmārā-tikoeng*, j. locale naam. — In Samarang op den G. Oengaran *Tjēmārā-rante*, j.; — in Běsoeki bij Pantjoer op het Raoen-Idjèn-gebergte *Tjēmarah-binèk* md.; de beide laatste locale namen.

Hout duurzaam fijn en zeer fraai; voor huisbouw en meubels uitmuntend geschikt. In reusachtige afmetingen en groote hoeveelheden te krijgen.

Podocarpus spec. B. — Bij Takòka in de Djampang (Preanger) *Ki-malèla*, s. — In Bantén bij name geheel onbekend.

Hout fijn en duurzaam; voor huisbouw en meubels. Zeldzame boom. Niet in groote afmetingen.

Podocarpus spec. C, D. (en E?). — Inl. namen voor deze soorten vaak de een voor den anderen gebezigd. In enkele streken worden twee soorten echter goed uit elkander gehouden; bijv. bij Pangèntjongan op den G. Galoenggoeng in de Preanger *Ki-měrak*, s en *Ki-bima*, s. — De overige namen zijn: *Ki-poetri*, in de afd. Tjandjoer (Preanger); *Bimā*, j. bij Soerdjā in Pěkalongan; *Ki-lilin*, j. bij Tjibòdas in de Preanger; *Měrakan*, j. bij Tjilatjap in Z.-Banjoemas; *Mělelā*, j. op den G. Slammat in Tégál en den G. Praoe in Pěkalongan; ? *Kajoe-lěgèn*, j. op den G. Oengaran in Samarang; *Ki-pantjar*, s. — Op den G. Galoenggoeng in de Preanger; *Radin*, j. bij Pantjoer in Běsoeki; *Kajoe-taoen*, j. in Tégál op den G. Slammat; *Ki-sè-èl*, s. bij Sanggrawa in de Djampang (Prean-

ger). — De naam *Kajoe-taoen*. j. geldt elders meestal voor allerlei soorten van hout behalve *Djati*, j. (zoogenaamd wilddhout). — De inl. namen in Midden- en Oost-Java zijn voor deze soorten dikwijls geheel onbekend en evenzoo de uitmuntende eigenschappen van het hout van sommige dezer soorten. — Vele der genoemde namen gelden ook voor andere boomsoorten.

Hout van de grootste dezer soorten voor huisbouw geschikt; van de kleinste soort (*Ki-bima*, s.; *Ki-měrak*, s.; *Radin*, md. van Pangentjongan) voor huisbouw bruikbaar.

346. Cultuurboomen.

AGATHIS SALISB. (*Dammara*).

Agathis spec. — *Dammar*, ml.

Hout voor ? huisbouw. Zelden gekapte sierboom.

ARAUCARIA Juss.; **CUPRESSUS** L. en een paar andere uitheemsche Coniferengeslachten komen op Java in tuinen van Europeanen of in aanplantingen van het Boschwezen gecultiveerd voor. Daarvan hebben de meeste geen inl. naam of worden *Tjemara*, ml. genoemd, evenals *Casuarina*-soorten.

347* CYCADACEAE.

347. CYCAS LINN.

Cycas spec. — *Pakis-adji*, j. in Banjoewangi. In het algemeen worden verschillende varens *Pakis*, j. genoemd.

Hout onbruikbaar.

348* LILIACEAE.

348. CORDYLINE COMM.

Cordyline spec. div. — In de Preanger: *Hanjoewang-kasintòk*, s. bij Sanggrawa; *Hanjoewang*, s. bij Palaboehan. — *Soewangkoeng*, s. in Z. W. Bantén. — Locale en weinig bekende namen. Inl. naam dikwijls onbekend.

Hout onbruikbaar.

349* PALMACEAE.

349. ARECA L.

Areca spec. div. — *Pinang*, s.; *Djambe*, j.; *Pènanng*, md.

Hout nagenoeg onbruikbaar.

350. PTYCHOSPERMA, LABILL.

Ptychosperma spec. div. — *Bimbing*, j.; *Bidji*, j.; *Lěmbidji*, j.; *Anjawar*, j.; *Měnjawar*, j.; *Pènanng-rantèh*, md. — Elk dezer namen geldt voor meerdere soorten van dit geslacht. — Op het Pèngalèngan-plateau *Bingbing*, s.

Hout onbruikbaar.

351. ONCOSPERMA BLUME.

Oncosperma spec. — *Gěndincoeng*, j. bij Tjilatjap in Z. Banjoemas een vaste naam; — *Èrang*, s. aan Zuidkust van Djampang-koelòn (Preanger).

Hout zeer duurzaam; voor huisbouw geschikt.

352. CARYOTA L.

Caryota spec. A. — *Soewangkang*, s. op het Pèngalèngan-plateau in de Preanger. — *Soewangkoeng*, j. of *Sěmangkòng*, j. in Těgal en Banjoemas.

Hout misschien voor huisbouw bruikbaar. Zeer zeldzame boom.

Caryota spec. B. — *Gěndoeroe*, j.; *Khěnthoeroeh*, md. — In Zuid-Banjoemas soms ook *Soewangkoeng*, j. — De eerstgenoemde vrij algemeen bekend en bijna alleen voor deze soort geldend.

Hout onbruikbaar.

353. CORYPHA L.

Corypha spec. — *Gěbang*, j. — De jonge bladeren (waaruit touw gemaakt wordt) heeten in Banjoewangi *Hagěl*, j. of *Hagěl-gěbang*, j. — *Tarigan-gěbang*, j. of *Tarik-gěbang*, j. heet in Banjoewangi een uit een jong blad vervaarvaardigd regenscherm.

Hout onbruikbaar.

354. LIVISTONA R. BROWN.

Livistona spec. 2 — (?) *3.* — *Sadang*, j. s.; *Sadèng*, j.; *Sading*, j.; — zeer vaste, uitsluitend voor soorten van dit geslacht geldende namen.

Hout in Z. W. Běsoeki veelvuldig voor huisbouw gebezigd; duurzaam en sterk. Van de in Bantěn groeiende soort schijnt mij het hout minder deugdzzaam toe.

355. BORASSUS L.

Borassus spec. — *Siwalan*, j. in Midden-Java; *Tal*, j. in Oost-Java (Běsoeki) en *Thriboeng*, md. in Běsoeki. — *Tjaeotal*, j. heet in Poegěr (Z. W. Běsoeki) een drank uit het sap van deze boomsoort vervaardigd; *Ānggā-tal*, j. of *Ānggā*, j. heet dáár de uit den stam van *Borassus* verkregen *Sago*.

Hout alleen voor goten bruikbaar.

356. COCOS L.

Cocos spec. — *Klāpā-sara*, j.; *Klapa-sara*, s. in Z. W. Bantěn en in Banjoewangi aan de Zuidkust van het schiereiland Poerwā; is de eenige inheemsche *Cocos*-soort van Java; wellicht de stamvorm van *C. nucifera* L. (zie hieronder cultuurboomen).

Hout onbruikbaar.

357. ARENGA LABILL.

Arenga spec. A. — *Arèn*, j. — In Banjoewangi *Lirang*, j. — In Zuid-Preanger *Arèn*, s. of *Kawoeng*, s. (1)

Voor sommige deelen van dezen boom bestaan bij de Javanen en Soendaneezen eigenaardige uitdrukkingen. Bekapte stam: *Roejoeng*, j. s.; — blad met bladsteel, in zijn geheel: *Papah*, j. of *Palapah*, s.; — middennerf der bladslippen: *Sādā*, j. of *Njèrè*, s.; de stamvezels: *Doek*, j. of *Indjoek*, s.; — schrijfstiften uit de dikke vezels vervaardigd: *Soewā*, j. of *Haroepat*, s.; — tonder uit de jonge bastvezels gemaakt: *Kawoel*, j. of *Loengloeng*, s.; stamtop met de nog niet ontloken bladeren *Pòndòh-arèn*, j. of *Oemboet-kawoeng*, s.; — de gemeenschappelijke bloemsteel *Lěngěn*, s.; — bloemen: *Dangoe*, j. rijpe vruchten: *Tjaroeloek*, s. of *Kolang-kaling*, j.; het sap dat uit den afgesneden bloemsteel vloeit: *Lěgěn*, j. of *Lahang*, s.; — touw uit arèn-vezels gemaakt: *Tali-doek*, j.; *Tambang-indjoek*, s.; *Tali-indjoek*, s. of *Gěmoetoe*, ml.

Hout voor goten zeer geschikt; blijkens voorwerpen op de tentoonstelling van 1893 te Batavia voor meubels bruikbaar; echter niet fraai. Voor wandelstokken nogal veel gebezigd.

Arenga spec. B. — *Langkap*, j. s. — Zeer vaste naam.

Hout voor lansstelen gezocht.

358. Cultuurboomen.**ARECA L.**

Areca spec. — *Pinang*, s. j. ml.; *Thjeumphèh*, md.; *Djambe*, j.

Hout bruikbaar voor goten ("talang").

METROXYLON ROXB.

Metroxylon spec. — *Kiraj*, s.; *Sago-palm*, — In Bantën ook verwilderd.

Hout nagenoeg onbruikbaar.

(1) *Arěng*, j. is de javaansche naam voor houtskool.

COCOS L.

Cocos spec. — *Klapa*, s. ml.; *Krambil*, j.; *Klāpā*, j.; *Njòr*, md. zijn de vaste namen voor deze soort. Om de verschillende deelen van deze boomsoort aanteduiden bezigen de Soendaneezen en Javanen de volgende termen:

De stam *Gloegoe*, j. of *Tangkal-klapa*, s. — Groen blad met den bladsteel (in zijn geheel): *Papah*, j. of *Palapah*, s.; — oud verdord blad met den steel (in zijn geheel): *Blarak*, of *Baralak*, s.; — stengeltop met de nog niet ontloken bladeren: *Pëndòh*, j. of *Oemoet*, s.; — bladsteel, waarvan de bladeren afgenomen zijn: *Bloengkang*, j. — middennerf van de bladslippen: *Sādā*, j.; *Lidi*, j. of *Njèrè*, s.; — groene bladslippen: *Djanoer*, j. en de halfontwikkelde, nog gele (jonge bladeren: *Djanoer-koening*, j.; — bloem, j.: *Manggar*, j.; — bloembekleedselen: *Mantjoeng*, j.; *Angkoep-sèkar*, j. of *Sintjoeng*, s.; — Stamper: *Bloeloek*, j.; — zeer jonge vrucht *Tjèngkèr*, j. of *Tjèngkir*, s.; — bijna rijpe vrucht *Dëgan*, j. of *Dawëgan*, s.; — geheel rijpe vrucht *Klapa*, j.; *Krambil*, j. of *Kalapa*, s.; — Klapperdop (binnen-vruchtwand) *Batòk*, s. of *Batòk*, j.; — vezelige bast van de Klapa-noot (midden- en buiten-vruchtwand): *Sepèt*, j. of *Tepès*, j. *Tapas*, of *Tjangkang-klapa*, s.

Hout zeer weinig duurzaam; voor zeer tijdelijken huis- en bruggenbouw en ook voor ruwe meubels bruikbaar.

359* PANDANACEAE.
359. PANDANUS L.

Pandanus spec. div. — *Pandan*, j.; *Pandan*, s.; hierachter een inl. soortnaam; bijv. *Pandan-laut* s. — *Badoer*, s. in Z. W. Bantën in Oedjoengkoelon bij den Tjiboenar; is de grootste javaansche *Pandanus*. — *Tjangkoewang*, s. nogal vaste naam in de Preanger voor een in de bergstreken groeiende soort

Hout onbruikbaar.

360* GRAMINEAE.

De javaansche *Bamboe*-soorten behooren tot de geslachten:

360. **BAMBUSA** SCHREB.;
 361. **GIGANTOCHLOA** KURZ;
 362. **OXYNANTHERA** MUNRO.;
 363. **DENDROCALAMUS** NEES. en
 364. **SCHIZOSTACHYUM** MEES.

Alle *Bamboe*-soorten worden door de inlanders op Java constant tot een der volgende „geslachten” gebracht: *Bamboe*, ml.; *Awi*, s.; *Pring*, j.; *Dëling*, j. en in Banjoewangi soms ook *Djadjang*, j.

Bij Buitenzorg worden o. m. de volgende soorten onderscheiden *Awi-koening*, s.; *Awi-tali*, s.; *Awi-awoer*, s.; *Awi-andòng-gòmbòng*, s.; *Awi-andòng-lea*, s.; *Awi-tamiang*, s.; *Awi-atër*, s.; *Awi-bitoeng*, s.; *Awi-hideung*, s.; *Awi-tjina*, s.

In Z. W. Bantën bij Tjëmara: *Awi-bitoeng*, s.; *Awi-hideung*, s.; *Awi-majang*, s.; *Awi-tjangkètèk*, s.; *Awi-boeloe*, s.; *Awi-boenar*, s.; *Awi-ajër*, s.; *Awi-toetoel*, s.; *Awi-haoer*, s.; *Awi-bangkònòl*, s.; *Awi-lèngka*, s.; *Awi-tamiang*, s.; *Awi-kapas*, s.; *Awi-atër*, s. en *Awi-haoer-geulis*, s.

In Banjoewangi: *Djadjang-pring*, j. (de *Pring-tali*, j. of *Pring-apoes*, j. van Midden-Java); *Djadjang-bëtoeng*, j.; *Djadjang-òri*, j.; *Djadjang-bënèl*, j.; *Djadjang-sërit*, j.; *Djadjang-woeloeh*, j.; *Djadjang-gading*, j.; *Djadjang-ampèl*, j. Behalve *Djadjang-gading*, j. (*Gele bamboe*) groeien al deze soorten in Banjoewangi in het wild.

Mits langdurig uitgeoogd zijn vele der grootere bamboe-soorten niet alleen voor tijdelijk, maar ook voor meer blijvend materiaal bij huisbouw geschikt.

365. Gecultiveerde soorten.

De meeste der in 364 genoemde soorten worden op Java algemeen door de inlanders aangeplant. Op de talrijke nog zeldzaam of niet op Java gecultiveerde prachtige japansche *Bamboe*-soorten (zie L. van de Polder in het Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem van Maart 1894 en zie verder het Tijdschr. Nijv. en Landb. Ned. Indië 1894) is sedert kort de aandacht gevestigd.

366* FILICES.

De boomvarens van Java behooren tot een der volgende geslachten:

366. ALSOPHILA BROWN.

367. CYATHEA SMITH. en

368. BALANTIUM KAULF.

Zij worden in Midden-Java *Pakis-galar*, j. of *Galar*, j.; — in West-Java *Pakoe-tihang*, s. en in Běsoeki (Oost-Java) veelal evenals de vele kruidachtige en heesterachtige varen-soorten, alleen *Pakis*, j.

Hout voor huisbouw. Alleen in kleine afmetingen.
Sommige soorten zijn, mits in het gebergte gebezigd,
zeer duurzaam.

I N D E X

DER

F A M I L I È N. (1)

Ampelidaceae 95*.	Gesneriaceae 262*.	Passifloraceae 186*.
Anacardiaceae 114*.	Gnetaceae 344*.	Pittosporaceae 20*.
Anonaceae 7*.	Gramineae 360*.	Polygalaceae 21*.
Apocynaceae 242*.	Guttiferae 23*.	Proteaceae 285*.
Araliaceae 189*.	Hamamelidaceae 159*.	Rhamnaceae 74*.
Bignoniaceae 263*.	Hypericaceae 22*.	Rhizophoraceae 160*.
Bixaceae 15*.	Ilicaceae 92*.	Rosaceae 150*.
Boraginaceae 254*.	Juglandaceae 339*.	Rubiaceae 202*.
Bursaceae 74*.	Lauraceae 282*.	Rutaceae 64*.
Cactaceae 188*.	Leguminosae 123*.	Sabiaceae 113*.
Capparidaceae 13*.	Liliaceae 348*.	Salicaceae 341*.
Caprifoliaceae 201*.	Loganiaceae 252*.	Samydaceae 184*.
Casuarinaceae 343*.	Lythraceae 178.	Santalaceae 288*.
Celastraceae 93*.	Magnoliaceae 3*.	Sapindaceae 96.
Combretaceae 164*.	Malvaceae 39*.	Sapotaceae 228*.
Compositae 221*.	Melastomaceae 174*.	Saxifragaceae 155*.
Coniferae 345*.	Meliaceae 78*.	Scrophulariaceae 261*.
Cornaceae 197*.	Monimiaceae 280*.	Simarubaceae 72*.
Cupuliferae 342*.	Moringaceae 149*.	Solanaceae 258*.
Cycadaceae 347*.	Myricaceae 340*.	Sterculiaceae 45*.
Datisceae 187*.	Myristicaceae 278*.	Styracaceae 237*.
Dilleniaceae 1*.	Myrsinaceae 224*.	Ternstroemiaceae 27*.
Dipterocarpaceae 36*.	Myrtaceae 167*.	Thymelaeaceae 286*.
Ebenaceae 233*.	Nyctaginaceae 276*.	Tiliaceae 55*.
Elaeocarpaceae 60*.	Oleaceae 89.	Urticaceae 324*.
Euphorbiaceae 290*.	Oleaceae 240*.	Vacciniaceae 223*.
Filices 366*.	Palmae 349*.	Verbenaceae 267*.
Geraniaceae 62*.	Pandanaceae 359*.	Violaceae 14*.

(1) De nummers achter de op blz. 138—147 genoemde familie-namen geven niet de bladzijde, maar het vet gedrukte volgnummer van den tekst aan.

I N D E X

DER

L A T I J N S C H E N A M E N .

Acacia WILLD. 144.
 Acalypha L. 312.
 Acer L. 109.
 Acer spec. 282*.
 Achras L. 233.
 Aconodia BL. 61.
 Aconychia FORST. 68.
 Actephila MUELL. ARG. 293.
 Adenanthera L. 142.
 Adina SALISB. 203.
 Adinandra JACK. 29.
 Aegiceras GAERTN. 227.
 Aegle CORREA. 70.
 Afzelia SM. 136.
 Agapetes G. DON. 223.
 Agathis SALISB. 346.
 Agathisanthes BL. 200.
 Aglaia LOUR. 80, 83.
 Ailanthus DESF. 73 α.
 Alangium LAM. 197.
 Albizzia DURAZZINI 136.
 Aleurites FORST. 308.
 Aleurites moluccana FORST. 87.
 Allium 115.
 Allophyllus 98.
 Alsodeia THOUARS 14 α.
 Alsophila BROWN. 365.
 Alstonia 64; 190; 182.
 Alstonia R. BROWN. 247.
 Alstonia scholaris R. BR. 242*.
 Altingia NORONHA 159.

Amaracarpus BL. 217.
 Amherstia WALL. 148.
 Amora RXB. 80; 85.
Ampelidaceae 95*.
Anacardiaceae 113; 114*.
 Anacardium 121; 170.
 Anaphalis SCHULTZ. Bip. 222.
 Anisonema A. JUSS. 298.
 Anomasanthes BL. 100.
 Anona 12.
Anonaceae 7; 11*.
 Anthocephalus RICH. 203.
 Antidesma L. 323 305.
 Antiaris LESCHEN. 330.
Apocynaceae 242*.
 Aporosa BL. 303.
 Aquilaria LMM. 286.
Araliaceae 189*.
 Araucaria JUSS. 346.
 Ardisia SWARTZ 226.
 Areca L. 349.
 Areca spec. 358.
 Arenga LABILL. 357.
 Arthropphyllum BL. 194.
 Artocarpus FORST. 332..
 Astronia BL. 174.
 Averrhoa L. 62.
 Averrhoa spec. 63.
 Avicennia L. 274.
 Azadirachta A. JUSS. 79.
 Baccaurea LOUR. 306; 323.

Baccaurea spec. 323.
Balantium KLF. 367.
Bambusa SCHREB. 360.
Barringtonia Vriesei T. et B. 309.
Barringtonia FORST. 171.
Borassus L. 355.
Bassia L. 231.
Bauhinia L. 134, 148.
Bennetia MIQ. 16.
Bergsmia BL. 16.
Bignoniaceae 263*.
Bischofia BL. 303.
Bixa spec. 19.
Bixaceae 15*.
Bixa Orellana L. 60.
Blackwellia JUSS. 185.
Bombax LINN. 41.
Boraginaceae 254*.
Borassus L. 355.
Bouea BL. 117.
Brachypterum BENTH. 128.
Brassaiopsis D.C. et PLANCH. 195.
Bridelia WILLD. 290.
Proussonetia 338*.
Brownea JACQ. 148.
Brucea MILL. 73.
Bruguiera 166, 161, 160.
Bruinsmea BOERL. et KOORD. 238.
Buchanania RXB. 114.
Buddleia L. 252.
Burseraceae 74*.
Butea RXB. 125.
Caesalpinia L. 148.
Cactaceae 188*.
Callicarpa L. 268.
Calpandria 34.
Calophyllum LINN. 25.
Calosanthus BL. 263.
Calysaccion 24.
Camellia spec. 35.
Camellia LINN. 34.

Campnosperma 119.
Cananga BL. 8.
Canariopsis 76.
Canarium L. 76.; 80.
Canthium LAM. 218.
Capparidaceae 13*.
Capparis LINN. 14; 13.
Caprifoliaceae 201*.
Capura BL. 104.
Carica L. 186.
Carallia ROXB. 163; 160*.
Carapa AUBL. 87.
Cargillia 235.
Carumbium REINW. 319.
Caryophyllus 170.
Caryota L. 352.
Casearia JACQ. 184.
Casearia spec. 184; 235.
Cassia L. 148, 132.
Castanea GAERTN. 343.
Castanea argentea BL. 343.
Castanopsis SPACH. 943.
Casuarinaceae 343*.
Casuarina FORST. 343 z.
Casuarina spec. 346.
Cedrela LINN. 88.
Celastraceae 93*.
Celtis L. 324.
Ceramanthus HASSK. 298.
Ceratostachys BL. 200.
Cerbera L. 243.
Ceriops ARN. 162; 160.
Chasalia COMM. 215.
Cheilosa BL. 317.
Chionanthus L. 240.
Chisocheton BL. 80; 81.
Chrysophyllum 228.
Cinchona L. 220.
Citrus spec. div. 71.
Claoxylon JUSS. 311.
Clausena 67.

Cleidion BL. 316

Cleisthanthus HOOK. 291.

Climacandra MIQ. 226.

Cocos L. 356; 258.

Codiaeum RUMPH. 323.

Coelodepas HASSK. 297.

Coffea L. 220.

Colocasia 45.

Columbia PERS. 57.

Combretaceae 164*.

Commersonia FORST. 53.

Commersonia spec. 61.

Compositae 221*.

Coniferae 345*.

Cookia 66.

Copaifera L. 148.

Cordia L. 256, 254.

Cordyline COMM. 348.

Cornaceae 197*.

Corypha L. 353.

Covellia MIQ. 329.

Crataeva 14.

Cratoxylon BL. 22; 25.

Crescentia L. 266.

Croton LINN. 323, 309.

Crudia SCHREB. 138.

Crypteronia BL. 99; 180.

Cudrania TRÉCUL. 331.

Cupania L. 99.

Cupressus L. 346.

Cupuliferae 342*.

Curcas L. 309.

Curcas GRISEB. 323.

Cyathea SMITH. 367.

Cycas LINN. 347.

Cycadaceae 347*.

Cyclostemon BL. 302.

Cynometra ramiflora MIQ. 7.

Cynometra L. 140; 148.

Cyphomandra SENDTN. 260.

Cyrtandra FORST. 262.

Cyrtosiphonia 246.

Dalbergia L. 126.

Dammara LINK. 346.

Daphniphyllum BL. 304.

Daphniphyllum spec. 282.

Datisceae 187*.

Debregeasia GAUD. 337.

Decaspermum FORST. 169.

Dendrocalamus NEES.

Dendrolobium 123; 291.

Derris LOUR. 128.

Desmodium DESV. 123.

Dialium L. 133.

Dialium indum L. 129.

Dicrostachys DC. 143.

Didymochiton 80.

Dilleniaceae 1*.

Dillenia LINN. 2.

Diospyros 236; 235; 229.

Diplospora KORTH. 210.

Dipterocarpaceae 36*.

Dipterocarpus BL. 36.

Discostigma 23.

Dittelasma HOOK F. 96.

Dodecastemon HASSK. 302.

Dodonaea L. 110.

Dolichandrone SEEM. 121; 264.

Doona THW. 38.

Dracontomelum BL. 76; 80; 107; 119.

Duabanga HMLT 181.

Duranta L. 275.

Durio LINN. 42.

Dysoxylum 189; 286.

Dysoxylum BL. 80, 81; 85; 107.

Ebenaceae 233*.

Echinocarpus BLUME 60.

Ehretia L. 256.

Elaeocarpaceae 60*.

Elaeocarpus BL. 61.

Elaeocarpus dentatus REINWT. 61.

Elaeocarpus obtusus BL. 61.

Elaeocarpus spec. div. 71.

Elataeriospermum BL. 307.

- Emblica* GAERTN. 298.
Engelhardtia L. 339.
Epicharis 80.
Erioglossum BL. 97.
Erythrina L. 148, 124.
Erythrina spec. 255.
Eucalyptus L' HÉR. 173.
Eugenia spec. 26.
Eugenia L.
Euonymus L. 93.
Euphorbia 184.
Euphorbia L. 323, 292.
Euphorbiac. 282; 290; 322.*
Eupteron MIQ. 191.
Eurya THUNB. 28.
Eurycoma longifolia JACK. 94.
Evia COMM. 118; 122.
Evodia FORST. 64.
Exocarpus LABILL. 289.
Exoecaria L. 321.
Fagraea THUNB. 253.
Fagraea spec. 255.
Feronia CORREA. 69.
Ficus L. 189; 329.
Ficus alba RWT. 221.
Filices 365*.
Flacourtia COMM. 16.
Flacourtia spec. 19.
Flueggea WILLD. 299.
Fraxinus L. 241.
Galearia ZOLL. et MOR. 295.
Galumpita BL. 327.
Ganophyllum BL. 102.
Gardenia L. (pp) 206, 207.
Garcinia LINN. 23.
Garuga RXB. 74.
Gelonium RXB. 318.
Geniostoma FORST. 255.
Geraniaceae 62*.
Gesneriaceae 262*.
Geunsia BL. 267.
Gigantochloa KURZ. 361.
Gironniera 150.
Gironniera GAUD. 327.
Glochidion FORST. 115; 300.
Glochidionopsis BL. 300.
Gluta L. 229; 116.
Glycosmis CORR. 67.
Gmelina L. 271.
Gnaphalium 222.
Gnetaceae 344*.
Gnetum L. 344.
Gomphandra WALL. 90.
Goniochiton 80.
Gonystylus TEYSM et BINN. 287.
Gordonia ELLIS 33.
Gramineae 360*.
Grewia 184.
Grewia LINN. 56.
Grumilea 214.
Guatteria 9.
Guazuma spec. 54.
Guettarda L. 210,
Guttiferae 23*.
Gymnosporia W. et A. 93.
Gynopachys BL. 207.
Gynotroches BL. 164.
Gyrocarpus JACQ. 165.
Haematoxylon L. 148.
Hamamelidaceae 159*.
Harpullia RXB. 108.
Hartighsia 80.
Hedycarpus JACQ. 306.
Helicia LOUR. 285.
Hemicyclia W. et ARN. 294.
Henslovvia WALL. 180.
Heptapleurum GAERTN. 195, 192.
Heritiera AIT. 47.
Hernandia L. 40.
Hernandia sonora L. 40.
Hevea AUBL. 323.
Heynea RXB. 86.
Hibiscus LINN. 39.
Hibiscus spec. 40; 44.

Homalanthus A. JUSS. 319.
Homalium JACQ. 185.
Horsfieldia BL. 193; 190; 193.
Hunteria RXB. 242.
Hura L. 323.
Hydrangea L. 155.
Hymenaea L. 148.
Hymenodictyon WALL. 204.
Hypericaceae 22*.
Ilex L. 92.
Ilicaceae 92*.
Indigofera 148
Inocarpus L. 124.
Irina 107.
Itea L. 156.
Ixora L. 211.
Jambosa 170.
Jatropha L. 323.
Jossinia 170.
Juglandaceae 282, 339*
Kandelia WIGHT. 164.
Kibara ENDL. 281.
Kibessia DC. 175.
Kickxia BL. 251.
Kiesera REINWT. 124.
Kigelia DC. 266.
Kleinhovia LINN. 50.
Kopsia BL. 245.
Lactaria RUMPH. 244.
Lagerstroemia L. 179.
Lansium RUMPH. 84.
Laportea GAUDICH. 333.
Lasianthera 90.
Lasianthus JACQ. 219.
Lauraceae 280*.
Lawsonia L. 183.
Leea LINN. 95.
Leguminosae 123*.
Leiocarpus BL. 303.
Lepisanthes 100.
Leptospermum FORST. 167.
Leucaena glauca L. 145.

Leucosyke Z. et M. 338.
Liliaceae 348*.
Limonia L. 67.
Linociera spec. 65.
Linociera SW. 240.
Ligustrum L. 240.
Liquidambar L. 159.
Lithocarpus BL.
Litosanthes BL. 216.
Livistona R. BROWN. 354.
Loganiaceae 252*.
Lophopetalum WIGHT. 93.
Lumnitzera 166.
Lydenia Z. et M. 176.
Lythraceae 178*.
Maba FORST. 234; 235.
Macaranga THOUARS. 315.
Maclura 331.
Macromyrtus 170.
Macropanax MIQ. 196.
Maesa FORST. 224.
Magnoliaceae 3*.
Mallotus floribundus MUELL. ARG.
314.
Mallotus LOUR. 314; 238.
Malvaceae 39*.
Mangifera L. 121; 115.
Manglietia 5.
Manihot ADANS. 323.
Maoutia WEDD. 336.
Mappa JUSS. 315.
Marlea RXB. 198.
Mastixia BL. 199.
Melaleuca 173, 167.
Melanochyla Hook. F. 119.
Melanolepis Z. ET M. 314.
Melastomaceae 174*.
Melastoma BURM. 177.
Melia L. 78.
Melia spec, 158.
Meliaceae 78*.
Meliosma BL. 110; 107; 80; 121.

Melochia LINN. 52.
Memecylon 176, 170.
Mesua LINN. 26.
Mesua ferrea L. 170.
Metroxylon RXB. 358.
Michelia LINN. 4.
Micomelum BL. 66.
Microtropis WALL. 93.
Millingtonia 266.
Mimulus L. 232; 233.
Monimiaceae 282; 280*.
Monoceras 61.
Morinda L. 283; 200.
Moringa spec. 149.
Moringaceae 149*.
Murraya L. 67.
Musa spec. 186.
Myrica L. 340.
Myricaceae 340*.
Myristica L. 279; 278.
Myristicaceae 278*.
Myrsinaceae 224*.
Myrsine L. 225.
Myrtaceae 167; 245.
Nanopetalum HASSK. 291.
Nauclea L. 203.
Nauclea lanceolata BL. 340.
Neesia BL. 43.
Neesia altissima BL. 230.
Nelitris GAERTN. 169.
Nephelium L. 106.
Nephelium spec. 112.
Nothopanax MIQ. 189.
Nyctaginaceae 276*.
Nyssa L. 200.
Ochrocarpus THOUARS 24.
Ochrosia JUSS. 244.
Odina 121.
Oleaceae 89*
Oleaceae 240*
Olea LINN. 240.
Oncosperma BLUME. 351.

Ophioxylon 246.
Opuntia MILL. 188.
Orchipeda BL. 248.
Oreocnide 335.
Oroxylum VENT. 263.
Ostodes BL. 310.
Otonychium BL. 108.
Oxynanthera MUNRO. 362.
Pachystemon BL. 315.
Pahudia spec. 139.
Palaquium BLANCO 230; 233.
Palmae 346*.
Panax L. 189.
Pandanus L. 359.
Pandanaceae 359*.
Pangium REINW. 17.
Pahudia MIQ. 135.
Paracelastrus 93.
Paracroton MIQ. 296.
Parasponia BL. 326.
Paratropia DC. 95; 192.
Parinarium JUSS. 136; 150.
Parinarium scabrum HSSK. 327.
Parkia BROWN. 148, 141.
Parkinsonia L. 148.
Passifloraceae 186*
Pavetta L. 212.
Paysonia A. DC. 231.
Peltophorum 142.
Peltophorum VOG. 137; 131.
Pemphis FORST. 178.
Pentace HASSK. 55.
Peronema JACK. 273.
Persea GAERTN. 284.
Petunga DC. 209.
Philagonia 64.
Photinia LINDL. 153.
Phyllanthus L. 323; 298.
Phyllocladus BURM. 329.
Picrasma BL. 72.
Pierardia BL.
Piliostigma HOCH. 134; 148.

Pipturus WEDD. 334.
Pisonia L. 277, 276.
Pithecolobium 131; 129; 102.
Pithecolobium MART. 146; 148.
Pithecolobium montanum BTH. 145
Pittosporaceae 20*.
Pittosporum BANKS. 20.
Pittosporum spec. 253.
Plagianthera Z. ET M. 314
Planchonia BL. 172.
Platea BL. 91.
Plumeria L. 252.
Podocarpus 235.
Podocarpus L.' HÉR. 345.
Pogonotrophe 329.
Poinciana L. 148.
Polyalthia BL. 9.
Polygalaceae 21*.
Polyosma BL. 157.
Polyscias FORST. 189.
Polyspora 33.
Pometia FORST. 107; 80.
Pongamia VENT. 133.
Pootia 248.
Pouzolzia GAUD. 329.
Premna L. 270.
Premna tomentosa WILLD. 206.
Prinos 92.
Prosopis L. 148.
Proteaceae 285*.
Protium WIGHT. 75.
Prunus L. 151; 154.
Pryona MIQ. 138.
Pseudostreblus BURM. 329.
Psidium 173; 170.
Psychotria L. 214.
Pterocarpus L. 127.
Pterocarpus indicus WILLD. 126.
Pterocymbium 45.
Pterospermum SCHREB. 51.
Ptychosperma LABILL. 350.
Punica TOURNEF. 183.

Putranjiva WALL. 301.
Pygeum GAERTN. 152.
Pyrenaria BL. 31.
Quercus L.
Randia L.
Ratonia DC. 100.
Rauwolfia 245; 242.
Reevesia R. BROWN. 49.
Reidia WIGHT. 298.
Rhamnaceae 94*.
Rhipidostigma HASSK. 234; 235.
Rhodamnia JACQ. 168.
Rhizophora L. 166; 160.
Rhizophoraceae 131; 160*.
Ricinus L. 323.
Rosaceae 150*.
Rottlera ROXB. 314.
Rubiaceae 202, 245*.
Rutaceae 64*.
Sabiaceae 113*.
Saccopetalum 10.
Salicaceae 341*.
Salix L. 341.
Salmalia 41.
Samadera L. 73.
Samydaceae 184*.
Sandoricum 82.
Santalaceae 288*.
Santalum L. 288.
Sapindaceae 96*.
Sapindus L. 80; 96; 108.
Sapium R. BROWN. 320.
Sapota 233.
Sapotaceae 228.
Saprosma BL. 219.
Saraca L. 137.
Sarcocephalus AFZEL. 202.
Saurauja WILLD. 30.
Sauropus 322.
Saxifragaceae 155*.
Scepasma BL. 298.
Schima REINW. 32.

Schizostachyum NEES. 364.

Schizolobium VOGEL. 148.

Schleichera WILLD. 101.

Schmidelia L. 98.

Schoutenia KORTH. 59.

Scelopora SCHREB. 15.

Scrophulariaceae 261*.

Semecarpus L. 120; 229.

Sesbania PERS. 148.

Sideroxylon 42.

Sideroxylon BL. 229.

Simarubaceae 72*.

Sindora MIQ. 139.

Sindora spec. 226.

Siphonodon GRIFF. 93.

Sloetia T. et B. 329.

Solanaceae 258*.

Solanum L. 259, 258.

Solenostigma ENDL. 324.

Sonneratia L. 182; 261.

Sophora L. 130.

Sorindeia THOUARS. 122.

Spathodea 264.

Spondias L. 121; 118.

Sponia COMM. 325.

Stalagmites 23.

Stelechocarpus 140.

Stelechocarpus BL. 7.

Stemonurus 90.

Stephegyne KORTH. 203.

Sterculia BL. 45.

Sterculiaceae 45*.

Stereoderma BL. 240.

Stereospermum CHAM.

Streblus spec. 328; 314.

Strombosia 218.

Strombosia BL. 89.

Strychnos L. 255.

Stylocoryne CAV. 206; 207.

Styracaceae 237.

Styrax L. 239.

Symplocos L. 237.

Synoechia 329.

Syzygium 170.

Tabernaemontana L.

Talauma JUSS. 3.

Tamarindus 148.

Tambourissa SONN. 280.

Taraktogenos HASSK. 18.

Tarrietia BL. 46.

Taxotrophis BL. 329.

Tectona L. 269.

Tephrosia PERS. 124.

Terminalia 46.

Terminalia L. 164.

Ternstroemiaceae 27*.

Ternstroemia LINN. 27.

Tetractinostigma HASSK. 303.

Tetradia BROWN. 48.

Tetrameles 45.

Tetrameles R. BR. 187.

Tetrameles nudiflora R. BR. 165.

Thespesia CORR. 40.

Thymelaeaceae 286*.

Tiliaceae 55*. excl. Elaeoc.

Tournefortia L. 257.

Trachylobium HAYNE. 148.

Trema BL. 325.

Trewia L. 318.

Trevesia VIS. 193.

Trichospermum BL. 58.

Tridesmis 22; 25.

Tristania R. BR. 173.

Turpinia VENT. 111.

Urostigma 329.

Urticaceae 324*.

Vacciniaceae 223*.

Vaccinium MIQ. 223.

Vanguiera JUSS. 210.

Vatica LINN. 37.

Verbenaceae 267*.

Vernonia SCHREB. 221.

Viburnum L. 201.

Villarezia RUÍZ et PAVON. 91.

Villebrunea GAUD. 335.

Violaceae 14*.

Visenia HOUTT 52.

Visiania DC. 240.

Vitex L. 272.

Walsura RXB 86.

Webera SCHREB. 206.

Weinmannia L. 158.

Wendlandia BARTL. 205.

Wightia 182.

Wormia ROXB. 1.

Wrightia BROWN. 250, 261.

Xanthophyllum ROXB. 21.

Xanthophyllum spec. 302.

Xerospermum BL. 105.

Xylocarpus A. JUSS. 87.

Xylosma 16.

Zanthoxylum L. 65; 94.

Zizyphus JUSS. 94.

INDEX

DER

INLANDSCHE EN HOLLANDSCHE NAMEN. (1)

Abeul, md. 64.
 Aboeh, md. 185.
 Abrikozen, holl. 154.
 Advokaatboom, holl. 284.
 Ambal, j. 265.
 Amboeloe, j. 329.
 Ampbeuloeh, md. 80.
 Ampèlas-bawang, j. 329.
 Ampèrè, md. 329.
 Ampèt, j. 22.
 Amproe, s. 248.
 Amproe-badak, s. 248, 249.
 Ande-ande, j. 305.
 Ande-andean, j. 305.
 Anggâ, j. 355.
 Anggâ-tal, j. 355.
 Angin-angin, j. 169.
 Anggring, j. 326.
 Angrit, s. 203.
 Anggroeng, j. 325.
 Angkoep-angkoep, j. 61.
 Angkoep-sèkar, j. 358.
 Angkhroeng, md. 325.
 Angsana, s. 127.
 Anjavar, j. 350.
 ? Antâbogâ, j. 132.
 Antap, j. 45.
 Antjar, j. 330.

Antoe-laoet, j. 229.
 Apah-apah, j. 329.
 Apèh-apèh, md. 274.
 Apèn-apèn, j. 314.
 Api-api, j. ml. 274.
 Apit, j. 209.
 Apokat, ml. 284.
 Appelen, holl. 154.
 Arah, md. 329.
 Arèn, j. s. 357.
 Arèng-arèngan, j. 320.
 Arès, j. 276.
 Asèm, j. md. ml. 148.
 Asèm-krandji, j. 148, 133.
 Asèm-lândâ, j. 148.
 Asèm-landi, j. 148.
 Asëum, s. 148.
 Assam-thee-boom, holl. 35.
 Atjëm, md. 148.
 Awal, j. 64.
 Awar-awar, j. 329.
 Awi, s. 364.
 Awi-andòng-gòmbòng, s. 364.
 Awi-ajèr, s. 364.
 Awi-andòng-lèa, s. 364.
 Awi-atër, s. 364.
 Awi-awoer, s. 364.
 Awi-bangkònòl, s. 364.

(1) md. = madoereesch; holl. = hollandsch; j. = javaansch; s. = soendaneesch;
 ml. = malcisch; boeg. = bogineesch.

Awi-bitoeng, s. 364.
 Awi-boeloe, s. 364.
 Awi-boenar, s. 364.
 Awi-haoer, s. 364.
 Awi-haoer-geulis, s. 364.
 Awi-hideung, s. 364.
 Awi-kasap, s. 364.
 Awi-koening, s. 364.
 Awi-lèngka, s. 364.
 Awi-majang, s. 364.
 Awi-tali, s. 364.
 Awi-tamias, s. 364.
 Awi-tjangkètèk, s. 364.
 Awi-tjina, s. 364.
 Awi-toetoel, s. 364.
 Babakòan, s. 257.
 Babasaran, j, ml. s. 338.
 Badjoer, md. 51.
 Badoer, s. 358.
 Badoet, j. 229.
 Bagoe, j. 344.
 Bagòr, j. 344.
 Bajoer, s. j. 51.
 Bako-bako, ml. 160.
 Balang, j. 51.
 Balang-pasir, j. 47.
 Baloen-indjoek, s. 229.
 Baloeng, j. 235; 184; 247.
 Balòng, j. 184.
 Bamboe, ml. 364.
 Bandjè, j. 170.
 Bangkòng, j. 129.
 Bangsoel md. 83.
 Bantjèt, j. 111.
 Baralak, s. 358.
 Bareubeu-kakali s. 226.
 Baroendaj, s. 14.
 Baròs, j. s. 5; 4.
 Batòk, j. 358.
 Batòk, s. 358.
 Bawang, j. ml. s. 115.
 Bèkak, j. 255.

Bèkèl, j. 128.
 Bèlè-kètèbèh, s. 60.
 Bèmbèm, s. 115.
 Bèndā, j. 332.
 Bèndā-loeloep, j. 332.
 Bèndā-wingkā, j. 332.
 Bèngang, s. 43, 230.
 Bèngèr, s. 179.
 Bèngkak, s. 283.
 Bèntaòs, s. j. 250.
 Bèntaleus, s. 250.
 Bèntjoeloek, j. 134.
 Benzoëboom, holl. 239.
 Bèrgèdat, j. 329.
 Bèrkètèpoek, j. 311.
 Bèrnang, s. 75.
 Bèrnoek, s. 266.
 Bèsole, j. 171.
 Bètah, j. 321.
 Bètahan, j. 321.
 Beunjing, s. 329.
 Beurih, s. 45.
 Beuroeh, md. 39.
 Beuroeh-kòpè, md. 39.
 Beuroeh-kheutjheu, md. 39.
 Bibis, j. 329; 234.
 Bibisan, j. 234.
 Bìdara, ml. 182; 94.
 Bidara-laoet, ml. 94.
 Bidji, j. 350.
 Bidjoeh, md. 74.
 Bigboel, s. 272.
 Bileu, md. 70.
 Bilis, md. 203.
 Bimbing, j. 350.
 Binar, s. 270.
 Binèng, md. 45.
 Binòng-laoet, s. 283.
 Bintaòs, s. 250.
 Bintaos-laoet, s. 321.
 Bintarò, s. 242.
 Bintaro, j. ml. 242.

- Bintorò-gěde, s. 242.
Bintarò-leutik, s. 242.
Bintinoe, s. 52.
Binoeng, md. 187.
Bisòrò, s. 329.
Bisnòh, md. 52.
Blāndā, j. 276.
Blarak, j. 358.
Blēkētoepoek, j. 311.
Blēndoeng, s. 255.
Blēndoeng-tjai, s. 255.
Bléntjòng, j. 53.
Blimbing, j. s. 62.
Blimbing-alas, j. 62.
Blimbing-lingir, j. 62.
Blimbing-manis, j. 63.
Blimbing-woeloeh, j. 62.
Bloeloek, j. 358.
Bloengkang, j. 358.
Boeaja, j. 95.
Boeděng, j. 234.
Boelang, j. 270.
Boeloe, j. 329.
Boeloe, md. 30.
Boeloe-āngkā, j. 332.
Boeloe-baloeng, j. 330.
Boeloe-noenggoel, s. 60.
Boengboelang, s. 270; 206.
Boengboelang-peutjang, s. 206.
Boengboenēlan, s. 132.
Boenglang, j. 270.
Boengoer, s. 179.
Boengòr, md. 179.
Boerahòl, s. 7.
Boernèh, md. 323.
Boeroe, md. 282.
Boeroeh-bibis, md. 282.
Boeroeh-kheutjheuh, md. 282.
Boeroeh-kònèng, md. 282.
Boeroe-mèra, md. 282.
Boeroe-pòtèh, md. 282.
Boeta-boeta, ml. 321.
Boetoen, j. s. 171.
Boewah-nona, s. 12.
Bogēm, j. s. 182, 261.
Bogēm-goenoeng, j. 262; 182.
Bògòh, j. 16.
Bolang, j. 270.
Bòtòran, j. 318.
Brabo, j. 256.
Brāmā, j. 235.
Brandnetelboom, holl. 333.
Brasan, j. 268; 212; 316.
Brēkat-ipèh, j. 329.
Bringèn, md. 329.
Dadap, s. ml. 124; Dadap, j. 124.
Dadap-ajam, j. 124.
Dadap-bēnēr, s. 124.
Dadap-doeri, ml. 124.
Dadap-kēbon, kòpi, ml. 124.
Dadap-laoet, j. 124.
Dadap-lēngā, j. 124.
Dadap-lisa, j. 124.
Dadap-rangrang, s. 124.
Dadap-ri, j. 124.
Dadap-sērep, j. 124.
Dadap-solo, ml. 124.
Dadap-tandoek, j. 124.
Dadap-tjangkring, j. s. 124.
Dadap-tjangkring, s. 124.
Dadap-tjoetjoek, s. 124.
Dali, j. 265.
Dammar, ml. 346.
Dammara, holl. 346.
Damaran, j. 158.
Dangdeur, s. 41.
Dangdeur-leuweung, s. 41.
Dangoe, j. 357.
Daœ, s. 76.
Dārā, j. 94.
Dawēgan, j. 358.
Dawòlang, s. 320.
Dawòlang, j. 320.
Dědēk, j. 221.

Dégan, j. 358.
Dègèl, s. 138.
Dëlèg, j. 194; 191.
Dëlèr, j. 229.
Dëlina, ml. 183.
Dëling, j. 364.
Dëling-apoes, j. 364.
Dëlingsëm, j. 185.
Dëloewak, j. 56; 184.
Dëmpoel, j. 300.
Dëmpoel-watoe, j. 300.
Dëmpoel-lëlèt, j. 300.
? Dërmâlâ, j. 36.
Dërwâlâ, j. 320.
Dèwi, ml. 148.
Divi-divi, holl. 148.
Djabòn, j. 203.
Djadjang, j. 364.
Djadjang-ampèl, j. 364.
Djadjang-bènèl, j. 364.
Djadjang-bètoeng, j. 364.
Djadjang-gading, j. 364.
Djadjang-òri, j. 364.
Djadjang-pring, j. 364.
Djadjang-sërit, j. 364.
Djadjang-woeloeh, j. 364.
Djâhâ, j. 164.
Djaha, s. 164.
Djâkling-soekoen, j. 164.
Djâlawé, j. 164.
Djalitri, s. 250.
Djaloepang, s. 57.
Djâmbâ, j. 87.
Djambe, j. 349.
Djamblang, j. 170.
Djamboe, j. ml. s. 170; 173.
Djamboe-ajër, ml. 173.
Djamboe-bidji, s. 173.
Djamboe-bòl, ml. 173.
Djamboe-kloetoeck, j. 173.
Djamboe-kloetoeck, ml. 173.
Djamboe-mete, j. 121.

Djamboe-mònjèt, ml. 121.
Djamboe-pèrtokal, j. 173.
Djamboe-tërsânâ, j. 173.
Djamboe-wèr, j. 173.
Djambòn, j. 170; 244.
Djamoedjoe, s. 345.
Djangkòrang, s. 189; 190.
Djanglòt, j. 10.
Djanitri, j. s. 61.
Djanoer, j. 358.
Djanoer-koening, j. 358.
Djanti, j. 148.
Djarak, j. ml. 323.
Djarak-brâmâ, j. 309.
Djarak-hideung, s. 237.
Djarak-pagër, j. 323.
Djarak-paçi, j. 319.
Djarak-paçi-gède, j. 319.
Djarak-tjinâ, j. 323.
Djarak-tjina, ml. j. 323.
Djaran, j. 201, 191.
Djaran-pèlòk, j. 264.
Djati, j. s. ml. 269.
Djati-blanda, ml. s. 54.
Djati-dòrèng, j. 269.
Djati-gèmbòl, j. 269.
Djati-kapas, s. 269.
Djati-kaipoer, j. 269.
Djati-kèjòng, j. 269.
Djati-këmbang, j. 269.
Djati-lândâ, j. 54.
Djatòs-landi, j. 54.
Djati-lëngâ, j. 219.
Djati-leutik, s. 269.
Djati-lisah, j. 269.
Djati-minjak, s. 269.
Djati-ri j. 269.
Djati-soengoe, j. 269.
Djati-tjoetjoek, s. 269.
Djati-wëroet, j. 269.
Djawaj, s. 329.
Djëlïroe, j. 191.

Djembirit, j. 249.
 Djembloek, j. 170.
 Djembloek-krikil, j. 170.
 Djempinā, j. 230.
 Djēnar, j. 67.
 Djēnggòt, s. 231.
 Djēngkòl, s. j. ml. 148.
 Djēngkòt, s. j. 231.
 Djēraka, j. 329.
 Djěring, j. 148.
 Djěroek, j. s. 71.
 Djěroekan, j. 68.
 Djeundjing, s. 145.
 Djeundjing-laoet, s. 148.
 Djingkat, j. 333.
 Djingkòl, s. j. ml. 148.
 Djirag, s. 237.
 Djirak, s. 237.
 Djirak-ēndòg, j. 302.
 Djirak-djāwā, j. 316.
 Djirak-kěbo, j. 316.
 Djirak-sasak, s. 237.
 Djirak-tjèlèng, s. 314.
 Djirak-woelan, j. 314.
 Djirèk, j. 237.
 Djirèk, j. 226.
 Djirèk-woeloeh, s. 237.
 Djoelang, j. 139.
 Djoenti, s. j. 2.
 Djoerang, j. 335.
 Djoewar, j. s. ml. 148.
 Djoewēt, j. 170.
 Djohar, j. s. ml. 148.
 Dlimā, j. 183.
 Dlingsem, j. 185.
 Dlisēm, j. 185.
 Dloewak, j. 56.
 Dloewang, j. 56.
 Dòdòlan, s. 269.
 Doedoek-agoeng, j. 166.
 Doedoek-rajap, j. 166.
 Doek, j. 357.

Doekoe, j. 84.
 Doekoe, ml. 84.
 Doengoen, s. j. 47.
 Doerèn, j. 42.
 Doerènan, j. 83.
 Doerian, ml. 42.
 Doewēt, j. 170.
 Dòk, j. 45.
 Dòlòg, s. j. 58.
 Dòmptjòng, j. 170.
 Drědjěg, j. 305.
 Drègèl, j. 1.
 Dròwak, s. 56.
 Echt-santal-hout, holl. 288.
 Èhing, j. 132.
 Èndjit-ēndjitan, j. 252.
 Èndòg-ēndògan, j. 302, 322.
 Èntoet-ēntoetan, s. 219.
 Èrang, s. 351.
 Èsti, j. 185.
 Flamme-boyant, holl. 148.
 Gaboes, j. 190.
 Gaboesan, s. 247.
 Gadoeng, j. 270.
 Gadoengan, j. 270.
 Gadòk, s. 303.
 Gajam, j. 148.
 Galar, j. 368.
 Galih-asēm, j. 148.
 Galeuh, s. 148.
 Galoempit, s. j. 46.
 Gambiran, j. 268, 329.
 Gambir oetan, ml. 320.
 Gāndārijā, j. 117.
 Gandarija, s. 117.
 Ganđoel, j. 186.
 Ganggangan, j. 187.
 Ganitri, j. 61.
 Garoe, s. 286.
 Garoe-hideung, s. 286.
 Garoe-kapas, s. 286.
 Gěbang, j. 353.

- Gëdali, j. 265.
 Gëdang, s. 276, 186.
 Gëdang, j. 186, 276.
 Gëdat, j. 329.
 Gëdawoeng, j. 141.
 Gëdrëg, j. 165.
 Gëdrëg-idjo, j. 312.
 Gëdrëg-poetih, j. 312.
 Gëlam, s. 170.
 Gëlam-boe-oet, s. 170.
 Gëloegā, j. 19.
 Gëmbirit, j. 249.
 Gëmblak, j. 229.
 Gëmboelang, j. 270.
 Gëmoetoe, ml. 357.
 Gëmpoer, j. 282.
 Gëmpòl, j. 202.
 Gëmpòl-këtèk, s. 203.
 Gëndiwoeng, j. 351.
 Gëndoeroe, j. 352.
 Gëntclan, s. 235.
 Gëntilëng, j. 272.
 Gëntoengan, j. 303.
 Gësing, j. 150.
 Gëtah, j. 321.
 Gëtasan, j. 114.
 Gintoengan, j. 303.
 Girang, j. 95.
 Glëdòg-pantò, s. 23.
 Glinggëm, j. 19.
 Glintoeng, j. s. 303.
 Gintoengan, j. md. 303.
 Glitri, md. 61.
 Gloegā, j. 19.
 Gloegoe, j. 358, 338.
 Goedehan, j. 252.
 Goenggrang, j. 190.
 Goetihan, j. 252.
 Gòmpòng, j. s, 194, 113.
 Gòndang, j. 329.
 Gòndang-idjo, j. 329.
 Gòndang-kasèh, j. 329.
 Gòndang-tjarat, j. 329.
 Gorang, j. 189; 190.
 Gòwòk, j. 170.
 Grawang, s. 230.
 Gringging, j. 78.
 Hagël, j. 353.
 Hagël-gëbang, j. 353.
 Hahawoean, s. 61.
 Hambiroeng, s. 221.
 Hambiroeng-beureun, s. 221.
 Hamèrang, s. 329.
 Hamèrang-leutik, s. 329.
 Hamèrang-minjak, s. 329.
 Handòng, s. 53.
 Handja, s. 203.
 Handoel, j. 61.
 Handjoewang, s. 348.
 Handjoewang-kasintòk, s. 348.
 Hantap, s. 45.
 Hantap-dapoeng, s. 45.
 Hantap-heulang, s. 45.
 Hapit, s. 209.
 Harëmëng, s. 22.
 Harèndòng, s. 177.
 Harikoekoën, s. 59.
 Haringin, s. 132.
 Haroeman, s. 145.
 Haroepat, s. 357.
 Hawal, j. 64.
 Hawoean, s. 61.
 Hëas, s. 272.
 Heuras, s. 272.
 Heutjip, s. 322; 306.
 Hing, j. 132.
 Hiroeng, s. 200.
 Hoeni, j, s. 323; 305.
 Hoeroe, s. 304, 240, 61, 278, 109, 282.
 Hoeroe batoe, s. 282.
 Hoeroe-bëas, s. 282.
 Hoeroe-bòdas, s. 282.
 Hoeroe-dapoeng, s. 282.

Hoeroe-djamoer, s. 282.
Hoeroe-gading, s. 282.
Hoeroe-gambir, s. 282.
Hoeroe-hiris, s. 282.
Hoeroe-kadantja, s. 282.
Hoeroe-kamplong, s. 282.
Hoeroe-katjang, s. 282.
Hoeroe-kěmandjél, s. 33.
Hoeroe-kònèng, s. 282.
Hoeroe-leuksa s. 282.
Hoeroe-leueur 282.
Hoeroe-madang, s. 282.
Hoeroe-mangga, s. 282.
Hoeroe-manglit, s. 282.
Hoeroe-měumal, s. 282.
Hoeroe-mèntèk, s. 282.
Hoeroe-mèrang, s. 282.
Hoeroe-minjak, s. 282.
Hoeroe-pajoeng, s. 282.
Hoeroe-sapoe, s. 282.
Hoeroe-sintòk, s. 282.
Hoeroe-talès, s. 282.
Hoeroe-tandoek, s. 282.
Hoeroe-tangkalak, s. 282.
Hoeroe-tèdjò, s. 282.
Hoeroe-tjabe s. 282.
Hoeroe-tjěmpaka, s. 282.
Hoeroe-toembilan, s. 282.
Hoeroe-toendoeng, s. 282.
Hòndjè, j. 20.
Ilat-ilat, j. 329.
Ilat-ilatan, j. 247, 329.
Imër, j. 299, 322.
Indjoek, s. 357.
Ingas, j. 120, 116.
Ingas-kapoer, j. 120.
Ingas-kěbo, j. 120.
Ipis-koelit, s. 175, 169.
Ingas-těmbāgā, j. 116.
Ingas-tělik, j. 120, 116.
Javaansch Edelweis, holl. 222.
Kadjěng-pisang, j. 276.

Kadjěng-rah, j. 278.
Kadjěng-sěkar, j. 8.
Kadjěng-siti j. 65.
Kadjoe-aboe, md. 185.
Kadjoe-kěmpheung, md. 4.
Kadjoe-khětheuñg, md. 241; 276.
Kadjoe-lanang, md. 157.
Kadjoe-tjheureun, md. 113; 121.
Kadoe, j. s. 229, 42.
Kadoet, j. 229.
Kajoe-arěng, s. 235.
Kajoe-běsi j. 110.
Kajoe-bidara-laoet, ml. 94.
Kajoe-boeaja j. 95.
Kajoe-boeta-boeta, ml. 321.
Kajoe-djaran, j. 121, 113, 264.
Kajoe-gaboes, s. 182.
Kajoe-garoe, s. 285.
Kajoe-gědang, j. 276.
Kajoe-gloegoe, j. 338.
Kajoe-kěmbang, j. 4.
Kajoe-kidang, j. 241.
Kajoe-lanang, j. 263.
Kajoe-langit, j. 191.
Kajoe-lěgè, j. 345.
Kajoe-lěmah, j. 65.
Kajoe-oerip, j. 323.
Kajoe-pari, j. 300.
Kajoe-poetih, ml. j. 173.
Kajoe-poetih-lěmboet, s. 167.
Kajoe-sapi, j. 107.
Kajoe-tai, ml, s. 324.
Kajoe-taoen, j. 345.
Kajoe-teròng, j. 253.
Kajoe-tjoeměti, j. 340.
Kajoe-toewa, j. 95.
Kakadoeän, s. 278, 231.
Kaki, holl. 236.
Kalak, md. j. 11, 9.
Kalak-babal, j. 9.
Kalah-gědang, j. 9.
Kalak-koenjit, j. 9.

Kalak-prit, j. 9.
Kalang-bibing, md. 329.
Kalang-mangkheuh, md. 20, 253.
Kalapa, s. 358.
Kalëmaeng, md. 300.
Kaliki-bantën, s. 310.
Kalimòrèt, s. 343.
Kalipápā, j. 339.
Kalòng, j. 45.
Kalongan, j. 45.
Kampak, s. 283.
Kandaj, s. 159.
Kandar loetoeng, s. 18.
Kananga, s. 8.
Kanarèh, md. 77, 76.
Kanari, j. ml. s. 77, 76.
Kanari alas, j. 76.
Kanari-wānā, j. 76.
Kandri, j. 290.
Kanjèrè, s. 290.
Kanjèrè-badak, s. 290.
Kanjèrè-laoet, s. 290, 123.
Kanjèrè-leutik, s. 290.
Kantil, j. 6.
Kantil-alas, j. 4.
Kantil-wānā, j. 4.
Kapasas, j. 314.
Kapinangò, s. 80.
Kapoelasan, s. 112.
Kapoendoeng, s. 323.
Kapoerantjak, j. 25, 24.
Kapoerantjang, s. 25.
Kapotrèn, md. 80.
Karèt, s. 329.
Kar-pòtè, md. 265.
Kareumbi, s. 319.
Kasang, md. 342.
Kasimboean, s. 219.
Kasra, s. 231.
Katëng, j. s. 140.
Katès, j. md. 186.
Katès-gamplòk, j. 186.

Katès-gantoeng, j. 186.
Katès-kapoer, j. 186.
Katilajoe, j. 97.
Katimoeroe, j. 314.
Katoelampak, s. 61.
Katoempang, s. 268.
Katòs, j. 75.
Kawang, j. 230.
Kawistā, j. 69.
Kawistā-krikil, j. 69.
Kawo, j. 220.
Kawoel, j. 357.
Kawoeng, s. 357.
Kawòjang, s. 152.
Kawòrò, s. 310.
Këbak, j. 329.
Këbëk, j. 329.
Këbëk-bèrang, j. 329.
Këbëk-poetih, j. 329.
Këbëntèr, j. 336.
Këdalèn, j. 163.
Këdali, j. 265.
Këdinding, j. 145.
Këdòe, j. md. 229, 42.
Këdojā, j. 80.
Këdòja, s. 80.
Këdòndòng, j. 118.
Këdòndòng, s. ml. 121, 118.
Këlòr, j. ml. 149.
Kèloran, j. 235.
Këmadòe, j. 333.
Këmadòe-këbo, j. 333.
Këmadòe-këdang, md. 333.
Këmadòe-kidang, j. 333.
Këmadòe-kòdòk, md. 333.
Këmadòe-sapi, j. 333.
Këmathoek, md. 333.
Këmathoek-kètheug, md. 333.
Këmbang, j. 8.
Këmbang-dèdès, s. ml. 137.
Këmbang-spatoe, s. j. ml. 44.
Këmbirit, j. 249.

- Kěmbodja, s. j. ml. 252.
Kěmandèn, j. 15.
Kěmang, s. j. 115.
Kěmēdjing, j. 218; 23.
Kěmèrèh, md. 308.
Kěmēsòe, j. 61.
Kěmēsòh, md. 61.
Kěmirèn, j. 283; 308.
Kěmiri, j. 308.
Kěmiri-sěpět, s. 310.
Kěmiri-tjina, ml. 283.
Kěmit, j. 229.
Kěmlākā, j. 298.
Kěmlaka, j. 298.
Kěmlāḍingan, j. ml. 148; 145.
Kěmlāḍingan-goenoeng, j. 145.
Kěmoedoe, j. 220, 213.
Kěmoēḍoeng, j. 306.
Kěmoening, j. s. 67.
Kěmònèng, md. 67.
Kěmontheung, md. 306.
Kěmpheung, md. 4.
Kěmpheung-kheunhing, md. 6.
Kěmpheung-tjheuh, md. 4.
Kěnah, md. 220.
Kěnāṅgā, j. 8.
Kěnangah, md. 8.
Kěnarèh, md. 76.
Kěnarèn, j. 76.
Kěnari, j, s, ml. 76.
Kěṇdal, j. 256; 255.
Kěndal, s. 255.
Kěṇdal-banjoe, j. 256.
Kěṇdajakan, j. 134.
Kěṇdang, j. 285.
Kěṇdoeng, j. 285.
Kěṇdoeng, s. 285.
Kěntjoeran, j. 13.
Kěpēl, j. 7; 140.
Kěpoeh, j. 45.
Kěpoendoeng, j. 306; 323.
Kěpoendoeng, s. ml. 323.
Kěpòh, j. s. 45.
Kěrtaoe, s. 329; 332.
Kěрто, s. 332.
Kěsambi, j. s. 101.
Kěsamphih, md. 101.
Kěsēmak, j. 235.
Kěsēmēg, j. 235.
Kěsoembā, j. 19.
Kěsoembā-kling, j. 19.
Kěsoemba-kling, ml. 19.
Kěsòmpeuh, md. 60.
Kěsòmpeuh-kling, md. 60.
Kětangi, j. 179.
Kětapang, j. md. ml. 164.
Kětapang-laoet, ml. 164.
Kětēlā-gantoeng, j. 186.
Kět̃heuboeng, md. 141.
Kět̃hoedjeuh, md. 80.
Kět̃hoch, md. 229.
Kět̃heung, md. 241.
Kět̃ilēng, j. 272.
Kět̃imā, j. 50.
Kět̃imāhā, j. 50.
Kět̃imaha, s. 50.
Kět̃imāṅgā, j. 50.
Kět̃japi, j. 82, 107.
Kět̃jik, j. 229.
Kět̃jipiran, j. 65.
Kět̃ocpoek, j. 311.
Kětòs, j. 75.
Khenthoeroch, md. 352.
Khětah, md. 231.
Khět̃heung, md. 276.
Kheureung, md. 64.
Khěuroch, md. 80.
Khireung, md. 95.
Khoeleuh, md. 80.
Khloempang, md. 45.
Khoentheung, md. 329.
Ki-adjag, s. 226.
Ki-amis, s. 282.
Ki-anjèrè, s. 290.

Ki-angir, s. 102.
Kiara, j. 329.
Kiara-bèas, s. 329.
Kiara-boenoet, s. 329.
Kiara-djingkang, s. 329.
Kiara-gambir, s. 329.
Kiara-gède, s. 329.
Kiara-rambaj, s. 329.
Kiara-tapòk, s. 329.
Ki-badak, s. 109; 152.
Ki-bajawak, s. 64.
Ki-bakò, s. 257; 256.
Ki-banèn, s. 180.
Ki-bangbara, s. 272.
Ki-bangkòng, s. 111.
Ki-bantjèt, s. 111.
Ki-bawang, s. 80.
Ki-běngang, s. 230.
Ki-běntěli, s. 251.
? Ki-bèwòk, s. 201.
Ki-beunteur, s. 336; 338; 334.
Ki-beureum, s. 88.
Ki-beusi, s. 175; 168.
Ki-bima, s. 345.
Ki-boaja, s. 95.
Ki-boeloe, s. 327.
Ki-bòdas, s. 185.
Ki-bòlět, s. 240.
Ki-bòntěng, s. 184.
Ki-dada, s. 182.
Ki-damar, 226.
Kidang, j. 241.
Ki-djadjawaj, s. 329.
Ki-djaj, s. 309.
Ki-djambè, s. 168.
Ki-djangkòrang, s. 189; 194.
Ki-djaran, s. 264.
Ki-djěboek, s. 175.
Ki-djěroek, s. 68.
Ki-djěroek-laoet, s. 318.
Ki-djeunghil, s. 324.
Ki-djirak, s. 237.

Ki-djoelang, s. 135.
Ki-ěndòg, s. 21.
Ki-gěgoela, s. 80.
Ki-gěntěl, s. 235.
Ki-glědòg, s. 237.
Ki-hadès, s. 345.
Ki-hadji, s. 80.
Ki-hapit, s. 209.
Ki-harěndòng, s. 174.
Ki-harěpang, s. 314.
Ki-haroepat, s. 226; 240.
Ki-hiang, s. 145.
Ki-hioer, s. 343.
Ki-hòè, s. 99.
Ki-hoedjan, s. 339.
Ki-hoeöet, s. 300.
Ki-hoerang, s. 238.
Ki-hòndjè, s. 20.
Ki-kadantja, s. 282.
Ki-kanari, s. 76.
Ki-kangka, s. 218.
Ki-kantěh, s. 329.
Ki-katjang, s. 89; 218.
Ki-katjang-batoe, s. 218.
Ki-kěpěr, s. 339.
Ki-kěrtas, s. 300.
Ki-keujeup, s. 201.
Ki-koekoeran, s. 201; 163; 226.
Ki-kòněng, s. 329.
Ki-kòpi, s. 245; 218; 217.
Ki-laban-gède, s. 272.
Ki-laka, s. 278.
Ki-lakětan, s. 228.
Ki-lalajoe, s. 97.
Ki-lěhò, s. 30.
Ki-lěhò-badak, s. 30.
Ki-lěhò-beureum, s. 30.
Ki-lěhò-boeloe, s. 30.
Ki-lěmòh, s. 282.
Ki-lilin, j. 345.
Ki-loetoeng, s. 18.
Ki-malakian, s. 323.

Ki-malèla, s. 345.
 Ki-mandjèl, s. 33.
 Ki-matjan, s. 46.
 Ki-mërak, s. 235; 345.
 Ki-mèòng, s. 46; 55; 164; 314.
 Ki-mòkla, s. 278.
 Kina, ml. j. s. holl. 220.
 Ki-njirih, s. 87.
 Ki-oerang, s. 224.
 Ki-òraj, s. 53; 61; 39.
 Ki-padali, s. 265.
 Ki-pahang, s. 270.
 Ki-pahang-gède, s. 270.
 Ki-pahang-goenoeng, s. 201.
 Ki-pajoeng, s. 282.
 Ki-palahlar, s. 157.
 Ki-pangsòr, s. 329.
 Ki-pantjar, s. 345.
 Ki-parè, s. 115; 300.
 Ki-paraj, s. 338.
 Ki-pèdès, s. 11; 282.
 Ki-piit, s. 224.
 Ki-pinang, s. 184.
 Ki-pòdò-landak, s. 157.
 Ki-pòèk, s. 146.
 Ki-poetri, s. 345.
 Ki-pòlèng, s. 46.
 Kiraj, s. 357.
 Ki-rawaj, s. 312.
 Ki-rëmèng, s. 22.
 Ki-rësëp, s. 226.
 Kiringan, j. 278.
 Ki-rioeng, s. 343.
 Ki-ròtan, s. 341.
 Ki-sabrang, s. 273.
 Ki-salira, s. 68.
 Ki-sampang, s. 64.
 Ki-saoehoen, s. 11.
 Ki-sè-èl, s. 345.
 Ki-sègèl, s. 1.
 Ki-sèkèl, s. 92.
 Ki-sèrèh, s. 282.

Ki-seu-eur, s. 305.
 Ki-sindoeck, s. 55.
 Ki-sireum, s. 170; 169.
 Ki-soengit, s. 270.
 Ki-soerèn, s. 339.
 Ki-sòhang, s. 329.
 Ki-taleus, s. 282.
 Ki-tamiang, s. 324.
 Ki-tanah, s. 65.
 Ki-tandoek, s. 206.
 Ki-tangkil, s. 344.
 Ki-taneuh, s. 65.
 Ki-tèdja, s. 282.
 Ki-tèdja minjak, s. 304.
 Ki-tèmbaga, s. 170.
 Ki-tèndjò, s. 199.
 Ki-tèròng, s. 184.
 Ki-tèròng-gèdé, s. 256.
 Ki-tiwoe, s. 113.
 Ki-tjaät, s. 329.
 Ki-tjabè, s. 157.
 Ki-tjaloeng, s. 235.
 Ki-tjaloeng-mas, s. 235.
 Ki-tjëmara, s. 345.
 Ki-tjamoen, s. 312.
 Ki-tjangkoedoe, s. 212.
 Ki-tjaoe, s. 276.
 Ki-tjareuh, s. 53; 198.
 Ki-tjareulang, s. 278.
 Ki-tjarirang, s. 80.
 Ki-tjèrmè, s. 158.
 Ki-tjeuri, s. 23.
 Ki-tjiat, s. 329.
 Ki-toewak, s. 76.
 Ki-tòkè, s. 145.
 Ki-tòngòh, s. 337.
 Klajoe, j. 97.
 Klalar, j. 36.
 Klampejan, j. 203.
 Klampis, j. 144.
 Klampòk-watoe, j. 170.
 Klâpâ, j. 358.

- Klapa, s. ml. 358.
 Klapan, j. 278.
 Klāpā-sara, j. 356.
 Klapa-sara, s. 356.
 Klapa-tjoeng, s. j. 278.
 Klèdoeng, j. 13.
 Klegā, j. 235.
 Klēpoe, j. 203.
 Klēpoe-kětèk, j. 203.
 Klēpoe-pasir, j. 203.
 Klēpoe-sopi, j. 204.
 Klethoeng, md. 13.
 Klimāsādā, j. 255.
 Kaneelboom, holl. 284.
 Klimāsāwā, j. 339.
 Klingsēm, j. 185.
 Klis, j. 170.
 Klòboer, md. 132.
 Khloempang, md. 45.
 Kloempit, j. 46; 164.
 Kloewak, s. j. 17.
 Kloewih, j. 338.
 Klòhòr, j. 132.
 Klòmprit, j. 164.
 Klòntjing, j. 118.
 Klòpòjan, md. 203.
 Koeda-koeda, ml. 121.
 Koedoe-kras, j. 213.
 Koejam, j. 312.
 Koejang, s. 329.
 Koekoeran, j. 163.
 Koendang, s. 329.
 Koeniran, j. 198.
 Koepa-landak, s. 16.
 Koeraj, s. 325.
 Koffie, holl. 220.
 Kojam, j. 312.
 Kòkap, md. 332.
 Kòkòn, md. 59.
 Kolang-kaling, j. 357.
 Kolang-kaling-dòngkòl, j. 235.
 Kolèk-labeung, md. 317.
 Kòlòr, md. 338.
 Kòlpòjan, md. 203.
 Kòlpòk, md. 203.
 Kòlpòh-kětèk, md. 203.
 Kòndang, s. 329.
 Kòndang-lèlès, s. 329.
 Konjam, j. 305.
 Konjam-pasir, j. 305.
 Konjingal, md. 192.
 Kool-banda, ml. 277.
 Kool-blanda, ml. 277.
 Kopèn, j. 218.
 Kòpèng, j. 329.
 Kopi, ml. j. s. md. 220.
 Kòpò, s. 170.
 Kòpò-landak, s. 16.
 Kòpò-lalaj, s. 170.
 Kòt, j. 143.
 Kowang, j. 329.
 Krambil, j. 358.
 Krandji, j. s. 129.
 Krangèjan, j. 282.
 Krasak, j. md. 329.
 Krēm̃bi, s, j. 319.
 Krèsèk, j. 110.
 Krisig, j. 110.
 Krisik, j. 110.
 Kròngròng, md. 329.
 Kroton, holl. ml. 323.
 Kwèni, j. s. 115.
 Laban, j. s. 272.
 Laban-bernang, j. 272.
 Laban-kapoer, j. 272.
 Laban-kět̃ilèng, j. 272.
 Laban-koenjit, j. 272.
 Laban-soengoe, j. 272.
 Laban-tandoek, j. 272.
 Lādā, j. 329.
 Lagoend̃i, s. j. 272.
 Lahang, s. 357.
 Lamè, s. 242.
 Lambileung, md. 329.

- Lamèr, j. 300.
Lamtârâ, j. 148.
Lanang, j. 263.
Landak, md. 290.
Landji, j. 59.
Langaj, md. 144.
Langit, j. 194.
Langkaupheudjeuh, md. 95.
Langkap, j, s. 357.
Langsat, j. 84.
Langsat-loetoeng, j. 80.
Langsëp, j. 84.
Lat-ilatan, j. 329.
Latëng, j. 333.
Latëng-goenoeng, j. 333.
Latëng-këbo, j. 333.
Latëng-kidang, j. 333.
Latëng-sapi, j. 333.
Lawas, j. 301.
Lawe, j. 334.
Lëgarang, j. 247.
Lëgèn, j. 357.
Lëgoendi, s. j. 272
Lèlès, s. 329.
Lëmbidji, j. 350.
Lëpën, md. 272.
Lëmpëni, j. s. 226.
Lëmpir, j. 300.
Lëngën, s. 357.
Lëngki, j. 95.
Lëngsar, j. 107.
Lëpën, md. 272.
Leprak, j. 171.
Lèprak, md. 309.
Lèr-kambing, j. 248.
Lèr-kamphing, md. 249.
Lërak, j. ml. 96.
Lërëk, j. 96.
Lëtjës, j. 329.
Leungsir s. 107.
Lidi, ml. 358.
Likoekoen, j. 59.
Lilin-gòndang, s, j. 329.
Lilin-hamèrang, s. 329.
Limoës, s. 115.
Lindòr, j. 161; 160.
Lirang, j. 357.
Lo, j. 329.
Lobi-lobi, ml. 19.
Loeloep-bagoe, j. 344.
Loeng-loeng, s. 357.
Loetoeng, j. 234.
Loewing, j. 329.
Logarang, j. 247.
Lòh, j. 329.
Lòh-gambing, j. 248.
Lòh-kheureung, md. 64.
Lolohan, j. 80.
Lotjari, j. 6.
Lòtòng, md. 83.
Lòtròk, j. 205.
Lòwa, s. 329.
Madang, ml. 282.
Mâdjâ, j. 70.
Madja, s. ml. 70.
Mala, s. 159.
Malëngan, md. 321.
Mamplëm, s. 115.
Manès-tjheungan, md. 282.
Mangar, md. 50.
Mangèr, md. 102.
Mangga, s. ml. 115.
Mangga-bapang, s. ml. 115.
Mangga-batjang, ml. 115.
Mangga-bëngala, ml. 115.
Mangga-daging, s. ml. 115.
Mangga-dòdòl, ml. 115.
Mangga-gèpèng, s. 115.
Mangga-këmbëmbëm, ml. 115.
Mangga-kétjipèt, ml. 115.
Mangga-klapa, s. 115.
Mangga-kwèni, ml. 115.
Mangga-oebi, ml. 115.
Mangga-oedang, ml. 115.

- Mangga-pari, s. 115.
Mangga-santèn, ml. 115.
Mangga-sèngir, s. 115.
Mangga-sèngir-gadoeng, ml. 115.
Mangga-tjèngkir, s. 115.
Mangga-wangi, ml. 115.
Manggar, j. 358.
Manggis, j. 23.
Manggistan, ml. 23.
Manggoe, s. 23.
Manggoe-leuweung, s. 23.
Mangir, j. 146; 102.
Manirèh, j. 87.
Manis-djangan, s. 282.
Manis-rédjā, j. 223.
Mangkoan, j. 340.
Manglèh, md. 4.
Mangli, j. 4.
Manglit, s. 5; 4.
Manting, j. 170.
Mantjoeng, j. 358.
Mara, s. 315; 313.
Mara-benreum, s. 315.
Mara-leutik, s. 315.
Mara-leuweung, s. 315.
Marang-nginaang, 80.
Mārāsāwā, j. 339.
Marèhmèh, s. 300.
Marèngpèng, s. 315.
Markalémaran, md. 335.
Maròn, j. 22.
Maròng, j. 22.
Masang, md. 342.
Masang-binèh, md. 342.
Maskèmantèn, md. 148.
Mata-koetjing, s. 130.
Mèdang, ml. s. 282.
Mèdang-batoe, s. 282.
Mèdang-kapas, s. 282.
Mèlākā, j. 298.
Mèlaka, s. 298.
Mèlandiangan, s. 148.
Mèlèlā, j. 345.
Mèlindjo, ml. 344.
Mèndih, md. 78.
Mèmpheuh, md. 79.
Mèněngan, j. 321.
Měngkoedoe, ml. s. 220; 213.
Měnjan, s. ml. 239.
Měnjawak, j. 64.
Měnjawar, j. 349.
Mèmpheuh, md. 79.
Měntaòs, s. j. 250.
Mèntèng, s. 306; 323.
Měntjoegan, j. 337.
Měranken, j. 234; 345.
Měrbò, ml. s. 136.
Měsāwā, j. 339.
? Měsoe, j. 61.
Mimba, j. 79.
Mindi, j. ml. 78.
Minging, j. 132.
Minjan, s. 239.
Miri, j. s. 87; 308.
Mlakah, md. 298.
Mlantjogan, j. 338.
Mlindjo, j. 344.
Mloewā, j. 12.
Moelwā, j. 12.
Moenděr, j. 23.
Moendoe, j. 23.
Moendoe, s. 23.
Moengli, j. 263.
Moenoeug, j. 45.
Moentjang, s. 308.
Mojang, j. 152.
Mranak, j. 342.
Nāgāsari, j. 26; 170.
Nagasari, s. ml. 26.
Namnam, j. 148.
Nanam, j. 148.
Nāngkā, j. 332.
Nangka, s. ml. 332; 338.
Nāngkā-boeboer, j. 338.

Nangka-boeboer, s. 338.
Nangka-blanda, s. 12.
Nangkah, md. 332.
Nangkahan, j. 278; 231.
Nangka-lândâ, j. 12.
Nangka-landi, j. 12.
Nangka-leuweung, s. 332.
Nangka-salah, s. 338.
Nangka-tjangkoewang, s. 338.
Nangka-tjèlèng, j. 338.
Nangsi, s. 335.
Nangpénangan, md. 27.
Narap, j. 80.
Nèrè, md. 87.
Nginging, j. 132.
Njirih, j. 87.
Njamploeng, s. j. 25.
Njamploeng-laki, boeg. 24.
Njampoe, j. 282.
Njampoe-gagang, j. 282.
Njampoe-gòmbòng, j. 282.
Njampoe-gòmbòr, 282.
Njampoe-krikil, j. 282.
Njampoe-tinggi, j. 282.
Njatoe, j. s. 230.
Njatòh, md. 230; 231.
Njèrè, s. 357; 355.
Njirih, j. 87.
Njirih-abang, j. 87.
Njirih-goedik, j. 87.
Njoeroeh, j. 87.
Njòr, md. 358.
Noemi, md. 11.
Nòna, s. 12.
Nòna-leuweung, s. 3.
Notenmuskaat, holl. 279.
Oejah-oejahan, j. 329.
Oekoe-aka, s. 139.
Oenbèl-oembèlan, j. 30.
Oemoet, s. 358.
Oemboet-kawoeng, s. 357.
Oempang, j. 267.

Oerang-oerangan, j. 337.
Oeris-oerisan, j. 56.
Onecht-santal-hout, holl. 289.
Opas-opasan, j. 198.
Opèlan, md. 144.
Padang, j. 314.
Padjang, j. 314.
Padjoeng, md. 282.
Pakèl, j. 115.
Pakem, j. 17.
Pakis, j. 368; 347.
Pakis-adji, j. 347.
Pakis-galar, j. 368.
Pakoe-tihang, s. 368.
Pâlâ, j. 279.
Pala, ml. s. 279.
Palahlar, s. 36.
Palan, j. 314.
Palapah, s. 357; 358.
Pandaan, holl. 359.
Pandan, j. 359.
Pandan, s. 359.
Pandan-laoet, s. 359.
Panggang, s. j. 192; 189.
Panggang-boeloe, s. 192.
Panggang-poejoe, s. 192; 189.
Panggang-sèrèm, s. 192.
Panggang-tjèrmè, s. 189.
Pangsòr, s. 329.
Pantjal-kidang, j. s. 298; 83.
Paò, md. 115.
Paò-gòlèk, md. 115.
Paò-kainèh, md. 115.
Paò-kòlèh, md. 115.
Paò-kòtjòr, md. 115.
Paò-tèlòr, md. 115.
Papah, j. 357; 358.
Papaja, ml. s. 186.
Papasan, j. 314.
Parahlar, s. 36.
Parandji, s. 133.
Parang-dewa, j. 314.

- Parè, s. 115.
 Parèngpèng, s. 336; 315.
 Parèngpèng-kèbo, j. 338.
 Pari, j. 115.
 Pari-koerang, s. 115.
 Pari-manoeck, s. 115.
 Pasang, s. j. 342.
 Pasang-baloeng, j. 342.
 Pasang-batoe, s. 342.
 Pasang-bòdas, s. 342.
 Pasang-djambe, s. 342.
 Pasang-kajang, s. 342.
 Pasang-lawe, j. s. 342.
 Pasang-parèngpèng, s. 342.
 Pasang-tangāgā, j. 342.
 Pasang-tjèlèng, s. 342.
 Paskapasan, j. 314.
 Pasoeng, s. 182.
 Pasoengan j. 315.
 Pasra, s. 231.
 Patjar-goenoeng, j. 223.
 Patjar-koekoe, ml. j. 183.
 Patje, j. ml. 220; 213.
 Pèdali, j. 265.
 Pè-ër, s. 329.
 Pèlèh, md. 328.
 Pèlang, md. 144.
 Pèlangkòngan, md. 335.
 Pèlèm, j. 115.
 Pèlèm-daging, j. 115.
 Pèlèm-kejòng, j. 115.
 Pèlèm-kòpjòr, j. 115.
 Pèlèm-lalidjiwā, j. 115.
 Pèlèm-madoe, j. 115.
 Pèlèmpèni, j. 226.
 Pèlèm-santòk, 115.
 Pèlèm-sèngir, j. 115.
 Pèlèt, j. s. md. 50.
 Pèloes, j. 108.
 Pèlòs, md. 108.
 Pèngang, md. 349.
 Pèndjalinan, j. 99; 314.
 Pénawar, j. 130.
 Pènggoeng, s. j. 171.
 Pèngāh, j. 333.
 Pèrèlèk, s. 235.
 Peren, holl. 154.
 Pèrèng, s. 329.
 Pèrkāsā, j. 309.
 Perzikken, holl. 154.
 Pètag, s. 170.
 Pète-alas, j. 141.
 Pète-wānā, j. 141.
 Pèteuj-tjina, s. 148.
 Pètir, s. 141.
 Pètjari-koening, j. 6.
 Pètjari-poetih, j. 6.
 Peu-eung, s. 143.
 Peuris, s. 303.
 Peusar, s. 332.
 Pheulik-angèn, md. 314.
 Pheuloeng, md. 184.
 Pheungsòl, md. 83.
 Phlimphing, md. 62.
 Phlimphing-boeloe, md. 62.
 Phlimphing-manès, md. 63.
 Phoekòl, md. 94.
 Pikòppjan, md. 83.
 Pilang, j. s. 144.
 Pinang, s. ml. 349; 358.
 Pingkoe, s. 80.
 Pisang, j. ml. 186; 276.
 Pisitan-monjèt, s. 80.
 Pitjisan, j. 203; 340.
 Pitjoeng, s. 17.
 Plalan, j. 314.
 Plalar, j. 36.
 Plāsā, j. 125.
 Plasa, ml. s. 125.
 Plasah, md. 125.
 Plèndo, j. 193.
 Poeki-andjing, ml. s. 148.
 Poele, j. 242; 246.
 Poele-pandak, j. md. 246.

Poeloengan, j. 143.
 Poeloes, s. 333.
 Poeloes-djlatrang, s. 333.
 Poeloetan, j. 276.
 Poendoeng, j. 306.
 Poendoengan, j. 203.
 Poeng, j. 143.
 Poernāmasāda, j. 255.
 Poering, j. 323.
 Poroet, s. j. 332.
 Poerwākā, j. 302.
 Poesar, s. 332.
 Poespa, s. 33; 32.
 Poespa-beureum, s. 32.
 Poespa-bōdas, s. 32.
 Poespa-merang, s. 32.
 Poetat, s. j. 171.
 Poetān, 241.
 Poetjangan, j. 194; 191.
 Poetjoeng, j. 17.
 Poetoet, s. 161.
 Pòh, j. 115.
 Pòlaj, md. 242; 246; 247.
 Polaj-pandak, md. 246.
 Pòndeuj, s. 141.
 Pòndòh, j. 358.
 Pòndòh-arèn, j. 357.
 Pòngpòrang, s. 263.
 Popohan, j. 114.
 Pòpòhan, s. 114.
 Pòr-kapòran, md. 201.
 Pòtèjan, md. 265.
 Pòtrèn, s. 80.
 Prabeus, md. 282.
 Prānā-djiwā, j. 45.
 Pranak, j. 342.
 Prānāmasāda, j. 255.
 Prapat, j. md. ml. 182.
 Pring, j. 360.
 Pruimen, holl. 154.
 Rah, j. 278.
 Ramboetan, j. s. ml. 106.

Ramboetan-atjèh, ml. 112.
 Ramboetan-djāwā, j. 106.
 Ramò-gëntjèl, s. 192.
 Ramò-giling, s. 192; 189.
 Randoe-agoeng, j. 41.
 Randoe-alas, j. 41.
 Randoe-leuweung, s. 41.
 Randoe-wānā, j. 41.
 Raœ, j. 76; 119.
 Raœ-woelan, j. 76.
 Rasamala, s. 159.
 Rasamala-bēnēr, 159.
 Rasamala-beureum, s. 159.
 Rasamala-bōdas, s. 159.
 Rasamala-gadòk, s. 159.
 Rasamala-kapas, s. 159.
 Rasamala-ki-oepi, s. 159.
 Rasamala-taritih, 159.
 Rawan, j. 320.
 Rēdani, j. 88.
 Rēdjāsā, j. 61.
 Regenboom, holl. 148.
 Rēmeme, j. 300.
 Rēmoeng-boetoen, s. 22.
 Rēmplas, j. 329.
 Rèng, md. 145.
 Rēngas, s. 116; 120.
 Rēngas-gēdèpèr, s. 229.
 Rēngas-goenoeng, j. 120.
 Rēsèk, md. 170.
 Rēsiki, j. 4.
 Reusbreusan, md. 231.
 Ribājā, j. 188.
 Rihphendjeuh, md. 188.
 Ringin, j. 329.
 Rioeng-anak, s. 343.
 Risip, j. 170.
 Roejoeng, j. s. 357.
 Roekēm, j. s. md. 16; 15.
 Sādā, j. 358, 357.
 Sadan, j. 28.
 Sadang, j. s. 354.

Sadèng, j. 354.
 Sading, j. 354.
 Sadjèng, j. 76.
 Sago, 355.
 Sagopalm, holl. 358.
 Sahang, j. 192.
 Salam, s. j. 170.
 Salam-andjing, s. 152.
 Salam-watoe, j. 170.
 Sampang, j. 64.
 Samparantoe, s. j. 139; 226.
 Sampora, s. 57.
 Sānā, j. 127.
 Sānā-kembang, j. 127.
 Sānā-ka-poer, j. 126.
 Sānā-king, j. 232; 126.
 Sānā-soengoe, j. 126.
 Sandel-hout, holl. 288.
 Sanintèn, s. 343.
 Santal-hout (echte) holl. 288.
 Santal-hout (onechte) holl. 289.
 Santèn, s. j. 251.
 Saoe, j. 232.
 Sapèh, md. 107.
 Sapi, j. 76; 107.
 Saoe-manila, ml. j. 233.
 Saradan, j. 16.
 Sarahan, j. 192.
 Sarangan, j. 343.
 Sarasati, j. 222.
 Sariawan, s. 237.
 Sarkadjeuk, md. 12.
 Sasag-goenoeng, j. 237.
 Sasah, s. 237.
 Sasak badak, s. 237.
 Sāwā, j. 339.
 Sawoe, j. 232.
 Sawo, j. ml. 232.
 Sawo-djāwā, j. 232.
 Sawo-djawi, j. 232.
 Sawo-goenoeng, j. 231.
 Sawo-manila, ml. j. 233.

Səgawe, j. 142.
 Səkalət, j. 228.
 Səkar, j. 8.
 Səkar pətak 266.
 Səkkeubeuj, md. 142.
 Səlang, j. 83.
 Səlòng, j. 145.
 Səmak, j. 235.
 Səmangkòng, j. 352.
 Səmbir, j. 332.
 Səmbirit, j. 320.
 Səmbodjā, j. 252.
 Səmbodja, ml. 252.
 Səmboeng, j. 221.
 Səmboeng-dědėk, j. 221.
 Semboeng, gėde, j. 221.
 Səmboeng-goenoeng, j. 221.
 Səməg, md. 235.
 Səmpajang, j. 64.
 Səmpərēm, s. 299.
 Səmphoeng, md. 221.
 Səmpoe, j. 2.
 Səmpoer, s. 2.
 Səmpoer-batoe, s. 2.
 Səmpoer-tjai, 2.
 Səmpòl, md. 2.
 Səndārā, j. 222.
 Səndarèn, j. 287.
 Sənggani, j. 177.
 Səngòn, j. md. 145.
 Səngòn-djāwā, j. 145.
 Səngòn-djawi, j. 145.
 Səngòn-lāndā, j. 148.
 Səngòn-laoet, j. ml. 148.
 Səngòn-sabrang, j. ml. 148.
 Sənoe, j. 52.
 Səntanèn, j. 66.
 Səntigi, j. 178.
 Səntoel, s. j. 82.
 Səntòl, md. 82.
 Səntòlòng, j. 276.
 Səpat, j. 205.

Sēlangke, j. 73 z.
Sēpēt, j. 358.
Sēprèh, j. 329.
Sēroet, j. 314; 328.
Sētjang, j. 148.
Sētri, j. 25.
Sigeung, s. 55.
Sikatan, j. 211; 220.
Siloewar, s. 83.
Silòwar, s. 83.
Simpòl, j. md. 2.
Sindārā, j. 222.
Sindoek, j. 59.
Singkil, j. 270.
Sintjoeng, s. 358.
Sirikājā, j. 12.
Sirikaja „holl.” 12.
Siwalan, j. 355.
Slasējan, md. 282.
Slasih-tjālèng, j. 282.
Slatrì, j. 25.
Slètèrèh, md. 61.
Soekoen, j. s. 338.
Soelangkar, s. 95.
Soeloeh, j. 150.
Soerèn, j. s. 74; 88; 339.
Soerèn-kapas, s. 88.
Soerèn-tali, s. 88.
Soerèn-tandoek, s. 88.
Soeroe-ajam, j. 311.
Soeroe-kēbo, j. 292.
Soeroe-maisā, j. 292.
Soewā, j. 357.
Soewangkoeng, s. j. 348; 352.
Sogā, j. 131; 137.
Sogā-djambal, j. ml. 131.
Sogā-gradjagan, j. 131.
Sogā-tingi, j. ml. 131.
Sokā, j. 137.
Sòkheuh, md. 131.
Sòlòh, j. 150.
Sòmpòr, md. 2.

Sānggālangit, j. 244.
Sōnggòm, s. 171.
Sòrèn, md. 88.
Srikājā, j. 12.
Sriwil, j. 45.
Sriwil-iwil-iwil, j. 45.
Swirswak, ml. 12.
Tadjoeman, j. md. 67.
Tajoeman, j. 67; 132.
Takèr, md. 181.
Takir, j. 181.
Takòka, j. 259.
Takòka, s. 259.
Tal, j. 355.
Tali-doek, j. 357.
Tali-indjoek, s. 357.
Tali-lampak j. 61.
Talingkoep, s. 311.
Talēs, j. 45.
Talēsan, j. 45; 282.
Talòk, j. s. md. 56.
Talòk-bèngkòh, md. 56.
Talòk-kapòr, md. 56.
Tambang-indjoek, s. 357.
Tandjang, j. md. 161; 160.
Tandjang-brangga, j. 160.
Tandjang-ketèk, j. 161.
Tandjang-rajab, j. 160.
Tandjoeng, j. ml. 233.
Tanganan, j. s. 192.
Tanggoeli, j. s. 132.
Tanggoeloen, j. s. 75.
Tangkal-klapa, s. 358.
Tangkalak, s. 282.
Tangkèlè, s. 50.
Tangkil, s. j. 344.
Tangkeudjoengan, md. 56.
Tanghoeloen, md. 75.
Tangkòlò, s. 50.
Tanglar, s. 80.
Tanglòk, md. 56.
Tapas, s. 358.

Tapèn, j. 313.
Tapèn-kěbo, j. 309.
Tarètèg, md. 324.
Tarigan-gěbang, j. 353.
Tarik-gbang, j. 353.
Tarisi, s. 145.
Tarisih, s. 136.
Taritig, j. s. 150; 324.
Taritih, s. 136.
Taròngtòng, s. 182.
Tedjā, j. 282.
Tèdja, s. 282.
Těgěrang, j. 331.
Těh, s. j. 35.
Těkih, j. 145.
Tělasik, j. 282.
Tělitig, j. 324.
Těmpajang, j. 64.
Těmběsoe, ml. 254.
Těndilan, j. 201.
Těngěhtjaāh, s. 203.
Těnggoeli, j. s. 132.
Těnggoeloen, j. 75.
Těngkhoeloen, j. 75.
Těngsèk, j. 110.
Těntjògan, md. 337.
Tapas, j. 358.
Těrép, s. 332.
Těròng-blanda, ml. s. 260.
Těsoek, s. 39.
Tětër, s. 258.
Teureup, s. 332.
Thělimah, md. 183.
Thělisòh, md. 323.
Theuòh, md. 119.
Theureu-mèrah, md. 278.
Theureu-pòtèh, md. 278.
Theutheuk, md. 124.
Thjeueuh, md. 164.
Thoerih, md. 42.
Thoewěh, md. 170.
Thoewěh-beutòk, md. 170.

Thriboeng, md. 355.
Tikěl-baloeng, j. 184; 323,
Tilěng, j. 272.
Timāhā, j. 50.
Timāngā, j. 50.
Tingi, j. 162; 160.
Tira, j. 95.
Tisoek, s. 39.
Tisoek-těmbaga, s. 39.
Tiwoe-landak, s. 332.
Tjaboek, j. 300.
Tjajoer, s. 51.
Tjakar-ajam, j. 316.
Tjalik-angin, s. 109; 314.
Tjalintjing, s. 62.
Tjalintjing-manis, 63.
Tjalintjing-woelèt, s. 62.
Tjandjoer, ml. 148.
Tjangkang-klapa, s. 358.
Tjangkrèng, md. 124.
Tjangkring, j. 124.
Tjangkoedoe, ml. s. 213; 220.
Tjangkoedoe-badak, s. 253.
Tjangkoewang, s. 359.
Tjangtjaratan, 203.
Tjantigi, s. 153; 110; 223; 234.
Tjaee-tal, j. 355.
Tjaratan, s. 203.
Tjaringin, s. 329.
Tjaroeloek, s. 357.
Tjartjina, md. 282.
Tjatjangkoedoean, s. 253.
Tjělakět, j. 228.
Tjělěring, j. 148.
Tjěliling, j. 329.
Tjěmara, s. ml. 343 α.
Tjěmara-laoet, s. ml. 343 α.
Tjěmārā, j. 343 α; 345
Tjěmārā-goenoeng, j. 343 α.
Tjěmārā-laoet, s. ml. 343 α.
Tjěmamis-reti, j. 343 α.
Tjěmarah-biněk, md. 345.

Tjëmārā-rante, j. 345.
Tjëmārātikoeng 345.
Tjëmbawah, j. 64.
Tjëmbirit, j. 249.
Tjëmpāgā, j. 80.
Tjëmpākā, j. 80.
Tjëmpaka, s. ml. 6.
Tjëmpaka-bòdas, s. 6.
Tjëmpākā-djai, j. 4.
Tjëmpākā-gāndā, j. 3.
Tjëmpākā-këmbang, j. 3.
Tjëmpaka-koening, s. 6.
Tjëmpaka-leuweung, s. 6.
Tjëmpakah-moeldjeuh, md. 252.
Tjëmpākā-poetih, j. 6.
Tjëmpakah-potèh, md. 6.
Tjëmpèdak, s. ml. 338.
Tjëmpòkòh-manglèh, md. 4.
Tjëndānā, j. 288.
Tjëndānā-sémoet, j. 289.
Tjèngal, j. s. 25; 37; 343.
Tjèngkèr, j. 358.
Tjèngkir, s. 358.
Tjentheuneuh, md. 288.
Tjentheuneuh-kastòreh, md. 289.
Tjèrèm, s. 192.
Tjèrlang, s. 51.
Tjèrlang-laoet, s. 47.
Tjërme, j. ml. 323.
Tjèrmèh-alas, md. 68.
Tjèrmèn, j. 300.
Tjeuri, s. 23.
Tjhëmpheuloek, md. 134.
Tjhëphoek, md. 45.
Tjhëroek, md. 71.
Tjheukhir, md. 107.
Tjheumphoeh-bòl, md. 173.
Tjheumphoeh-bikhih, md. 173.
Tjheumphoeh-beutòh, md. 173.
Tjheumphoeh-kakèt, 173.
Tjheureuk, md. 309.
Tjhirék, md. 306.

Tjhoear, md. 148.
Tjhoewar, md. 148.
Tjikal-baloeng, j. 184.
Tjikra-tjikri, ml. 78.
Tjipir, j. 310.
Tjoekilan, j. 98.
Tjoekilang, j. 98.
Tjoewoet, j. 30.
Tjòmbrang, 20.
Tjòmbrangan, j. 20.
Tjòngkrang, j. 189.
Tlawas, j. 66.
Toendoeng, j. 105.
Toendoeng-sajòng, s. 105.
Toenggeureuk, s. 343.
Toeri, j. ml. 148.
Toeri-abrit, j. 148.
Toeri-pètak, j. 148.
Toer-poetih, j. 148.
Toetoeb, j. 319; 315; 314; 312; 313
Toetoeb-antjoer, j. 315.
Toetoeb-awoe, j. 314.
Toetoeb-kantjil, j. 314.
Toetoep-rama, j. 315.
Toetoep-wësi, j. 334.
Tòkbraj, s. 307.
Tòkbròl, s. 235.
Tòngtòlòk, s. 45.
Tòrèh, md. 148.
Tòtòp, md. 319; 313; 315; 312.
Tòtòp-binèk, md. 314.
Tòtòp-lapheung, md. 319.
Tòtòp-lakèh, md. 315.
Tòtòp-pòtèh, md. 319.
Tranggoeli, j. 132.
Tranggoeloen-bèrnang, j. 75.
Trangkil, j. 344.
Trawas, j. 282.
Trëmbësi, j. 334.
Trénggoeli, j. 132.
Trénggoeli-klòlèt, j. 132.
Trénggoeli-wawang, j. 132.

- Trênggoeloen, j. 75.
 Trêngkhoeloen, md. 75.
 Treup, s. 332.
 Troentoeng, j. s. 166; 227.
 Troesgoenoeng s. 80.
 Wadang, j. 51.
 Wadoeng, j. 23.
 Wajoe, j. 51.
 Walang, j. 51; 314.
 Walèn, s. 329.
 Walik-angin, j. 83; 278; 336; 314
 Walikëlar, j. 99; 109.
 Waliklar, j. 314.
 Walikoekoen, j. 59.
 Wangkal, j. 145.
 Wàngsā, j. 8.
 Wangsoel, j. 83.
 Warèng, j. s. 271.
 Waringin, j. ml. 329.
 Waroe, j. s. 39.
 Waroe-djémboet, j. 39.
 Waroe-gèli, j. 39.
 Waroe-gòmbòng, j. 39.
 Waroe-goenoeng, j. 39.
 Waroe-rangkang, j. 39.
 Waroe-kòpèh, j. 39.
 Waroe-laoet, s. 40.
 Waroe-lěngā, j. 39.
 Waroe-lěngis, j. 39.
 Waroe-lòt, j. 40.
 Waroe-pajoeng, j. 39.
 Waroe-rangkang, j. 39.
 Waroe-sòngsòng, j. 39.
 Wélahan, j. 80.
 Wèlawèan, md. 334.
 Wéroce, j. 145.
 Widārā, j. 94.
 Widājjāikoesoesmā, j. 276.
 Wierook-hout, holl. 286.
 Wijoe, j. 73 α; 74.
 Wilādā, j. 329.
 Wining, j. 45.
 Winěng, j. 187.
 Wisnoe, j. 52.
 Woeloech, j. 150; 327.
 Woeloechan, j. 314; 327.
 Woelòh, j. 150; 327.
 Woeni, j. ml. s. 323.
 Woeni-laoet, j. 305.
 Woeni-liris, j. 305.
 Woengli, j. 263.
 Woengoe, j. 179.
 Woenoeng, j. 45.
 Woeroe, j. 5; 61; 109; 132; 240;
 304; 253; 282; 278.
 Woeroe-dapoeng, j. 282.
 Woeroe-děđak, j. 282.
 Woeroe-děđěk, j. 282.
 Woeroe-dòbòs, j. 282.
 Woeroe-djati, j. 282.
 Woeroe-gěđang, j. 282.
 Woeroe-gěđāwā, j. 282.
 Woeroe-gěmplòng, j. 282.
 Woeroe-gòmbòng, j. 282.
 Woeroe-kamplòng, j. 282.
 Woeroe-kapoer, j. 282.
 Woeroe-kěmbang, j. 109; 282.
 Woeroe-kěmploeng, j. 282.
 Woeroe-kětèk, j. 282.
 Woeroe-kindjèng, j. 282.
 Woeroe-koenjit, j. 282.
 Woeroe-konjit, j. 282.
 Woeroe-kòntèt, j. 340.
 Woeroe-lěmah, j. 282.
 Woeroe-loctoeng, j. 282.
 Woeroe-mangir, j. 282.
 Woeroe-měđang, j. 282.
 Woeroe-pajoeng, s. 282.
 Woeroe-pětjěl, s. 282.
 Woeroe-pinggang, j. 282.
 Woeroe-prit of ěmprit, j. 282.
 Woeroe-sānā, j. 109.
 Woeroe-santěn, j. 230.
 Woeroe-sāwā, j. 339.

Woeroe-sěmoet, j. 282.
Woeroe-sěpěť, j. 282.
Woeroe-sintòk, j. 282.
Woeroe-sòngsòng, j. 282.
Woeroe-tjèlèng, j. 282.
Woeroe-tjěmpākā, j. 282.
Woeroe-tjilirang, j. 282.
Woeroe-watoe, j. 282.
Woeroe-widjèn, j. 282.
Woeroe-wingkā, j. 282.

Wonderolie-boom, holl. (Rcinus),
323.
Wòngkhoenòng, md. 80.
Worstenboom, holl. 266.
Wrakas, j. 342.
Wringin, j. 329.
IJzerhout, holl. 343 z.
Zeepboom, holl. 96.
Zuurzak, holl. 12.

ERRATA.

De lezer wordt beleefd uitgenoodigd de onderstaande verbeteringen in den tekst aan te brengen. — In deze lijst zijn de verschillen tusschen *d* en *ḍ*, *t* en *ṭ* niet opgenomen, aangezien voor de meeste europeanen, die niet langen tijd de javaansche taal beoefend hebben, het onderscheid tusschen deze klanken niet hoorbaar is.

Bladzijde.	S T A A T :	L E E S :	Op welken regel van boven.
3	Sëkra, j.	Sëkar, j.	8
3	Guattaria.	Guatteria.	12
5	Flacourtia.	Flacourtia.	4
11	Woeroe-lnégâ, j.	Woeroe-lëngâ, j.	29
13	Bl.	L.	9
12	Waroe-dějmbœt, j.	Waroe-djẽmbœt, j.	6
"	Beuroe-kheutjheu, md.	Beuroeh-kheutjheu, md.	9
15	Tangkólò, s.	Tangkòlò, s.	10
16	Blëntjông, j.	Blẽntông, j.	14
"	Djati-landi, j.	Djatòs-landi, j.	19
19	Këmësòh, md.	Kẽmèsòh, md.	29
22	Tadjoeman, j.	Tadjoeman, md.	9
25	Azidarachta.	Azadirachta.	14
27	Doerènan, j.	Doerenan, j.	14—24
"	Pikopian, md.	Pikòpian, md.	27
28	Doekoe, ml. j.	Doekoe, ml.	1
38—37	Kědondng, j.	Kẽdòndng, j.	12—31
38	Klontjing, j.	Klontjing, j.	14
43	Dauhinia.	Bauhinia.	19
43	Paudia.	Pahudia.	25
43	Prèngkèt-djèngkòl, s.	Parèngkèt-djèngkòl, s.	12—13
"	Toeri-aprit, j.	Toeri-abrit, j.	23
49	Djhoewar, md.	Tjhoewar, md.	20
50	Gale-asëm, j.	Galih-asëm, j.	3—5
66	Plëndâ, j.	Plẽndo, j.	23
68	Pitjisan, s.	Pitjisan, j.	30
71	Kasimboehan, s.	Kasimboeân, s.	28
74	Myrsin.	Myrsine.	9
77	Sono-kling, j.	Sânâ-kling, j.	7

Bladzijde.	S T A ' A T:	L E E S:	Op welken regel van boven.
82	Polaj-panthk, md.	Polaj-panḍak, md.	27
83	Lòh-kambing, j.	Lòh-gambing, j.	28
85	Fragraea.	Fagraea.	8; 9; 22.
91	Heas, s.	Heas, s.	8
96	H. beès, s.	H. beas, s.	8
"	Emprit, j.	Ēmprit, j.	22
"	B. bibis, md.	B. bilis, md.	31
104	Kēmèrèh.	Kēmèrèh, md.	29
106	Arak, md.	Arak, md.	5
116	Elo, j.	Ēlo, j.	5
"	Goendang, j.	Goendang, j.	11
119	fulva Reinwt.	toxicaria Linn.	4
"	hirta Reinwt.	fulva Reinwt.	20
120	Apā-āpā, j.	Āpā-āpā, j.	12
122	Latnég, j.	Lateng, j.	14
124	Tjèntjogan, md.	Tjèntjogan, md.	26
134	Soew, j.	Soewā, j.	10
"	Légèn, j.	Légèn, j.	16
"	Trambil, j.	Krambil, j.	29
135	Pèṇḍòh, j.	Pòṇḍòh, j.	5
"	Lidi.	Lidi, ml.	7
"	Njere, s.	Njèrè, j.	7
"	Bloem, j.	bloem.	9
"	Klapa, j.	Klāpā, j.	13
"	Sepèt, j.	Sépèt,	16
"	Tepès, j.	Tépès, j.	16
"	Pandan-laut, s.	Pandan-laoet, s.	21
136	Djadjang, j.	Djadjang, j.	10

ADDENDA.

De lezer wordt beleefd verzocht elk dezer „aanvullingen” bij
het bijbehorende nummer op te plakken.

onder 73:

73 α . *Ailanthus* DESF.

Ailanthus spec. — Bij Poegër in Běsoeki *Radèn*, j. Zeer locale onzekere naam. Elders in Běsoeki heet een *Podocarpus*-soort constant *Radin*, md. Bij Plèlèn in Pěkalongan constant *Sělangke*, j. geheeten; die naam echter aan weinige inlanders bekend en zeer locaal. De boom in Pěkalongan en ook in Samarang niet zelden om de gelijkenis der bladeren met *Garuga spec.* abusievelijk *Wijoe*, j. genoemd. — Determinatie van J. G. BOERLAGE.

onder 14:

14*. VIOLACEAE.

14 α . *Alsodeia* THOUARS. — Inl. namen en

Alsodeia spec. — Inl. namen en boom aan mij van Java nog onbekend.

achter 280:

Tambourissa SONN. bijvoegen (*Ambora*).

onder 343:

343*. CASUARINACEAE.

343 α . *Casuarina* FORST.

Casuarina spec. — *Tjěmârâ*, j.; *Tjěmârâ-goenoeng*, j. (= *Tjěmaucis-rěti*, j.); *Tjěmara*, md. — Zeer vaste namen. Geen andere op Java wildgroeïende boomen aldus genoemd; behalve bij uitzondering soms *Podocarpus cupressina* R. BROWN.

Casuarina spec. — *Tjěmara*, s. ml.; *Tjěmara laet*, s. ml. of eenvoudig *Tjěmârâ*, j. Hout buitengewoon hard, zeer moeilijk te bewerken en zeer zwaar; doch zeer duurzaam. In de bergstreken van Oost-Java niet zelden met succes bij huisbouw gehezigd. Is een der *Ijzerhout*-soorten van den Maleischen Archipel.

achter 331:

Cudrania TRÉCUL. bijvoegen (*Maclura*).

achter 335:

Villebrunea GAUD. bijvoegen (*Oreocnide*).

achter 248:

Orchipeda BL. bijvoegen (*Pootia*).

achter 45:

Sterculia L. bijvoegen (*Pterocymbium*; *Firmiania*).

achter 41:

Bombax LINN. bijvoegen (*Salmalia*).

achter 23:

Garcinia LINN. bijvoegen (*Stalagmites*; *Discostigma*).

